

28,181/3



Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30512682>

D. LAURENTII HEISTERI

Profess. publ. Helmstädiensis, Academ.
Cæsar. Regiæ Londin. ac Berolin.
collegæ

COMPENDIUM ANATOMICUM

Totam rem Anatomicam brevissime
complectens.

*Editio septima Veneta juxta quartam Altorfinam
prioribus longe auctior atque
emendatior.*

ACCEDIT EJUSDEM AUCTORIS
COMPENDIUM
INSTITUTIONUM MEDICINÆ.



B. Luigi Langrandi

VENETIIS, MDCCLXIV.

TYPIS SEBASTIANI COLETI.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.



VIRO AMPLISSIMO ATQUE DOCTISSIMO

D. JO. BAPT. MORGAGNIO

In celeberrima Academia Patavina Anatomies
Professori primario, Anatomicorum hujus sæculi
facile principi, Factori atque Amico suo æstima-
tissimo; compendii hujus Anatomici editionem
quartam in amicitia perpetuam tesseram con-
secrat

A U C T O R.

Quod novam hanc, amicissime Morgagni, eamque
quartam compendii mei in Germania editionem
nomini Tuo splendidissimo inscripserim, cum diutur-
na, suavissima, atque constantissima, quæ a multis an-
nis jam inter nos intercedit necessitudo, tum quod omnes
eruditi ex doctissimis Tuis scriptis Te hodie Principem
Anatomicorum, maximeque idoneum rerum anatomica-
rum judicem, atque æquissimum earum arbitrum agno-
scant, effecerunt. Postquam enim Tu de hisce meis la-
boribus, quos hucusque in compendio meo anatomico
concinnando, emendando, atque augendo impendi sem-
per & publice & in privatis litteris amicum tulisti ju-
diciū, atque ad illud magis perficiendum mihi calcar
atque auxilium dedisti, omni studio ac labore, quantum
alia mea negotia permiserunt, etiam in hac editione id
præstare annisus sum: in qua rursus multa addita & in
disciplina anatomica emendata invenies. Quæ si Tibi
non displicebunt, gaudebo, atque cavillatores iniquos,
qualem nuper in Gallia chirurgum quendam expertus
sum, haud curabo: in primis cum alii eruditi omnes hu-
jusque labores hos meos laudarunt, vel si quid monen-
dam judicarunt, ut honestos decet, monuerunt. Vale.

Dabam Helmstadii X. Kalend.

Martii A. MDCCXXXII.

*

2

PRÆ-

PRÆFATIO

AD LECTOREM.

Quamvis ante compendii hujus editionem primam libri anatomici non defecerint, neque compendiorum anatomicorum fuerit penuria: tamen me actum egisse non existimo, cum *hocce Compendium anatomicum* primum, & deinde aliquoties auctius atque emendatius, in manus hominum edere susceperim.

Etenim, quoniam *scientia anatomica* ita est comparata, ut, more omnium aliarum scientiarum, industria atque improbo præstantium virorum labore, *in dies emendationes & incrementa admittat*, atque etiam nostris temporibus largissima sumserit: hinc harum rerum gnaris facile erit manifestum, *in antea usitatis compendiis & syntagmatibus anatomicis quam plurima deficere*, quæ ab aliquo tempore a variis vel recens detecta atque inventa, vel emendata atque correctæ sunt, quæque studiosæ juventuti, & in primis tyronibus Medicinæ scitu sunt & utilia, & necessaria.

Cum vero his valde molestum ac difficile sit, fundamenta Anatomies, & res jam cognitæ, ex tam multis, eheu! libris, & quidem sæpe ingentibus ac valde prolixis, colligere, aut conquirere; atque hic labor haud levem in progressu studiorum eorum ponere possit remoram, magnamque tyronibus nauseam creare; *hoc compendio eos sublevare*, artemque effato Hippocratis jam satis longam ac difficilem, breviorē, facilioremque reddere studui.

Recte enim suadet illustris Boyleus (1), ut in
scien-

(1) Tentam. physiolog. commentatione proœmiali.

P R Æ F A T I O.

scientiis subinde, quando largi progressus, five magna incrementa facta sunt, novum systema in lucem emittatur, ad optimorum scriptorum sententias & observationes adornatum. Istiusmodi enim opus, ait, tunc summæ utilitatis esse posse, partim ad initiandam in scholis & Academiis juventutem; partim, ut habeant homines præ manibus eorum indicem, quæ jam inventa sunt, ut de cognitis non amplius laboretur, & humani in scientia progressus evidentius appareant. Insimul tamen monet, ne istiusmodi opus in publicum detur, donec scientiæ cumulo aliqua notabilis accessio habeatur.

Plures vero quam viginti nunc præterierunt anni, cum Clar. Schelhammerus (1), postquam Verheyenum acri censura castigaverat, jam fuerit conquestus, nos commodo, quo partium historia tradatur, destitui compendio: atque optavit, ut vir aliquis doctus, qui in veterum recentiorumque scriptis æque sit versatus, id qui præstet, publico bono excitetur, qualis olim Veslingius fuerit; atque propterea exclamavit: Utinam novum aliquem Veslingium concederet nobis cœlestis favor, qui parum verborum nitore, brevitate, ac pondere, nova veteribus addita exponeret. Verum prorsus fere desperavit, idque hoc seculo fortassis optare licere, sperare vero non licere, indicavit. Nam pergit: Artis sane est non vulgaris, majorisque, quam facile creditur, concinnare ejusmodi Compendium, succincte, nervose, cum judicio, methodoque veraciter facili, denique eleganter, & a media ætate petitis verbis. Quod quam difficile sit, ex prædictis nemo non cognoscit: in primis quando simul animo perpendit, quanta nunc linguarum notitia ei sit necessaria, qui hodie bonum compendium conficere, omnesque res novas, quarum ne quam plurimæ sunt, quæ hoc tempore non

*

3

sola

(1) In præfatione Analector. Anatomico physiologico-
m, qui liber prodit Kilæ An. 1764. 4.

sola latina lingua, ut *Veslingii* patrumque nostrorum ævo, sed Gallica, Italica, Anglica, Belgica, atque Germanica etiam scribuntur, prævio præsertim accurato illarum examine, in compendium apte transferre studet. Quantum præterea commercium litterarum in hoc studii genere, quantumque laboris & sumtuum, ut libros, eosque sæpe pretiosissimos, exteris præsertim in regionibus impressos, acquirat, requirantur, dici sane vix potest. Et quamvis *Veslingius* non sim, multo minus me talem esse credam, qualem *Schelhammerus* hic desiderat; summa tamen ope nisus sum, ut ea, quæ in compendio jure desiderat, quantum tenues meæ vires, aliaque mea negotia admittunt, præstem: atque dum *Veslingium* æquare non potui, eum tamen imitari, & quousque mihi licuit, assequi studui. Operam minimum haud levem impendi, ut saltem longe perfectius ac melius compendium exhiberem, quam ante meum habebamus.

Quod si enim examinamus recentissima illorum, quibus meum prima vice edere cœpi, temporum syntagmata & compendia anatomica; profecto ingens recens inventorum cumulus, & accessio quam maxima novarum observationum occurret, quæ in illis deficiebant.

Consideremus enim vulgatissimum librum anatomicum, & in Academiis illo tempore usitatissimum, nimirum *Anatomiam corporis humani* clarissimi Verheyeni, (de imperfectioribus enim jam nihil dicam) atque perspiciemus, non solum multos adhuc errores in eo contineri, quos recentiores correxerunt & emendarunt; sed etiam nova inventa quamplurima in eo deficere: & quidem non modo eorum auctorum observationes, qui post eum scripserunt; verum etiam multæ illorum, qui ante editionem ultimam libri ejus (quæ An. 1710. Bruxellis prodiit) jam prostabant.

Liceat

Liceat ad sententiam hanc nostram probandam ex multis tantum nonnulla commemorare, quæ in hoc scriptore, & plerisque aliis, qui ante ipsum scripserunt, deficiunt, vel male descripta sunt: non quidem eo animo, ac si honori atque existimationi ejus aliquid detractum esse velim, ut nonnulli sinistre interpretari voluerunt (1), quod absit a me, *nam multa bona præstitit Egregie de re anatomica meritus est*; sed ut demonstrem, multa ab ipso fuisse neglecta, atque novum quoddam compendium, sive novum rerum in anatome cognitarum indicem fuisse necessarium (ne jure mihi exprobrari queat, me actum egisse, aut nihil præ Verheyeno præstitisse) tam pro studiosa juventute, quam etiam pro aliis eruditis, qui, quæ in Anatome jam nota sunt, cognoscere desiderant: *ut in cognitis non diutius, quam par est, se detineant, sed, ut in incognitis tanto melius progrediantur, atque uberiora incrementa facere anxiantur.*

Primo autem loco generatim hic notamus, Verheyenum scriptores Anglos, forte ob linguæ Anglicanæ imperitiâ, *non legisse*; quos tamen, quia ab ipso non adeo remoti fuerunt, habere facile potuisset. Nominatim vero celeberrimi anatomici, Guillelmi Cuvperi scripta ipsi prorsus fuisse incognita, inde patere existimo, quia nusquam eorum ullam fecit mentionem. Deinde, cum in tract. II. cap. XXIV. (ubi de pene agit, in edit. Bruxellensi p. 117.) ex Clar. Morgagnio aliquid referat de usu foraminulorum in urethra virili, & Morgagnius *de glandulis Cuvperi* juxta prethram loquatur, addit Verheyenus in parenthesis: *quales illæ glandulæ sint, ignoro*; cum tamen non solum in peculiari scripto, & quidem

* 4 non

(1) Præsertim auctor Versionis gallicæ hujus libri, ut relatum legi in Diario Gallico (*Journal des Sçavans*) An. 1725. mense Julio, ubi tamen Auctores hujus Diarii me optime defendunt.

non anglicano, sed latino, An. 1702. Londini impresso, verum etiam postea in *Actis Lipsiensibus*, *Ephemeridibus Gallorum*, *Historia Academiae Regiæ Scientiarum*, Keilii *Anatome*, Drakii *Anthropologia*, & Hornii *Microcosmo*, cum notis clarissimi D. Pauli Anno 1707. Lipsiæ edito, descriptæ fuerint: quos igitur libros omnes non evoluisse videtur.

Præter has glandulas omisit quoque varios novos musculos, quos Covvperus in *Myotomia* sua reformatâ, quæ tamen jam A. 1694. prodiit, descripsit: ut *flexorem capitis*, *rectum* scil. *minorem anticum*, & *rectum lateralem*, inter *spinales colli*, *musculorum oculi*, & *linguæ pulcherrimam delineationem*, cum multis aliis egregiis inventis, quæ tam in magno suo opere, *The Anatomy of the human Body*, quam in *Actis Lipsiensibus*, item in citato modo Keilio, Drakio, Pauli, & alibi, repetita sunt. Imo nihil quicquam habet Verheyenus ex *Actis*, ut vocant, *philosophicis Anglicanis*, aut ex *Historia Academiae Regiæ Scientiarum*, neque ex *Ephemeridibus Naturæ curiosorum*, neque e *Diario Parisiensi*, aut *Actis Eruditorum Lipsiensibus*, ullove alio libro simili periodico, qui nova literaria recensere solent. Unde patet, Verheyenum in multorum librorum, etiam vulgatissimorum, lectione sæpe non versatum fuisse. Hoc vero adhuc magis manifestum erit, si consideramus cum observationum Gagliardi Itali, & Haveri Angli, circa *ossa* & *glandulas mucilaginosas*, tam diu cum publico jam communicatarum, non quidem meminisse; itemque observationes Bonclari & Lealis Lealis circa *testes*, ac *Vesiculas seminales* omisisse, atque *musculos urethræ*, *transversales* dictos, a Bidloo, Covvpero, Littrio, & aliis descriptos, aliaque similia non commemorasse. Sic nec Celeb. Duvvernei librum *de organo auditus*, adeo tritum, & notum, ipsum vidisse, aut legisse inde

patet, quia ejus non solum non meminit, sed & figuras illius, quas Blancardus, sine auctoris mentione, in Anatomem suam transtulerat, pro figuris Blancardi venditat, Tab. XXIX. fig. 2. quæ vero Duvverneo adscribendæ erant. Silentio quoque præterit Brunnerum de *Pancreate*, *glandulis duodeni*, atque *glandula pituitaria*: quæ tamen scripta a triginta quasi annis jam prostant: itemque Antonii Mariæ Valsalvæ tractatum de *Aure humana*: cum tamen is multa notatu digna scripserit, ejusque liber in Belgio non solum recusatus, verum etiam in Actis Lipsiensibus, aliisque Diariis jam etiam dudum recensitus sit.

Miror quoque eum, *corpus reticulare* Malpighii in lingua, ceteraque ejus tegumenta omis-
 sisse, cum tamen hæc jam diu a Malpighio, Bellino, Burdono, Mangeto, aliisque quamplurimis scriptoribus ab eo tempore descripta sint. Ita nec Terranei observationum de *glandulis rethrae*, neque Nabothi de Ovario suo novo mulierum, ullam facit mentionem. Svvammerdamium quoque silentio præterit, qui tamen nittas de *utero* exhibuit figuras, & observationes, itemque Deventerum, qui *prægnantium uterum* bene delineavit.

Covvperus & Drakius *penis virilis anatomem* ere elegantibus figuris illustratam dederunt, in qua præter glandulas, & musculos supra memoratos, vasa penis mercurio præparata, in primis etiam vasa ejus lymphatica, grato spectaculo exhibuerunt; de quibus tamen omnibus altum apud Verheyenum est silentium. Speciatim vero etiam Drakius optimam, quæ hætenus notavit, *arteriæ aortæ* evulgavit *delineationem*, ac præterea alias elegantes figuras, nimirum *ductus thoracici* ex homine, atque *arteriæ*, & *venæ pulmonalis* dedit. Pulchre quoque per figuras
 ex-

expressit *musculos*, & *cartilagine* *nasi*, *distribu-*
tionem membranae narium pituitariae, *ossa turbi-*
nata nasi, *sinus ossium maxillarium* cum eorum
aperturis in cavo narium, *septi narium constitu-*
tionem ejusque *membranam*, *pulcherrimam omnium*
organi auditus in unica figura representationem.
 Denique idem Drakius, decem in Tabulis, ni-
 tidissimas exhibuit *musculorum delineationes*, eo-
 rum brevesque, & bonas *descriptions* addidit;
 unde factum esse opinor, ut a Listero, in præ-
 fatione libri sui de humoribus, hocce tulerit elo-
 gium; Nihil, ut arbitror, inquit, *aliquot annis*
generis ejusdem absolutius scriptum.

Ridleus quoque vere elegantem *de cerebro tra-*
ctatum jam An. 1695. edidit, *pulcherrimis ob-*
servationibus, *experimentis*, & *figuris illustratum*;
 qui tamen etiam Verheyeno ignotus fuisse vide-
 tur. Tacet præterea, quæ Glissonius *Tract. de*
Hepate, & *Celeb. Bohnius*, jam tam diu in *Actis*
Lipsiensibus, Anno scilicet 1682. & 1683. ut in
Circulo suo Anatomico-physiologico, *Cap. de he-*
patis officio, de *ductibus hepatico-cysticis*, cum pu-
 blico communicarunt: quæ Verheyenus, dum in
 descriptione horum illos silet, pro suis inventis
 venditare videtur. Nec minus *vasa nova palpe-*
brarum Meibomii nostri, in peculiari epistola olim
 evulgata, atque a Bartholino, Blasio, Jo. Maur.
 Hoffmanno, aliisque reperta prætermittit.

Siluit etiam inventores *ductus salivalis glandu-*
lae sublingualis in bestiis, Rivinum, & Bartholi-
 num: unde & hos ipsi incognitos fuisse, haud
 obscure divinare licet. Siluit quoque *Mauricium*
Hoffmannum, primum *ductus pancreatici invento-*
rem fuisse. Sic forte nec legit, quæ Littrius de-
 dit de *glandula nova urethrae*, in *Hist. Acad. Reg.*
Scientiar. A. 1700. Nihil loquitur de *hiatu*, live
foraminulo, quod primum Rivinus, (docente
 VVeltchio in tabulis suis Anatomicis), & de-
 inde

nde etiam Munincks, Valsalva, & Drakius, in *membrana tympani* statuerunt, per quod nonnulli fumum nicotianæ, ore attractum, per aures emittunt. Pacchioni observationes de *dura matre*, in tract. de fabrica, & usu duræ matris, nec non de *glandulis conglobatis duræ matris*, per figuras designatas, pariter omittit; sicut & sinus inferiores duræ matris, quos partim Vieussenius, & Orlobius, partim Ridleus delinearunt, ac descripserunt. Nihil refert de eis vasis, quæ Thebesius in *interiori cordis superficie* detexit, & peculiari dissertatione, Lugduni Batavorum A. 1708. edita, descripsit: de quibus tamen, & acta Lipsiensia loquuntur, & figuras exhibent.

Silentio premit Briggium de *oculo*, & quæ Hovius de *motu humorum oculariorum* publicavit: quorum tamen modo laudata Acta Lipsiensia & mentionem fecerunt, & delineationem quoque dederunt. Similiter, quæ Ruyschius nova dedit, tam de *arteriarum pulcherrima per choroideam Ruyschianam, & uveam distributione*, quam, quæ alias mirabilia in suis epistolis, & thesauris, descripsit quamplurima, vel prorsus omittit, vel per transennam tantum indicat. Pulcherrima quoque multa, quæ hic stupendis suis *injectionibus in cerebro, auribus, naso, lingua, corde, ventriculo, intestinis, omento, hepate, liene, renibus, aliisque partibus* detexit, sicco sæpe pede transit; quorum tamen in systemate anatomico non solum mentionem, sed etiam sufficientem descriptionem, facere debuisset.

Sic & ubi de glandulis intestinorum agit, Peyserum silet, inventorem eorum: id quod, vel ex ejus scriptis, vel ex *Mangeti Bibliotheca anatomica*, cognoscere potuisset. Neque quæ Novesius de *vesiculis seminalibus mulierum, nervo auditorio, aliisque rebus anatomicis*, nova tradidit, perspecta habuisse Verheyenum inde conjicio, quia de
eis

eis nihil scribit. *Neurographia*, & novum vasorum systema *Vieussenii* quoque meruissent, ut plura ex eis retulisset, quam retulit; sed haud memini, eum horum librorum vel mentionem usquam injicere.

Nihil jam dicam de iis inventis, & observationibus, quæ post editionem ultimam *Anatomie Verheyeni* prodierunt, quippe quæ tunc scire nondum poterat; ex quibus vero auctoribus brevitatis causa nonnulli tantum hic nominabuntur; ut *Fantoni* anatomia corporis humani; *Vercellonius*, de glandulis œsophagi; *Nigrisoli*, *Vidussius*, *Voglius*, *Hiltscherus*, *Vallisnerius*, & *Paitonus*, de generatione; *Anellus* de ductibus lacrymalibus: ubi quidem *Morgagni* descriptionem tradit, attamen ex hujus fabricæ cognitione fistulæ lacrymalis curationem emendat. Porro *Cheseldeni* Anatomia, & lithotomia, *Eustachii* tabulæ anatomicae, *Vieussenius* de aure, corde, & liquoribus corporis humani; *Morgagni* quinque ultima Adversaria anatomica; *Salzamannus*, *Henningerus*, & *Wium* de ductu thoracico; *Henrici* vesiculæ seminales mulierum; *Palsinii* Anatomia Chirurgica; *Cantii* impetus anatomici; *Michelottus* de Separatione fluidorum, & sanguinis in pulmonibus mutatione; *Boerhavius*, & *Ruyschius* de glandularum fabrica, hujusque Adversaria, epistolæ, & thesauriarii; *Vaterus*, *Coschvitzius*, & *Waltherus* de novis ductibus salivæ, *Teichmejeri* Anthropologia, *Cowperi* Myotomia reformata nova, & splendidissima; *Santorini* observationes anatomicae, itemque *Winsloei*, *Raiboltti*, & *Helvetii* in Historia Academiae Parisinae; *Albinus* de intestinis tenuibus, *Burggravius* de spirituum animalium existentia contra *Gælicium*, aliique scriptores, qui in opusculo nostro de incrementis *Anatomes* nominantur, quorum res gestas præcipuas in compendio hoc indicavi.

Præter auctores vero enarratos, & forte plures alios, quorum inventa, & observationes, imo integros libros ignorasse videtur Verheyenus, *multos adhuc alios defectus, & errores annotabo, quos facile evitare potuisset*; ut exemplis quamplurimis oppido demonstrem, anatomicam disciplinam libro perfectiore, quam Verheyeni est, in-
 diguisse.

Et primo quidem *in trunci corporis humani* divisione, cum tantum *in tres partes*, caput, thoracem, & abdomen, dividit, ac *collum omittit*. Quia vero collum neque ad caput, neque ad thoracem sine confusione referri potest, merito *in quatuor partes dividendus est truncus, & collum, tamquam pars diversa a reliquis, considerandum*. Nam dici recte nequit, laryngem aut speram arteriam in capite aut thorace esse sitam, sed in collo. Sic etiam *vulnus colli* in chirurgia, *neque ad thoracis, neque ad capitis vulnera* referri potest: quapropter colli a reliquis trunci partibus distinctio non est entium præter necessitatem multiplicatio; sed, quia ad confusionem evitandam facit, perquam utilis divisio, multorumque clariss. virorum authoritate nititur. Vid. pag. 128.

Deinde *dextrum ventriculi orificium sinistro altitudine esse æquale*, & scribit, & delineat; cum tamen Ruyschius (1) & plures alii, ipsaque experientia doceant, *dextrum sinistro esse inferius*. *Valvulam pylori* in figuris suis omittit, & hunc tantum circulum fibrosum esse statuit; cum tamen satis insignem plerumque valvulam exhibeat, imo *nec situm obtinet pylorus horizontalem*, ut a Verheyeno delineatur, sed obliquum, prout figura VI. Tab. I. utrumque hoc demonstravimus.

Valvulam coli, (quam *Bianchus* prorsus negat) ad ingressum ilei in intestina crassa, *rotundam deli-*

(1) Thef. Anat. II. Tab. V.

delineat, & circuli in modum huic orificio est circumductam, ait Verheyenus pag. 64. cum tamen in inflato, & exsiccatō intestino non rotunda, sed longitudinalis, & admodum singulari appareat, ex duabus membranis, quasi semilunari-
ribus, e regione positis, composita: sicuti prolixiori descriptione in dissertatione peculiari de hac valvula, An. 1718. edita, ac nova figura illustravimus. *Valvulas Kerkringii conniventes* in testinorum ex Bartholino recenset; unde apparet, eum etiam vulgatum librum Kerkringii non habuisse. *Musculos œsophagi* male delineat, & describit; quorum longe melior delineatio ex Covvpero peti potuisset. *Lieni tunicam duplicem* p. 86. & *cellulas* adscribit: quæ quidem in bobus ac vitulis reperiuntur, sed non in homine; ubi *unica tantum*, & quidem naturaliter satis tenui *membrana* cingitur, sicut id etiam in canibus & porcis ita reperitur. *Cellulosa vero substantia* in homine a Ruyschio (1) quoque jam refutata est. Plerique autem Authores, quod obiter hic notamus, in eo errarunt, quod descriptionem *lievis vitulini* pro humano dederint; nam experientia, & Ruyschii scripta aliud docent.

Impossibile præterea esse putat, per unum eundemque ductum cysticum bilem in cystidem felleam influere, & rursus inde effluere posse, cum tamen nullum adsit obstaculum; nec repugnet analogia in vesiculis feminalibus; ubi per unum eundemque ductum semen in has vesiculas influit, (quod ipse concedit) & excretionis tempore rursus effluit. *Ductus cysticus* in homine serpentino ut plurimum ductu inflectitur, ut dudum Ruyschius (2) & nos Tab. III. fig. 9. hic demonstravimus; hinc male a Verheyeno Tab. XI. fig. 4. rectus delineatur. Non notat, sphincterem adesse in vesicula fellis: cum tamen flatus immixtus ab ea
ita

(1) Epist. IV.

(2) In Epist. V. Tab. 5. fig. 6.

ita coerceatur, sicut in vesica urinæ, ut non sponte erumpat. *Uretherum structura* ex triplici membrana composita a Verheyeno omissa est. *Capsulas atrabilarias* sitas esse delineat inter renes, venam cavam, & aortam; cum tamen, uti Eustachius (1) jam olim recte observavit, & delineavit, ipsi renum superiori, & interiori parti incumbant: in canibus vero sitæ sunt, uti a Verheyeno delineantur. Usus, quem his capsulis adscribit, (*quod scilicet liquorem in eis secretum ad arterias emulgentes transmittant, quod urinæ in renibus præcipitatio melius succedat*) nullo experimento, neque ratione, neque analogia nititur.

Prostatas, duo corpora globosa esse perhibet p. 114. quæ vero nisi unicum sunt. *Urethræ substantiam* cavernosam circa glandem quasi obliterari asseverat pag. 115. cum contra ibi magis expandatur, & totam fere glandem constituat, sicut Ruyschius dudum demonstravit (2); & hinc male describit glandem penis pag. 118. quasi ex duobus corporibus spongiosis componeretur; nam modo laudatus Ruyschius, & dein Littrius (3) dudum accuratiores dederunt descriptiones. *Duo tantum musculorum penis & urethræ paria* numerat Verheyenus; cum tamen tria, ut supra jam dictum, a longo tempore nota atque descripta sint: quibus Littrius quartum addidit, *Rectum* appellatum, quod ab ano oritur, & bulbi urethræ parti posteriori inseritur, sicut in *Myologia* s. 345. ea descripsimus. *Urethræ pulchræ descriptio*, quam Littrius (4) dedit, eum prorsus fugisse videtur: alias sine dubio hac de re locus fuisset. *Glandulas in vesiculis seminalibus* se manifeste observasse in adolescentulo, *Harderus* asseve-

(1) Traët. de Renibus. (2) Observat. Anatomico-chirurg. centesima. (3) Histoire de l'Acad. des sciences n. 1700. (4) Loco modo citato.

asseverat, (1) cum ductibus excretoriis setarum admittentibus: quorum vero ab illo nulla f. mentio.

Tubulos lactiferos mammarum ex glandulis rotundis provenire, fide Nuckii quidem affirmat Verheyenus, sed non sua observatione, proinde ex verbis ejus colligere licet; quemadmodum etiam de illis glandulis mammarum tam breviter & frigide loquitur, ac si nunquam eas certe, saltem ita, sicut eas delineat, vidisset. In flore ætatis, ait tantum, eas candore nitere, in senectute vero flavedine obfufcari: ceterum vero de eorum situ, figura, magnitudine &c. nihil proponit. Delineat quidem eas rotundas, & copiosissimas ubique mox sub cute per mammam dispersas, Tab. XVIII. fig. 2. & 4. secundum Nuckium; sed nunquam eas ita reperire potuit quamvis lactantium puerperarum, virginum, & aliarum mulierum mammas solícite sæpius examinaverim. E contrario observavi, illos globulos, qui cute separata apparent, meram pinguedinem esse. Verum in medio mammæ, sub pinguedine, alia quædam, parva quasi mamma ex continua glandulosa substantia composita (non globosa) latet, quæ uberibus brutorum haud absimilis est. Per hanc substantiam glandulosam tubuli lactiferi, instar ramusculorum distribuuntur; atque sic vera mammarum fabrica se habet (2).

Quare vasa diaphragmatis phrenica dicantur falsam profert rationem: nam docet, ea ita vocari, quasi pertineant ad mentem; phren enim mentem significare, quæ cum putentur habere specialem communicationem. Sed planior longe est ratio; nam phrenes (φρένες) Hippocrati & aliis antiquis Medicis, teste Erotiano, etiam diaphragma

(1) Prodromo physiologico.

(2) Consentit mecum Morgagnius Advers. IV. fig. II.

phragma vocabatur : unde vasa ad illud excurrentia, *phrenica* dicta sunt (1).

Arterias cordis coronarias sub valvulis *semilunaribus aortæ* oriri, tradit p. 176. cum tamen *supra eas* oriantur, & hæc notitia magni sit momenti, ad motum cordis rite explicandum. Præterea Verheyenus cum Vieussenio affirmat, per oscula vasorum, in ventriculos cordis hiantia, *fermentum cordis* deponi, pag. 129. Verum hic sanguis venosus est, a nutritione cordis, & aliis functionibus e substantia cordis refluus, qui nulla ratione fermenti nomen meretur, quia eum fermenti officio fungi, rationibus idoneis nunquam probatum est, nec probari posse puto, cum nullum fermentationis in corde adsit vel minimum indicium (2).

Glandulam thyroideam ab utraque asperæ arteriæ parte *dependere*, & haud inepte *duas* dici, ait Verheyenus, & sic etiam eam depingit Tab. XXII. fig. 1. Verum recte scripsit Morgagnius (3), eam male pro duabus a multis haberi, cum unita sit, & crescentis lunæ figuram obtineat, cuius cornua sursum spectent, sicut in *Ephemerid. cent. VII. & VIII.* a nobis exhibita est, non deorsum, uti a Verheyeno delineatur. *Numerum annulorum asperæ arteriæ*, a larynge ad divisionem in bronchia, frequentiore esse 20. 22. aut paullo plures, asseverat p. 191. Ego in hominibus tantum 16. ad 18. vix umquam plures numerare potui; in bestiis vero longe plures adsunt. *Arteriæ bronchalis, ejusque distributionis inventorem Ruyschium*, flet Verheyenus, attamen ejusdem verbis eam describit, pag. 195. & quamvis quidem aliqui, ante Ruyschium, eam aliquo modo indicaverint (4), hic tamen ortus

B

&

(1) Vid. Lexic. Med. Brunonis sub voce *phrenes*.

(2) Conf. Boerhaav. Instit. Medic. (3) Advers. Anat. prim. §. 26.

(4) Ibid. §. 24. & Act. Erudit. supplem. Tom. VI. pag. 128.

& distributionis perspicuam descriptionem & delineationem primus dedit (1).

Sanguinem non sufficere, perhibet Verheyenus, ad nutritionem, nisi in pulmonibus materia aerea imprægnetur, atque sinistro cordis ventriculo rite fermentatus fuerit, p. 196. Receptissima vero hæc olim sententia nervose refutatur a Pitcarnio (2) & Boerhavius (3) aliisque. *Glandularum bronchialium* nullum ante se mentionem fecisse, existimat Verheyenus pag. 197. cum tamen Bartholinus (4) eas descripserit, & primam inventionem Borrichio tribuat: imo ab Hornio quoque eas jam esse demonstratas, Justus Schraderus affirmat. (5) *Glandulas epiglottidis*, quas Ruyschius jam Thesaur. Anatom. I. Tab. IV. fig. 6. lit. D. delineavit, enarrationemque *Vasorum œsophagi* Verheyenus quoque omisit.

Pilos post mortem in cadaveribus crescere perhibet pag. 210. hoc vero cum veritate ut plurimum non convenire, certissimis observationibus expertus sum; idemque Ruyschium, experientia victum, mecum sentire novi. *Pilos cutis esse sobolem*, plerique Auctores existimant; in barba vero, pudendis, aliisque quibusdam locis manifeste demonstrare possum, eos bulbis suis infra cutem ex pinguedine prodire.

Sinus duræ matris variis in locis cum venis externis capitis per varia foramina communicare, eum haud cognovisse puto, quia nihil de hoc apud ipsum invenio; & hoc tamen satis manifestum sit, usumque in Medicina habeat. Locum in cranio, quem *torcular Herophili* vocant, non indicat. Cerebri inferioris delineationem meliorem, quam exhibuit, ex Ruyschii epistola XII. sumere potuisset. *Par quintum* nervorum in duos tan-

(1) Dilucid. Valvularum lymphat. obs. XV. p. 61.

(2) Dissert. Med. (3) Instit. Med. (4) Anatom. pag. 437. Lib. 2. cap. 10. (5) In Observat. pag. 195.

tantum ramos in cranio dividi ait, p. 220. quod tamen in *tres* magnos dividit (1). A pari sexto nervos ad linguam abire, ibidem scribit, quod vero experientiæ non respondet; nam præter fibrillam, quam hoc par glandulæ pituitariæ dat, omne, quod a constitutione nervi intercostalis reliquum est, ad musculum oculi abducentem abit: (id quod etiam non indicat). De pari decimo satis perspicue haud loquitur: recte tamen eadem pagina dicit, *illud infra primam vertebram colli egredi*; sed idcirco, quia non per cranii foramina egreditur, & ab ipsa spinali medulla oritur, me iudice, rectius colli, quam cerebri nervis annumeratur; & sic, ut Nota 71. docui, melius novem tantum cerebri, quam decem, statuuntur paria. Foramen illud in cerebro, *anus* dictum, in anteriori natium parte ponit, p. 224. cum tamen anus sit in harum parte posteriori. *Eminentiarum pyramidalium & olivarium*, in principio spinalis medullæ conspiciuntur, ut & *valvulæ magnæ cerebri Vieussenii*, prorsus non meminit.

In Tab. XXIV. fig. 6. explicatione Verheyenus, ubi *glandulas corticalis substantiæ cerebri*, siue corpuscula globosa in ea exhibere vult, ait, substantiam cerebri corticalem hic repræsentari, prout NB quibusdam ope microscopii apparet; unde colligendum, ipsum suis oculis nunquam *talia globosa vel ovata corpuscula glandulosa* vidisse, sicuti etiam Leeuvvenhoeckius, Ruyschius, ego, aliique optimis microscopiis ea videre non potuimus; ideoque earum existentia si non falsa, tamen merito valde est suspecta. *Glandulæ pituitariæ descriptio* prorsus deest in Auctore nostro. De usu vero pag. 232. differens, putat eam liquorem aliquem demandare ad os, vel nares; sed nullas indicat vias, per quas hoc fiat.

B 2

Quam-

(1) Conf. Rideley of the Brain fig. III. aliique.

Quamdiu vero, viæ hæ non demonstrantur, dum nemo adhuc eas invenire potuit, frustra hoc asseveratur. Idem sentiendum de multis usibus specialibus, quos sine rationibus cerebri partibus variis tribuit.

Medullæ spinalis varia tegumenta exteriora omittit, quæ S. 274. pag. 140. descripsimus, & mox a dura matre incipit. *Musculum subcutaneum* (quem *Galenus platysma myoides* appellat) S. 321. a nobis descriptum difficulter a panniculo carnosum avelli ait, pag. 238. cum tamen nullus detur panniculus carnosus in homine. Ibidem *buccinatorum, aliosque labrorum musculos* male describit: quod fatum quoque habet *digastricus* pag. 240. In *labris, papillarum nervearum* Ruyschii nullam facit mentionem.

Pag. 242. nescio, quo jure rursus asseveret Verheyenus, *palpebrarum structuram* ingredi panniculum carnosum; cum is a recentioribus omnibus in homine negetur. *Musculus orbicularis palpebrarum* pro duobus describitur pag. 242. cum tamen revera non nisi unicus sit. *Motus oculorum*, præcipue obliquos, Auctor hic non recte explicavit; Covvperique elegantem figuram musculorum oculi ignoravit, quæ tamen, ut obiter hoc moneamus, paulo longior repræsentatur, quam par est. De *fibris muscularibus uveæ*, quæ pupillam dilatant & constringunt, nihil, aut male loquitur. Quod *tunica cornea* supra reliquum oculi globum emineat, haud commemorat; quod tamen ad visum, aliasque res rite intelligendas scitu est necessarium. *Tunica humoris crystallini ipsi dubia videtur* p. 248. quæ tamen non modo facile demonstratur: sed ejus quoque vasa jam dudum a Ruyschio Thes. Anat. II. Tab. I. f. 8. delineata sunt. *Humoris vitrei fabricam*, probabiliter *vesiculosam*, omittit. *Nervos oculi* pessime describit pag. 251. nam ad

ser-

sensum, ait, *habent oculi opticos*, qui tertium par nervorum capitis constituunt: ad motum duo paria integra, scil. secundum & tertium; quorum illud conficitur ex nervis insignis magnitudinis, qui proprie oculorum motorii dicuntur. Posteriorius vero ex nervis exiguis, a *Villifio patheticorum nomine descriptis*: qui errores revera adeo insignes sunt, ut illos satis mirari non possim: sufficiatque, me eos tantum hic indicasse. Conf. cui lubet, nostra nervorum oculi descriptio, pag. 144. §. 299. pag. 162.

Ductum, cum *Stenone* & multis aliis p. 260. & 261. statuit e naribus per palatum ad os, mox post dentes incisores superioris maxillæ, qui ordinarie satis esset manifestus: Sed hic ductus in sceleto quidem, ad cuius figuram provocat *Verheyenus*, satis manifestus est; verum in vivis & cadaveribus tam accurate clausus est, ut, ipso *Stenone* teste, ne setam transmittat. Conf. *Nota* (59 *) *Usus sinuum in ossibus cranii incertum esse*, ait *Verheyenus* p. 261. cum tamen ad maiorem tunicæ pituitariæ narium expansionem, adeoque ad meliorem odoratum facere, mihi, aliisque recentioribus nullum sit dubium. *Membrane narium*, *Schneideri* nomen non addit: quæ tamen ab aliis, & quidem recte ita appellatur, quia ab hoc primum accurate pervestigata & descripta est.

Verheyenus recentiores, qui de aure scripserunt, ut *Duverneum*, *Schelhammerum*, & *Valsalvam*, prorsus non consuluisse videtur. Nam *anthelicem auris*, etiam *scapham* appellat pag. 65. cum tamen omnibus accuratioribus *anthelix* minentiam, *scapha* vero cavitatem inter heli-
em & anthelicem denotet. Deinde *concham* vocat, quod ceteri omnes *scapham* nuncupant. *Glandulas sebaceas Valsalvæ* silet; & pag. 266. ubi *glandulas ceruminosas* describit, colorem earum omit-

tit, inventoris Duvernei haud meminit, atque figuram Duvernei, ut jam diximus, Blancardo adscribit; unde adhuc manifestius est, eum Duvernei tractatum adeo celebrem non novisse, alias verum auctorem citasset. Nec *reticulum*, cui inhærent hæ glandulæ, a Valsalva descriptum, commemorat. *Membrana tympani* convexitatem & duplicaturam non indicat. Neque *membrana in foetu tympanum tegentis*, neque *cordæ tympani*, mentionem facit. *Musculos mallei & stapedis* nusquam delineat. Ductum, sive *Tubam Eustachii*, *Aquæductum* appellat; cum tamen *Aquæductus* Fallopii longe alius sit ductus: uti Schelhammerus jamdudum, & postea etiam Valsalva aliique demonstrarunt: cujus vero descriptionem prorsus omittit. *Cochleam & labyrinthum* pessime describit, & de *canalibus semicircularibus*, de *vestibulo*, *lamina spirali*, *scalis cochleæ*, *zonis sonoris*, *portionis duræ nervi auditorii distributione*, & *nervis vertebralibus*, qui ad aurem abeunt, nihil quicquam loquitur: aitque, *se ex harum rerum descriptione confusionem potius, quam scientiam metueret*, p. 268. Ex quibus evictum esse puto, eum internam auris structuram non intellexisse; nec recentiores antea citatos auctores, nec veteres, qui de aure scripserunt, ut Eustachium, Coiterum, Casserium, Folium, unquam legisse; nam alias accuratiores delineationes & descriptiones, quam exhibuit, ex eis exhibere potuisset, aut saltem horum mentionem fecisset: verbo, auris interna pessime ab auctore nostro descripta est.

Linguae sex paria musculorum tribuit p. 271. meliorem vero ex Covvpero petere potuisset descriptionem. Nec *papillas linguae* accurate describit; *Tegumentorum vero, Vasorum sanguiferorum, nervorumque linguae* hoc in capite ne quidem mentionem fecit: id quod tamen hic fieri merito debuisset. Neque de *frenulo*, neque de *usu linguae*,

neque de gingivis, aut unguibus, vel verbum profert.

Ductum salivalem VVarthoni auctor definire scribit p. 374. in oris interiora, NB. *prope dentes posteriores*; cum tamen prope dentes *anteriores, Incisores*, juxta frenulum linguæ, in os hiet: unde suspicari licet, eum hunc etiam non cognovisse. *Musculorum uvulæ* duo tantum paria, eaque male, & sine nominibus describit. *Ossis hyoidis musculorum* confusionem facit: par *mylo-hyoideum*, a plerisque descriptum, omittit, & duo paria *genio-hyoideorum*, refragantibus optimis Myotomis, tradit. Omittit quoque *musculos occipitales*, ut & *lividum* sive *pectinæum*, femoris elevatorem, aliosque.

Prætermisimus hic, ne præfatio nostra nimis fiat prolixa, adhuc multas hallucinationes Auctoris nostri, quas in *ossibus, musculis, arteriis, venis, & nervis* committit, ex quibus demonstrari posset, eum non satis accurate anatomen tractasse; nec in Auctorum Anatomicorum cognitione bene versatum fuisse. Nihilominus tamen non possumus non adhuc paucissima ex his notare: & quidem Tab. XXX. fig. 3. *capiti infantis recens nati magnum, ut in adulto, processum mastoideum appingit*, qui tamen in infantibus adhuc deest. Deinde pag. 341. ait, *nullum musculum reperiri, per cujus solius actionem caput recta dextrorsum, aut sinistrorsum inclinaretur*: cum tamen hoc fiat per *musculos rectos laterales*, a Fallopio, Covvpero, Keilio, Pauli, & Drakio jam dudum descriptos. Pag. 356. scribit, *se musculum anconæum (cubiti extensorem) reperire nunquam potuisse, sed se eum ex aliis delineasse*; cum tamen in omnibus cadaveribus, si modo rite attendatur, facile reperiri queat: nullumque novi probatum scriptorem, qui hunc musculum unquam defecisse notaverit. *Venam azygos* nuf-

quam delineat; & pag. 376. ait, *an venæ cervicales sive vertebrales in cerebrum* (intelligit sine dubio cranium) *ascendant, mihi nondum constat: ex quo apparet, ipsum earum ingressum, per foramina peculiaria occipitis, post processus ejus condylordes, & fines nescivisse, ubi se in sinus laterales duræ matris inferant.* (Conf. Nota 68. *) Hæc tamen foramina, quod notandum, in omnibus non sunt aperta: hinc in his sanguis sinuum cerebri per venas jugulares ad cor redit, & venæ vertebrales clausæ sunt. Quandoque etiam tantum unum horum foraminum in alterutro latere patet. *Vena umbilicalis* a Verheyeno Tab. XXXIX. fig. 2. delineatur, ac duplici ramo finitur; uno, qui in venam cavam, altero, qui in venam portæ desineret; quod vero falsum; nam unico canali sive trunco in solum sinum venæ portæ desinit, & ex hoc demum sinu in fœtu canalis peculiaris ad venam cavam transit; quem Verheyenus pro altero venæ umbilicalis ramo forte habuit. Conferatur id, quod in Ephem. Cent. V. & VI. pag. 236. de hac vena & ductu scripsimus, ut & fig. 12. Tab. nostra III. exhibita.

In priori editione, cap. de Cerebello, Verheyenus scripserat, *arterias vertebrales ad medullam oblongatam appellari, non per magnum occipitis foramen, sed per foramen aliquod minus, anterius a latere istius magni foraminis*; hunc vero errorem, cum An. 1707. apud ipsum Lovanii essem, in familiari colloquio, cum sermo his de partibus fieret, ei amice indicavi, easque arterias omnino per ipsum magnum occipitis foramen cerebrum adire asseveravi; atque inveni postea, eum hunc lapsum in posteriori editione emendasse. *Singulares vero flexus arteriarum carotidum & vertebraliū*, antequam cranium intrant, qui in Drakii Tab. XX. egregie repræsen-

tan-

antur, & arteriis, cera repletis, facile observari possunt, noster quoque Verheyenus, ut & Wlangetus, prorsus omiserunt.

Cum igitur tot tantique defectus & errores in Verheyeni Anatome adsint, nullum fere hominem æquum existimo, qui hunc nostrum laborem, utilitatis publicæ causa susceptum, damnaturus sit, quo defectus illos ex recentissimis Auctoribus, propriaque mea experientia supplere, & errores emendare studui. Atque hoc ipso me studiosæ juventuti non inutile officium præstitisse confido: dum in hoc compendio scientiam anatomicam, alias valde prolixam, in idoneam epimen ita redigere allaboravi, ut commodissime in Academiis pro usu studiosæ juventutis adhiberi queat. Etenim præmissa generaliori anatomies notitia, ac subjuncta brevi Ossium doctrina, quæ fundamentum & sustentaculum sunt reliquarum corporis humani partium, ad partes molles progressum feci: ubi prius tegumenta corporis communia, brevibus in *tabellis*, (ut vocant,) explicavi. Deinde eadem methodo partes abdominis, thoracis, & capitis, ac tandem arterias, venas, nervos, & musculos exposui: in quarum omnium descriptione rem ita dirigere studui, ut alterumque singulam partem organicam una in pagina, vel in duabus, e regione sibi positis, explicaverim: quo juvenes, sub uno quasi aspectu, intueri queant, quid in qualibet parte notandum occurrat: quod ad attentionem excitandam, memoriamque tyronum adjuvandam quamplurimum confert. Aliquoties tamen etiam plures paginas, pro rerum circa partes nonnullas dicendarum commoditatem, adhibere coactus sum; quas tamen ita distribui, ut non facile confusionem pariant, formamque hanc libri præ majoribus elegi, ut sit æstabilis, atque usus commodioris.

Quamvis vero paucis sæpe verbis me expedi-

verim, tamen ea pro indice & norma, dicendorum & discendorum commodissima, sufficere observavi. Nam cum pro collegiis, ut vocant, & demonstrationibus anatomicis hic libellus potissimum sit compositus, ubi breviora non solum oratione, sed & demonstratione illustrantur, & prolixiores libri juvenibus haud adeo commodum ac sæpe nauseam creant, satis inde patebit brevitatæ ratio: quam tamen tantam non esse putato, ut auditor & spectator attentus rem indicatam, aut breviter descriptam, inde intelligere non possit.

Conscribere vero jam cœpi hocce compendium annis mei tyrocinii anatomici, sed verbis brevissimis, & solum pro meo usu, ex ipsa Verheyeni anatomia, tanquam tunc temporis usitatissima, ut in sectionibus & inquisitionibus cadaverum breviter atque in epitome mox perspicere possem, quænam quavis in parte, quam pervestigaturus eram, inquirenda essent; & si deinde in Auditorum lectione, aut cadaverum sectione, aliquid offenderam, quod in Verheyeno & tabulis meis non aderat; vel aliter, quam ab ipso descriptum erat, observaveram, illud notavi, tabulisque meis addidi; atque sic sensim, ob rerum additarum copiam, in majorem molem, quam ab initio erat, accrevit, aliamque tandem prorsus faciem assumsit.

Hoc deinde, cum anatomen alios docere inciperem, adhuc majori mihi fuit usui; nam, toties, quoties sectionem & demonstrationem aggreffurus eram, tabulam partis demonstrandæ cogitare percurrebam; sic deinde investiganda & demonstranda facilius in memoria habebam, eaque leviori opera exhibere poteram.

Tandem, quia hæc methodus mihi in accurata anatomæ cognitione comparanda multum profuerat, nolui eam invidere auditoribus meis
eam.

namque per aliquot annos describendam ipsis concessi; ne tam multa ad Verheyenum, vel illium Auctorem, annotare necesse haberent; iisque tabulis, tam pro commoda repetitione, quam pro norma, si quando ipsi in sectionibus sese exercerent, felicius uti possent.

Denique vero, ut ipsos a describendi tædio liberarem, præsertim cum sæpe in describendo multos committerent errores; ipsorum desiderio, decrevi, totum hocce compendium typis mandandum; id quod etiam An. 1715. incepti, atque An. 1717. primum absolvi. Cum vero hic labor ab eruditissimis non male fuerit susceptus, atque exemplaria primæ editionis brevi distracta fuerint, Bibliopolæ rogatu, alteram editionem, & post aliquot annos tertiam, prioribus longe auctiorem & nitidiorem edidi, eique figuras aliquot novas nearum potissimum observationum adjeci. Hanc vero quartam editionem, maxima sanæ industria adhuc longe auctiorem atque emendatiorem redere studui; quemadmodum eruditi facile agnoscunt.

Quapropter non dubito, hocce jam compendium adhuc majoris utilitatis esse posse, quam antea; dum non solum majori perspicuitate illud digessi, sed etiam omnes rursus novos Auctores, quos obtinere potui, pervolvi; omniaque, quæ in eis scitu digna esse inveni, in illud transtuli; quod profecto in tanta scriptorum rerumque investigandarum copia sine magno labore fieri non potuisse, quivis facile cognoscet; præsertim cum pauca pro veris descripserim, quæ non ipse in cadaveribus humanis prius exploraverim, & vera esse invenerim. Eo autem ipso non solum artium Studiosis & tyronibus Medicinæ, sed etiam forte doctioribus & in primis etiam anatomes Professoribus usui esse potest, qui vel in compendio res, in anatome hucusque cognitæ, nos-

nosse, vel eas ipsi docere desiderant. Quam o-
 causam Auctores recentiores, qui anatomen suam
 observationibus locupletarunt, & Verheyeno igno-
 ti, vel saltem citati non erant, in recentiorum
 observationum novarum plerumque citavi, ut
 sic ii, qui prolixiorum earum rerum notitiam
 expetunt, eos ipsos evolvere queant.

Denique etiam huic editioni iterum *Adenologiam*, ac deinde *notas*, *indicemque rerum* locu-
 pletissimum addidi, ut sic totius anatomies como-
 pendium sit perfectius, & tanto majori utilitati
 esse queat. In *Adenologia* haud perfunctorie ma-
 teriam de glandulis, hodie adeo controversam
 pertractavi; & quæ partes pro glandulis habende
 dæ, & quæ e glandularum censu proscribendæ
 idoneis, ut spero, rationibus indicavi. In *notis*
 ad calcem rejectis, loca varia obscuriora, dubia
 vel nova; præsertim ubi ob tabularum rationem
 brevior esse coactus fui, illustravi & prolixius
 descripsi, controversias modestè excussi, res, quæ
 mihi incertæ aut falsæ visæ sunt, emendare stu-
 diui, & quid circa eas observaverim, candidè
 aperui. Quæ vero quia debita modestia ubique
 a me peracta sunt, spero neminem se a me ini-
 que offensum esse jure conqueri posse: nam uti-
 litatis publicæ causa res dubias & errores teti-
 gi; ut vel auctores ipsi, vel alii res, quæ mihi
 dubiæ, aut falsæ visæ sunt, vel melius demon-
 strare, vel, si erratum fuerit, errores emenda-
 re velint.

Postremo, quæ de Mangeti Theatro anatomi-
 co in præcedenti editione monui, hic repetere
 nolo. Hoc tamen, opere illo penitus perspecto,
 asseverare possum, me plus laboris in hoc parvo
 conficiendo libello impendisse, quam *Mangetus* in
 vastis suis voluminibus adhibuisse videtur; quip-
 pe in quibus sacram disciplinam anatomicam,
 prout fere res in mentem & manus inciderunt,

(si ni-

si nihil dissimulare volumus) sine justo eorum
 examine, sine prudenti selectu, &, quod præ-
 pium, sine manuum ad cadavera applicatione,
 & aliis, & quidem non semper optimis, cum
 gravissimis sæpe illorum erroribus, exscripsit, ut
 el. Morgagnius, in doctissimis suis Adversariis,
 quamplurimis docuit exemplis, & adhuc pluri-
 us, si opus esset; ostendi posset, imo ne uni-
 am figuram, aut inventum novum, suo Marte in
 toto amplissimo opere protulit. Unde apparet,
 lud *Verbeyeno*, qui pluribus scatet erroribus,
 aud præferendum, parvumque propterea hocce
 compendium, in quo innumeri horum errores
 correcti, defectusque suppleti, majori usui esse
 posse. Vale, Lector benevole, meisque labori-
 bus fave, iisque cum fructu utere; donec forte
 aliquando major nostra Anatome, vel alia per-
 fectior prodeat.

NOI RIFORMATORI

Dello studio di Padova

COncedemo licenza a Sebastiano Coleti stampatore di Venezia di poter ristampare il Libro intitolato *Heisteri Compendium Anatomicum*, stampato in Venezia l'anno 1737 presso Sebastiano Coleti con licenza de' Superiori.

Data li 21. Agosto 1742.

(Alvise Mocenigo 2. Ref.
(Zuane Querini Pr. Ref.
(

Agostino Bianchi Seg.

Registrato in Libro a carte 47.

Alvise Legrenzi Seg. contro la Bestem.

LAURENTII HEISTERI COMPENDIUM ANATOMICUM.

DE ANATOME IN UNIVERSUM.



ANATOME, sive **ANATOMIA**, *Anato-*
est *ars*, quæ docet situm, figu-
ram, nexum, fabricam, actio- *me*
nem, & usum partium corporis *quid?*
humani.

2 **OBJECTUM** ejus *primarium* est corpus hu- *obje-*
anum; *secundarium* vero quævis *alia animalia*: *ctum.*
per hæc illud accuratius cognoscatur, & ut
quandoque defectum cadaverum humanorum sup-
pleant. Vocatur hæc bestiarum anatome, *zooto-*
ia, sive *Anatome comparativa*. (1)

3 **SUBJECTUM** anatomes est Vir, cadave- *subje-*
humana & bruta recte disseccandi, perspicue- *ctum.*
re demonstrandi peritus: ut spectatores inde par-
tum posituram, communicationem, structuram,
tionem, & usum rite addiscere queant; voca-
turque talis, *Anatomicus*, aut *Prosector*.

4 **MEDIA**, quibus *Anatomicus* hæc perficit, *media.*
sunt præcipue *sectio*, sive *cadaverum incisio*, *mi-*
scopia, *injectiones*, *aliaque instrumenta*, de qui-
bus mox seorsum dicemus. Media vero, quibus
scientes habitum in hac sibi comparare possunt,
1. diligens observatio, quando anatomici e-
xercitati cadavera incidunt; 2. imitatio, tam in
be-

1) De hac videri merentur M. A. Severini *Zootomia*
mocritea; Blasii *Anatome Animalium*; Collins *Anato-*
; *Dissectiones anatomicae* variorum animalium Parisiis
instituta: Valentini *Amphitheatrum Zootomicum*.

bestiis, quam in hominibus; 3. bonorum scriptorum lectio.

5. Horum primarii & quasi principes sunt, & antiquioribus, Galenus, Vesalius, Carol. Stephanius, Eustachius, Ingrassias, (nimirum respectu scriptorum anatomicorum) Columbus, Fallopius, Coiterus, Vidius, Varolius, Valverda, Fabricius ab Aquapendente, Bauhinus, Spigelius, Casserius, Laurentius, Asellius, Laurentbergius, Pavius, Casp. Bartholinus Pater, M. A. Severinus, Casp. Hoffmannus.

6 *Ex recentioribus*, Harveus, Veslingius, Ricclanus filius, VVarthonus, Glissonius, Pecquetus, VVillisius, Lovverus, Highmorus, Needham, Marchetti, Molinettus, Diemerbroeck, Kerkringius, Blasius, Steno, Malpighius, Bellinus, Rolfincius, Schneiderus, Hornius, Graafius, Svammerdam, Thom. Bartholinus, Rudbeckius, Lyserus, Gagliardus, Peyerus, Bourdonus, Drelincurt, Nuckius, Haverus.

7 *Ex recentissimis* Ruyschius, Bidloo, du Verneus, Bohnius, Brunnerus, Vieussenius, Ortlobius, Verheyenus, Schelhamerus, Jo. Mauricius Hoffmannus, Dionis, Covvperus, Riddleus, Casp. Bartholinus nepos, Keilius, Hovius, Morgagnius, Valsalva, Palfinus, Douglassius, Drakius, Fantonus, Pacchionus, Bianchus, Vercellonius, Cheseldenius, Arent Cant, Noguez, Santorinus, VVinslous, Albinus, Garengot. Quibus adhuc jungi possunt Anatomici, brevitatis causa hi non nominati: quorum scripta in *Mangeti Bibliotheca & Theatro anatomico* continentur; itemque observationes novæ anatomicæ, quæ in *Ephemeridibus Gallorum, Anglorum, Italorum* atque *Germanorum*, subinde prodeunt. Plures quoniam nosse desiderat scriptores anatomicos, evolva *Gælickii Historiam Anatomix, Jacobi Douglassii specimen Bibliographiæ anatomicæ, & Orationem*

nem nostram de *incrementis anatomes* in hoc
 sæculo XVIII. anno 1720. Helmstadii evul-
 gatam.

8 FINIS anatomes multiplex est: *primarius* ^{*finis*}
 tamen est operum mirabilium Supremi Numi- ^{*primari-*}
 is in corpore humano cognitio & admiratio: ^{*us.*}
 cum artificiosissimæ fabricæ contemplatio, par-
 tium admiranda figura, connexio, communica-
 tio, actio, & usus, Creatoris non solum existen-
 tiam, sed & immensam & stupendam sapien-
 tiam manifestissime contra Atheos demon-
 rent, & ad cultum ac venerationem ejus invi-
 tent; ideoque *finis primarius Anatomiae gloria Dei*
est. Atque hoc sensu *Anatomia Philosophica*, aut
physica, imo *Theologica* vocari potest, omnibus
 veræ sapientiæ ac Theologiæ cultoribus utilissima.

9 *Fines secundarii* plures sunt: inter quos pri- ^{*secun-*}
 mum ponimus *sanitatem*, (quem alii *primarium* ^{*darius*}
 constituunt) thesaurum in hac vita maximum, ^{*primus.*}
 et cognita vite fabrica corporis humani, sanita-
 tis tanto melior cura haberi queat, & morbi fa-
 cilis præveniantur, citiusque & melius curen-
 tur: a quo fine *Anatomia medica* audit.

10 Deinde, si jussu Magistratus cadavera, ad ^{*alter.*}
 iussus mortis violentæ, vel suspectæ inquiren-
 tas, aperienda, ut inspectionis vera relatio, at-
 que aptum iudicium dari possit: utrum scilicet
 mortuus ex plaga inflictâ veneno, aliave causa
 violenta interierit; an ob causam aliam, sive
 externam, sive internam, mortuus sit: quod pro-
 pter hoc sine accurata Anatomes cognitione fieri non
 potest. Atque hanc *Anatomiam, forensensem & ju-*
dicam appellare possumus, & propterea non
 solum Medicis & chirurgis, sed etiam Jurecon-
 sultis sane perquam utilem: qui ea ipsa quoque
 agacius de impotentia, de arcta & sterili, causâ
 divortii, iusto partus tempore, abortu, par-
 tissimulato, vitalitate foetus, infanticidio, vul-

neribus lethalibus, aliisque casibus medico-legalibus dictis, indicare & pronunciare poterunt. (a)

tertius.

11 Tertio: quando *cadavera morbis defuncta diffecamus*, ob causas morborum & mortis investigandas: quam *Anatomiam practicam* vocant; quia in praxi medica magnam habet utilitatem, dum multæ abditæ morborum causæ ea detectæ sunt, & adhuc subinde deteguntur, quæ alias latuissent; quo ipso dein facilius agnoscuntur & felicius curantur: exemplo *calculi vesicæ, empyematis, ascitis, herniarum, suffusionis sive cataractæ, glaucomatis, trepanationis, colicæ, & multorum aliorum.* (b)

*Anatome quo-
suplex.*

12 Hinc ob varios fines Anatomia alia *philosophica, physica, aut theologica*; alia *forensis, medico-legalis aut juridica*; alia *medica*, dici potest. Præterea alia *Anatomia speculativa sive theoretica* audit; quando quidam ex inspectione cadaverum, dum alii prosecant, aut ex libris, fabricam corporis humani addiscunt, quantum pro scopo suo unicuique sufficit; & tales *Anatomici theoretici* vocari possunt: quo sensu multi anatomici scire dicuntur, qui tamen sectione cadaverum nunquam occupati fuerunt; neque sectionem, ut ars culta requirit, vel ob nauseam aut horrorem, aliamve ob causam; instituere recte valent. Quando vero cadavera incidendo, partes artificiose resolvendo, præparando, atque peryesfigando nos exercemus, *Anatomia practica aut exercitata* vocatur; talesque, qui hanc artem calant, *Anatomici practici* appellantur.

*Utilitas
ejus.*

13 Unde patet, *utilitatem Anatomæ* esse ingentem, neque solis Medicinæ cancellis inclusam; verum ejus scientiam Theologis, Jureconsult-

(a) Haud pridem Dissertationem habui de *Medicinæ & cum primis Anatomæ utilitate in Jurisprudentiâ*: ubi longe plures adhuc utiles demonstravi.

(b) vid. *Beneti Sepulchretum anatomicum.*

sultis, & Philosophis valde esse utilem. Medicos vero & Chirurgos salva conscientia ea carere non posse, certum est, si artem, quam profitentur, non in detrimentum generis humani, sed vite exercere cupiunt: nam, quod navis gubernatori pyxis nautica sive acus magnetica, in his est notitia anatomica; quicquid etiam ignari & malevoli quidam obganniant, atque in utilissimæ ac divinæ hujus artis opprobrium calumniæ annitantur.

DE INSTRUMENTIS ANATOMICIS.

14 Quia vero in arte anatomica INSTRUMENTIS, ut supra dictum est (§. 4.), ^{Instrumenta} care-
re non possumus, dum sine his sectio, resolutio, per-
scrutatio, ac demonstratio partium fieri ne-
quit; idcirco idoneis *Anatomicis instrumentis de-*
bet esse instructus: quorum quidem Anatomici
quamplurima excogitarunt; ex quibus tamen se-
quentia nobis sufficere videntur.

15 Primo *tabula* vel *mensa Anatomica*, pro ca-
vare imponendo. Dein *asser* vel *tabula sectio-*
bus vivorum animalium accommodatus, & fu-
er pro his ligandis. Postea *cultri* sive *scalpelli*
quot recti, uno tantum latere secantes, (nam
incipites, curvos, aliosque in anatome vel su-
perfluos, vel saltem minus reliquis idoneos exi-
mo) minores & majores, subtiliores & robu-
iores. Porro *forfex*, *volsella*, *forceps*, *hamuli*,
ali diversæ crassitie, & *setæ* requiruntur, pro
tibus partium quarundam explorandis: item
us rectæ & curvæ, cum filo fortiore, pro usu
rio; ut & *aciculæ capitatæ* majores & robu-
iores. Præterea *serra*, *scalpra*, vel *cunei* cum
ava aut *malleo*, atque *elevatorium* pro cranio
periendo. *Tubuli* quoque diversæ magnitudinis,
o vasis, ductibus, vesica, ventriculo, intesti-

nis & pulmonibus inflandis: quæ ultima tamen *folle* idoneo commodius distenduntur.

16 Tandem & *microscopia*, pro partibus minoribus accuratius pervestigandis, utiliter adhibentur; itemque *magni siphones*, ex ære vel flanno confecti, quorum minimum duo requiruntur, cum tubulis diversæ magnitudinis & diametri, quorum alter pro ceracea materia, alter pro aliis liquoribus injiciendis inserviat. *Tubulus* vero singularis ferreus, pro argento vivo in vasa immittendo, quoque necessarius est. Denique *spongia* pro effusis humoribus absorbendis, sordibusque detergendis; *cos olearis* & singulare *corium* pro cultris acuendis; *terebræ*, variæ magnitudinis, aliave instrumenta, ad ossa perforanda; *fila ænea*, *tenaculæque* pro sceletis conficiendo sive extruendo, requiruntur. *Ultima antilia pneumatica* in replendis vasibus, aliisque usibus, pulchre inservire potest. Imo in ipsa sectione *Anatomicus præcinctorio* & *manicis*, ad fordes a vestibulis avertendas, carere nequit; sic & *ollæ*, *patinæ*, aliaque utensilia, pro *Anatomici* genio, commoditate, & curiositate, variæ sæpe necessaria sunt.

DE EXTERNIS CORPORIS HUMANI APPELLATIONIBUS AC DIVISIONE.

Externa corporis appellationes. 17 His descriptis, antequam ad ipsas corporis humani partes examinandas pergamus, utile esse duximus, primum *de externis corporis humani appellationibus agere*: ubi autem non communissimas & omnibus e vulgo notas; nec eas, quæ in speciali partim pervestigatione, ut in oculo, naso, aure &c. indicandæ atque explicandæ occurrunt; sed tantum difficiliiores, & non omnibus cognitæ, hic enarrabimus; de reliquis suo loco.

18 Dividitur vulgo ab anatomicis corpus humanum in truncum & artus, sive extremitates. divisio
 Truncus constat ex capite, collo, thorace, & abdomine; artus vero sunt vel superiores vel inferiores: illi, brachia sive manus; hi pedes vocantur.

19 In Capite notanda primo, pars capillata, & non capillata, facies dicta: deinde *inciput*, *occiput*, *tempora*, *vertex*, *bucca*, *mala*, *philtrum* seu *lacuna*; reliquæ omnibus notæ. In collo jugulum, pomum Adami, cervix. In thorace præcordia (a), dorsum. In abdomine, scrobiculus cordis, regio epigastrica, hypogastrica & umbilicalis, hypochondria, regio iliaca, lumbi, inguina, pubes, perinæum, regio ischiatica.

20 In artubus superioribus; humerus, axilla sive ala, brachium, cubitus, carpus, metacarpus, vola, & dorsum manus, digiti. In inferioribus; femur, genu, crus sive tibia, malleoli, arsus, metatarsus, planta, & digiti.

DE PARTIBUS SIMPLICIORIBUS.

21 Possemus quidem jam ordine ad tegumenta *Partes corporis communia*, & inde ad interiores partes *solidæ* progredi; verum quia tyrones partes *simpliciores* compositas melius intelligent, si prius *simpliciorum* ideam habeant, hinc hoc loco de his primum acturi sumus.

22 Omnes partes nostri corporis vel *solidæ* sunt, sive *continentes*, vel *fluidæ*, sive *contentæ*.

C 3

(a) Quid per *præcordia* recte intelligatur, inter auctores non convenit; vid. *Fabri Lexicon*. Mihi denotat anteriorem Thoracis regionem: partim vi vocis, quasi diceret, partes præ corde sive ante cor: partim ex *Celsi præfat. pag. 1.* ubi ait, crudele, vivorum hominum alvum atque *præcordia* incidi, aliisque ejus locis plurimis: itemque ex *Virg. Æneid. redit in præcordia virtus*; ubi ab utroque pro thorace sumitur.

1æ. **SOLIDÆ** rursus in **SIMILARES** aut simpliciores, & **DISSIMILARES** sive compositas, aut organicas dividi solent. Ad *similares* sive *simplices*, si recte loqui velimus, non nili *fibræ* pertinerent, ex quibus omnes reliquæ partes mirabili artificio sunt compositæ: attamen latiori sensu Anatomici etiam huc referunt omnes partes sequentes, ad sensum quasi *simplices* sive *similares*, id est reliquis organicis, ut digito manus, corde, pulmone &c. simpliciores: dum illæ, licet non ubique omnes, ad harum compositionem concurrunt. Tales sunt: arteriæ, venæ, nervi, membranæ, ligamenta, muscoli, tendines, pinguedo, vasa lymphatica, vasa lactea, ductus excretorii, ossa, cartilago, ungues, pili, glandulæ; reliquas partes solidas ad *dissimilares* seu *organicas* referunt: easque rursus in *nobiliiores* & *ignobiliiores* dividunt, prout majorem aut minorem usum sive necessitatem ad vitam obtinent.

fibræ. 23 *Fibra* est pars simplicissima, tenuis, instar fili subtilis, ad omnium reliquarum partium constructionem destinata. Hinc quædam fibræ sunt duræ, ut osseæ; reliquæ in ceteris partibus molliores. *Ratione situs* sunt vel rectæ, vel obliquæ, vel transversæ, annulares, spirales: prout partium conformatio & usus hoc requirunt.

arteriæ. 24 *Arteriæ* sunt canales sive vasa elastica, pulsantia, conica, sensim angustiora, tandem minutissima, sanguinem ex corde ad omnes reliquas partes deferentia. *Venæ* vero vasa instar coni inversi, non pulsantia, sanguinem, aliosque humores, a partibus ad cor reducuntia.

nervi. 25 *Nervi* sunt partes albicantes, teretes, specie filorum absque manifesto cavo, a cerebro & medulla spinali ad omnes corporis partes

res extensæ, sensui, motui, & nutritioni inter-
vientes.

26 *Membranae* sunt partes ad similitudinem *mem-*
lintei vel chartæ expansæ, ex variis filamentis *branæ*,
& vasculis compositæ, & variis usibus destina-
tæ. *Tunicæ* a membranis haud differunt. *Liga-* *tunica;*
menta quoque pleraque vix nisi usu ab eis di- *liga-*
stincta sunt, & præsertim ubi partes, præci- *men-*
pue ossa, firmiter conjungenda, hoc nomen *tum.*
accipiunt. Dantur tamen etiam ligamenta quæ-
dam nervis vel tendinibus fere similia, quasi
teretia, & a membranis diversa, ut in femoris,
tibiæ, & patellæ juncturis.

27 *Musculi* sunt partes illæ corporis rubicun- *muscu-*
dæ, quas *carnes* vocamus, ex fibris contractili- *lus,*
bus & vasis constantes, instrumenta motus con-
stituentes. *Tendines* vero sunt horum partes al- *tendo &*
bicantes continuæ, firmiores & tenaciores, ex *aponev-*
trema illorum maxime constituentes; quæ si *rosæ.*
membranae aut lintei in modum sunt expansæ,
aponevroses appellari solent.

28 *Pinguedo* est substantia crassa, oleosa, in *pingue-*
cellulis membranaceis ubique fere in corpore a *do.*
sanguine secreta & collecta, usibus variis dica-
ta; a qua *medulla ossium* vix nisi loco & subtili-
tate differt (a). *medul-*
la.

29 *Vasa lymphatica* sunt canaliculi subtiles, *vasa*
pellucidi, liquidum tenue, fere aquosum, a *lympa-*
quamplurimis partibus more venarum versus *rica &*
cor revehentes. *Vasa lactea* vero sunt similes *lactea.*
canaliculi, in intestinis & mesenterio tantum
existentes, chylum, id est, liquidum lactei co-
loris, ab alimentis digestis oriundum, ex inte-
stinis suscipientes, & per mesenterium ad pecu-
liarem

C 4

(a) Posset quoque pinguedo ad partes fluidas referri, si
in vivis oleosum sine cellulis in abstractu consideraretur:
quia vero in anatome solida reperitur, & una cum cellulis
consideranda, eam solidis annumerare malui, & a variis
etiam ad eas refertur.

liarem ductum deducentes: hinc species sunt venarum.

Ductus excretorius.

30 *Ductus excretorii* dicuntur carnales, liquidum, in certis glandulis aliisque visceribus secretum, suscipientes, & in destinata loca excernentes.

Ossa Cartilaginea.

31 *Ossa* sunt partes corporis durissimæ, albæ, sensus expertes, fulciendis, defendendisque molibus destinatæ. *Cartilaginee* vero vocamus partes ossibus analogas, flexiles, lubricas, & elasticas, nihil plerumque, vel parum medullosum continentes, varios usus præstantes.

Ungues.

32 *Ungues* ad cartilagineas aliquo modo accedunt, suntque laminæ, quasi corneæ, extremis digitorum manuum & pedum impositæ.

Pili.

Pili sunt filamenta variis in partibus corporis, præsertim vero in capite, longe extra cutim propullulantia.

Glandulae.

33 *Glandulae* sunt partes peculiaris habitus (a), (sive, ut veteres dixerunt, *peculiaris caro*) ex congerie minutissimarum arteriarum, venarum, nervorum, & plerumque etiam ductu excretorio conflatae, propria membra cinctæ, variæ figuræ, coloris, & consistentiæ; usibus diversis, ut plurimum tamen secretioni alicujus liquidi destinatae. De omnibus vero his partibus similaribus suo loco plura.

Partes fluidae.

34 *Fluidae* sive contentæ, sunt *chylus*, *lac*, *sanguis*, *serum*, *lympha*, *spiritus*, *saliva*, *mucus oris*, *bilis*, *liquor pancreaticus*, *ventriculi*, *intestinorum*, *œsophagi*, *cerebri*, *oculorum*, *thoracis*, *pericardii*, *abdominis*, *tunicæ vaginalis testium*, *genitura sive semen cum liquido prostaticum*, *mucus narium*, *tonsillarum*, *articulorum*, *urethræ*, *uteri*, *vaginæ* & *tubarum uteri*; hu-

mor

(a) Vid. hac de re Dissert. sub præsidio nostro Altorfii habita, de vera *Glandula* appellatione; vel infra *Adenologiam* nostram.

por ovulorum & cui fœtus innatat : cerumen aurum, urina, sudor.

35 Dividi solet doctrina anatomica in Osteologiam, quæ duriorum, & Sarcologiam, quæ mollium partium naturam explicat. De prioribus primo agere consultum ducimus, quia fundamentum & quasi basim præbent posterioribus, utpote quæ melius post eorum cognitionem intelligi possunt.

DE OSTEOLOGIA,

& quidem primo

DE OSSIBUS IN UNIVERSUM,

36 **Q**ui corporis humani perfectam cognitionem desiderat, ante omnia exactam ejus Ossium sibi comparet notitiam.

37 *Objectum osteologiæ* sunt ossa (S. 31.) exsiccata & recentia, adultorum & infantum : quo *Objectum.* *periostrum, medulla, ligamenta, & cartilagine* pertinent.

38 *Compages* aut conjunctio artificialis ossium *skeleton.* naturali similis, vel etiam connexio eorum per ligamenta naturalia, ablatis carnibus & membranis sine coctione, *sceletus* vel *skeleton* appellatur; atque hoc quidem naturale, illud artificiale.

39 Considerantur ossa vel *theorice*, vel *practice* ; priori modo, si tantum conformationem *Consideratio duplex.* externam & usum eorum perpendimus ; posteriori vero, si 1. ad interiora lustranda diffringuntur ; 2. si ad articulorum structuram noscendam, ligamenta circa juncturas in cadaveribus dissectantur ; & 3. si ad conservationem, aut *skeleton* extruendum, præparantur.

40 *Substantia* ossium considerari potest vel *chemice* *substantia.*

nice, vel anatomice; hoc, in embryonum infantum; illud, in adulatorum ossibus, melius peragitur.

Confide-
ratio
chemi-
ca.

41 Si examini *chemico* in retorta subjiuntur observatis ignis gradibus, producuntur *aqua sal, spiritus, oleum*, remanent substantia terrena in retorta, figuram ossium adhuc retinente, sed fragili; spiritus vero rursus in aquam & oleum resolvi potest; hinc ossa ex quatuor constat principiis, sive elementis, arctissime in duratilem substantiam compactis.

Confide-
ratio
anato-
mica.

42 Si *anatomico* cultro examinantur, primum in generationis principiis *membranas* molles æmulantur (a), quæ ex variis fibris & vasis subtilissimis sunt compositæ, a quibus suum incrementum & nutrimentum capiunt. Hæ fibræ & membranae, lymphæ in eis inspissata, sensim fiunt duriores & quasi cartilagineæ, atque lamellæ componunt: primis vero lamellis varia deinceps nova fibrarum & lamellarum sensim inducuntur strata sive plana (b), quæ tandem firmiora reddita, & ope fibrillarum obliquarum, transversarum, claviculis quasi similium (c), arctius compacta, os tandem constituunt: quod, quo crassius, eo plures fibræ & lamellæ sibi invicem incumbunt, foraminula & interstitia relinquentes recta, obliqua, longitudinalia, transversa, succo pingui medullosa repleta (d).

Differen-
tia.

43 Differunt ossa quantitate, cavitatibus, figura, & usu, ut ex specialiori consideratione manifestum erit; sed antequam ad hanc accedamus, *generalia* adhuc *quædam* de ossibus præmittamus, necesse est.

44 In

(a) Vid. *Harveus* de Gener. animal. Exercit. LV. *Kerkring*. Osteogenia fœtus. *Ruysschius* Theaur. Anat. VI. Tab. I. II. & III.

(b) *Malpighius* Anatome plantarum.

(c) *Gagliardi* Anat. ossium part. I. cap. obs. II.

(d) *Havers* Osteologia.

44 In quovis osse considerata occurrunt 1. os *Genera-*
 tum, 2. cavitates in eo occurrentes, 3. ossium *lia de*
 conjunctiones, & 4. usus. *ossibus.*

45 In osse ipso consideramus tria, 1. corpus
 ossis, quod *diaphysis* audit Galeno (a); 2. apo-
 physes; 3. epiphyses.

46 *Diaphysis*, sive corpus ossis, dicitur pars *diaphy-*
 sis principalis & maxima, quæ in pueris pri-
 mum indurescit, & reliquarum quasi fundamen-
 tum est. Adeoque ejus substantia tam externe,
 quam interne probe considerata est, ut de na-
 tura ejus tanto melius judicare valeamus.

47 *Apophysis* est ossis protuberantia sive excre- *apophy-*
 scentia ex corpore (46) enata, cujus vera pars *sis.*
 est continua, uti ramus pars continua arboris,
 interea tamen ejus substantia semper magis spon-
 siosa est, quam reliqui ossis.

48 Varia hæc habet synonyma: nam proces-
 sus, prominentia, protuberantia, eminentia, tu-
 berculum, tuberositas &c. idem (47) fere signi-
 cant Anatomicis.

49 Ob varium situm, usum, & figuram, va-
 ria recepit cognomina; alia enim coracoides,
 mammillaris vel mastoides, glenoides, coronoi-
 des, styloides, condyloides, pterygoides, odon-
 toides, sive dentiformis, anchoroides, spinosa,
 recta, obliqua, transversa superficialis &c. di-
 citur; quædam caput, collum sive cervix, con-
 cylus, corone, spina, supercilium vel labrum,
 trochanter &c. appellatur; ut speciali ossium de-
 monstratione indicabuntur singulæ.

50 Usus apophysium generalis est 1. ad me-
 iorem articulationem facere, sive ea sit cum
 vel sine motu, 2. musculis originem & insertio-
 nem præbere commodiorem, eorumque sæpe
 vim augere, 3. defendere alias partes. Spe-
 cialis vero usus in privato ossium examine in-
 agabitur.

51 Epi-

(a) Administr. anat. V.

epiphy-
sis.

51 *Epiphysis* (45) est officulum ossi majori v. principali (46) interventu cartilaginis adnatum, cui in junioribus non est continua, sed mediante cartilagine tantum contigua: hinc etiam ossis *appendix* dicitur.

52 Præcipua circa epiphyses notanda sunt; 1. in Infantibus eas omnes esse cartilagineas; quæ quidem sensim indurescunt, attamen semper spongiosæ manent. 2. Plerasque in adultis degenerare in apophyses. 3. Non concrecere per planam superficiem, sed per inæqualem, sive mutuum ingressum cum corpore ossis. 4. Earum conjunctionem & naturam melius patere in juniorum ossibus, quam adultorum. 5. Circa hunc coalitum corpus ossis quoque esse spongiosum & tenerrimum.

53 *Usus epiphysium* (51) in adultis & infantibus varius est.

54 *In adultis* 1. Ossibus medullosis pro operculo esse videntur, ne medulla effluat, aut nimis facile transfudet. 2. Fabricæ articulationum cum motu amplitudine sua famulantur, ut motus certior esse possit. 3. Cellulis suis conferunt ad levitatem ossium. 4. Prominentiis suis circa tendines vim musculorum augment. 5. Musculorum extremitatibus locum insertionis ampliorem præbent. 6. Ligamentis, quæ articulationibus inserviunt, firmiorem cohæsionem largiuntur, & introitum concedunt vasis sanguiferis.

55 *Usus in infantibus* sunt; 1. ut hi ob molliem epiphysium in utero melius complicari, & in angustiori spatio contineri queant. 2. Ut ossa, quamdiu homo crescit, commodius elongari, & ad debitam magnitudinem extendi possint. 3. Ut in pueris impediunt frequentiores fracturas, quæ alias sæpius & facilius acciderent in frequenti ipsorum lapsu.

cavita-
tes.

56 *Cavitates* (44) aliæ articulationum gratia factæ

Etæ sunt, aliæ vero ob alias causas. Priores
 1 cotyle, sive acetabulum, vel glene vocantur,
 ossibus recentibus profundiores existentes,
 iam in exsiccatis, ob eminentias cartilagineas
 his ablatas, quibus firmior fit articulatio.
 umorem continent oleosum, mucosum, ex pe-
 liaribus glandulis, *mucosis* sive *mucilaginosi*
 tis (a), & ligamentis (b) articulorum (forte
 iam ex ipsa medulla) secretum; qui ossa, pro
 motu faciliori, lubricat.

57 *Cavitates articulationibus non inservientes*
 ut vel internæ, vel externæ. Illæ, si majores,
medullam; sin minores, *succum rubrum me-*
llosum sive oleosum continent, & cellulæ seu
vernulæ ossium vocantur.

58 *Externæ*, pro diversitate figuræ, fovea,
 fissa, foramen, canalis sive ductus, sinus, sul-
 cus, incisura &c. audiunt.

59 *Ossium conjunctiões sive articuli* (44), de
 quibus plerique Authores ante sceleti sive ossium
 specialem explicationem agunt, a tyronibus,
 eo quidem judicio, recte percipi vix possunt,
 si prius speciali ossium notitia instructi sint;
 circo de illis in fine hujus osteologiæ dicturi
 sumus, & jam ad sceleti (38) explicationem
 progredimur.

DE SCELETO.

60 *Dividitur sceleton in truncum & extremi-* *Diviso.*
tes seu artus. Truncus constat ex capite, spi-
ra dorsi, ossibus pectoris atque innominatis.

61 *Caput* est, quod supremæ colli vertebræ in-
 nit; ac dividitur vulgo in *cranium*, & faciem
 sive

(a) *Havers* loc. cit. (b) Ex ligamentis etiam hunc
 umorem ex parte secerni judico, licet *Haverus* hac de re
 eat; quia glandulæ illæ non in omnibus articulis demon-
 strari possunt, & membranaceæ partes, quales etiam liga-
 menta sunt, aliis in locis certos humores secernunt.

sive *maxillas*: quibus vero etiam os hyoides ad-
potest.

de cra- 62 *Cranium*, quod & *calvaria* dicitur, est pars
nio. capitis, magnam illam osseam cavitatem efficiens,
quæ cerebrum alias includit: adeoque omnia ossa
quæ ad hanc cavitatem conficiendam conspirant
ossa cranii nobis vocantur.

63 In eo generatim consideramus figuram ova-
lem, superficiem anteriorem convexam & inter-
riorem concavam; magnitudinem, crassitiem
inæqualem; substantiam, ex duplici tabula sive
lamella, interiori & exteriori, cum interjecta
diploe, sive *meditullio*, constantem; compositionem
ex diversis ossibus; connexionem per futu-
ras; usus.

64 *Ossa* hujus (62) octo sunt: nimirum os
frontis, duo parietalia, duo temporum, occipi-
tale, sphenoides, & ethmoides (a).

ut fron- 65 *Os frontis*, quod & *coronale* dictum, est
tis. primum cranii os: duplex in infantibus, sed ut
plurimum simplex in adultis; quandoque tamen
& in his ad nasum usque bifidum. In hoc no-
tamus situm, figuram irregularem, connexionem,
crassitiem, superficiem internam, in qua fovea
& eminentia annotanda, quibus adhæret sinus
longitudinalis duræ matris; superficiem externam,
in qua locus, ubi siti sunt muscoli frontales,
temporales, atque annulus cartilagineus musculi
trochlearis oculi; apophyses septem: quarum sex
ad orbitas conficiendas concurrunt; septima ve-
ro ossa nasi sustentat: denique sinus frontales,
eorum usum & variam magnitudinem ac consti-
tutio-

(a) Ossibus cranii nonnulli Authores varia adhuc alia
adscribunt nomina, quam quæ nos adduximus: quia vero
reliqua apud scriptores præcticos vix occurrunt, & tyroni-
bus nominum copia confusionem creat, hic ea omittere
consultum duximus, retinendo solum usitatiora. Miror ve-
ro recentem de ossibus scriptorem nonnulla horum ossium
nomina omittere & nova, eaque inusitata substituere.

tionem in adultis; (a) ut & mirabilem illorum ortum atque genesis in pueris. (b)

66 *Ossa parietalia, ossa bregmatis, verticis, sincipitis* quoque dicta, secundum & tertium cranii os constituunt: in quibus notamus situm, figuram fere quadratam, magnitudinem, connexionem, crassitiem; superficiem externam, in qua situs partis musculi temporalis seu crotaphidis; superficiem internam, in qua sulci, arbutulas repræsentantes, ab arteriis duræ matris pressi, & foveæ, tam pro sinu longitudinali laterali, quam pro glandulis duræ matris; eodem locum, *bregma*, in infantibus *Fontanelle* sive *fons pulsabilis*, dictum, & quomodo in genere generetur.

67 *Ossa temporum, squamosa & petrosa* quoque dicta, quartum & quintum os efficiunt: atque in consideramus situm, figuram valde irregularem, connexionem; *substantiam* squamosam & petrosam; *apophyses* quatuor, jugalem seu zygoticam, mammillarem seu mastoideam, styloideam, (c) & petrosam; locum, ubi articulatur maxilla inferior; *meatum auditorium*; locum, ubi ligamentum auris inseritur juxta processum mastoideum; *fossas sigmoideas*, ubi sinus lateralis duræ matris siti; *incisuram* sub processu mastoideo, ubi musculus biventer oritur; *foveam*, qua sinus venæ jugularis latet; sinus in apophysi mastoidea, in cavitatem tympani sæpe hiantes.

(a) Vid. *Schneider*. de Catarrh. fig. 1. p. 484. *Palsn*. Osteo-Tab. I. & II. & dissert. de cavitatibus ossium capitis, Norfii 1722. edita.

(b) De foraminibus eorumque usu, tam hujus quam reliquorum cranii ossium, infra conjunctim dicemus.

(c) Hanc in junioribus per articulationem, quæ inter cartilaginis fit, cum motu jungi ossibus temporum, avit *Ruyfchius* Advers. Anat. Decad. III. pag. 30. hinc plerisque craniis eam deficere. Hæc vero cartilago in libus sæpe fit ossea, & sic cum osse principali fit pars continua.

tes; statum denique in fœtu, ex parte petrosa squamosa, & circulo osseo sive annulo, cujus membranæ tympani innascitur, qui tandem successu temporis in meatum auditorium osseum mirabiliter expanditur.

ossa au-
ditus.

68 In osse temporum, & præsertim in parte petrosa, notanda adhuc sunt CAVITAS TYMPANI, & in ea OSSICULA AUDITUS, vulgariter quatuor, & totidem notabilia *foramina*. Ossiculorum primum *malleus* dicitur, in quo consideranda caput, cervix, manubrium, cum membrana tympani junctum; duæ apophyses, quarum altera longissima, *Raviana* male dicitur, (a) quia a *Folio* jam descripta (b) pro insertionem musculi mallei externi. Alterum *Incus*; in qua corpus, fovea pro articulatione cum malleo, & duæ crura: quorum longiori jungitur ossiculum tertium, *Stapes* dictum. In hoc notanda *caput*, incudis cruri longiori junctum; *basis*, fenestræ ovali labyrinthi insistent, & duæ partes laterales internam superficiem fulcatam habentes. Quodammodo multi pro quarto ossiculo auditus numerant inter incudem & stapedem collocatum, atque *os orbiculare* appellant, mea quidem sententia non est peculiare ossiculum, sed tantum epiphysii cruris longioris incudis. FORAMINUM vero primum, cui stapedis basis insitit, *fenestra ovalis*, alterumque huic vicinum *fenestra rotunda* appellatur. Hoc ad cochleam, illud ad vestibulum ducit. Tertium foramen per canalem ad os desinit, qui *ductus* sive *tuba Eustachii* auditus per quem nonnulli fumum tabaci, ore attractum, per aures emittere, & surdi, ore aperto, melius audire possunt; quartum vero in cellulas

(a) Boerhaave Instit. Med. c. de Auditu.

(b) Vid. *Folii* nova auris internæ descriptio, & Bartholin. Anat. Reform. pag. 715. qui ultimus vero eam non satis bene delineavit.

processus mastoidei hiat. Omnia hæc audi-
ui toleraviunt.

69 *69* Interna pars auris, ob varios mirabiles
neatus, **LABYRINTHUS** dicitur; in qua no-
tanda cavitas, medium labyrinthi constituens,
vestibulum nominata; a cujus altera parte oc-
currunt *tres canales*, *semicirculares* dicti, maxi-
mus, medius, & minimus, quinque orificiis in
vestibulum hiantes, ac altera parte *cochlea*, spi-
ras duas cum dimidia perficiens: in qua *nucleus*,
& canalis a *lamina spirali* in duos divisus, quo-
rum superior in vestibulum hians, *scala vestibuli*;
inferior, per fenestram rotundam cavum tym-
pani respiciens, *scala tympani* nuncupatur a *Val-
valva*. (a) Denique *canalis nervi auditorii*, 1.
communis, amplior, in quo foraminula ad la-
abyrinthum; 2. Proprius, angustior, & longior;
terminans partim exiguo foramine in cranii ca-
vum, partim in *aquæductum Fallopii* (b).

70 *Os Occipitis*, sextum cranii os est; in quo occipi-
tis.
consideramus situm, figuram irregularem; sta-
tum in infante recens nato, ubi ex quatuor ple-
rumque frustis constat; connexionem, crassitiem
inlignem; apophyses tres, duas condyloides, pro
articulatione cum suprema vertebra, totoque ca-
pite sustentando; & tertiam ad sellam equinam,
cui jungitur, extensam. In superficie interna
pud adultos, crucis figuram, cui sinus longitu-
dinalis & laterales, itemque processus duræ ma-
tris adhærent; & intra hanc, quatuor excavatio-
nes, in quibus cerebri lobi posteriores & cere-
bellum recubant. In superficie externa, emin-
tias & foveas varias superficiales post foramen
magnum, quibus varii capitis muscoli inseruntur.

71 *Os septimum cranii*, *sphenoides*, *cuneiforme* sphen-
noides,
& *basilare* dicitur; quia instar cunei reliquis cal-
variarum ossibus est infixum, & tanquam basis ple-

D

raque,

(a) Traité de l'Aure humaine. (b) Ibid. Tab. VII. fig. 4.

raque, ut & quædam maxillæ superioris ossa quasi sustinet. Figura ejus valde irregularis est unde nonnullis etiam *multiforme* auditur. Evidet potest in basim & latera, sive alas, ac tempora expansas, ac deinde in partem superiorem & inferiorem. In parte superiori basis ascendit sellam equinam sive turcicam, sub qua *sinus* latet, *sphenoides* dictus, qui quandoque duplex, & in nares hiat, quandoque nulla in nares apertura adest; (a) interdum etiam totus hic sinus deficit. Apophyses habet tredecim, sex internas sive superiores, juxta sellam equinam; & septem externas sive inferiores; quatuor scilicet *pterygoideas*, musculis originem præbentes, duas styloides exiguas, musculis certis uvulæ trochleæ officium præstantes; & septimam, quæ vomerem subit; fossas tres, unam in sella equina, duas inter apophyses pterygoideas.

cribri-
forme.

72 *Os ethmoides, seu cribroforme*, octavum cranii os constituit. In hoc considerata situs, extensio per nares & orbitas, figura, connexio, status in infante; apophyses quatuor, ut *crista galli*, septi narium pars superior, & duo ossa *spongiosa* (quæ & *turbinata* vocantur) *superiora* (b), quibus *Morgagnius* duo minora addit (c); pars *cribrosa*, *cavernosa*, & *papyracea* sive *plana*; sub qua varii *sinuli* diversæ figuræ, magnitudinis & numeri (d), & denique *usus* diversus diversarum ejus partium.

73 O-

(a) Quod etiam in diss. de cavitatibus ossium capitis notatur, pag. 15. (b) Multi has partes spongiosas pro peculiaribus ossibus habent; verum quia in annosioribus continua sunt cum parte reliqua, rectius pro partibus ossis ethmoidis haberi possunt. (c) Advers. anat. VI. Tab. II. fig. 3. qq. ubi & majora delineantur.

(d) Conf. Morg. Adv. I. p. 38. Sed sinum in hoc osse a nemine indicatum, & a se primum detectum esse scribit *Santorinus* obs. anat. p. 89. an vero a me hic non sit indicatus, aliis dijudicandum relinquo.

73 Omnia hæc ossa in infantibus recens nã-
 nondum satis perfecta sunt, sinus & medi-
 llium ~~que~~ deficiunt, fibræ ossæ in genera-
 ne plerorumque a centro in ambitum, radio-
 m instar, feruntur; & pleraque eorum ex di-
 sis adhuc constant frustis: neque suturæ ad-
 e adsunt; varia tamen sæpe interjecta officu-
 triquetra.

74 Verum in adultis cranii ossa junguntur ut *suturae*.
 rimum per SUTURAS; quæ vel *communes*
 t, vel *proprie*. Hæ vel *veræ* dicuntur, quan-
 ossa denticulatis quasi eminentiis inæqualibus,
 us fere tantum conspiciendis, mirabili artifi-
 sibi invicem junguntur; (a) ut coronalis,
 ttalis, lambdoidea: vel falsæ seu spuria, ut
 amosæ ossium temporum & parietalium, imo
 m ossis frontis & sphenoidis eo in angulo,
 cum parietalibus coeunt. (b) *Communes* vul-
transversales, (os frontis in facie cum sub-
 s ossibus jungens) sphenoidalis, ethmoida-
 zygomatica (c) &c. appellantur; quæ vero
 uæ sunt considerationis. Nonnulli calvarias
 ris prorsus destitutas viderunt. (d)

Inter suturas præsertim lambdoideam & sa-
 lem, hinc inde in craniis variis distincta
 dam parva officula quandoque reperiuntur,
 nnullis ob figuram qualemcunque *triquetra*,
 liis *Wormiana* dicta, (quamvis *Galeno* jam
 fuerint) incerti situs & figuræ, per sutu-
 reliquis juncta: quæ a quibusdam speciatim

D 2

con-

Winslow. Hist. Acad. Reg. Scient. An. 1726.
 Idem, ibidem cum *Vesalio*, qui & graves fabricæ
 es reddunt. (c) Nonnulli adhuc varias suturas
 ones recensent: ut nasales, palatinas, lacrymales &c.
 ro rectius ad harmoniam referuntur.
 Fallopius de ossibus. Conf. Dissert. *Meibomii* de
 s cranii, *Altorfii* sub præsidio I. M. *Hoffmanni* de-
 & *Connors* Dissert. de stupendo ossium coalitu.

contra epilepsiam prædicantur. (a)

76 *Usus futurarum* est 1. ut dura mater firmissime ibi cranio jungatur & pericranio; 2. ut ossa cranii, in infantibus ibi disjuncta, caput facilius extendi & crescere queat; 3. ut cerebri transpiratio, in primis in junioribus, utpote huiusmodiioribus, fortior ibi possit fieri; 4. ut præceveantur aliquo modo magnæ cranii fracturæ; forte etiam, ut medicamenta ibi applicata; præsertim in junioribus, melius penetrare queant.

maxil-
la.

77 A cranio pergimus ad MAXILLAS: si quibus intelligimus reliqua capitis ossa, sub anteriori parte cranii sita, sed ad cavitatem ejus nihil facientia: quarum altera superior dicitur & immobilis cranii ossibus adhæret; altera inferior, quæ mobilis est, pro usu multiplici.

78 Longitudo earum minor est, quam in omnibus aliis animalibus, si respectum habeas corporis magnitudinem: procul dubio ad pulchritudinem majorem homini conciliandam.

79 Superior componitur ex 13. ossibus, & 13. dentibus, si numerus eorum completus est.

80 Inter 13. illa ossa sex sunt paria; quorum 1. lacrymale. 2. nasale. 3. jugale. 4. maxillare. 5. spongiosum inferius. 6. palatinum, & ultimum impar, *Vomer* vocatur. (b)

81 Conjunguntur inter se per juncturam sensum æqualem, quæ *harmonia* dici solet.

82 Pri-

(a) Cranium asservo, ubi futura lambdoidea duos distos transversos lata est, & plus quam viginti talia officia distincta continet.

(b) Multi hæc ossa maxillaria non nominibus sed solo numero distinguunt: ut par primum, secundum, tertium &c. quod vero, quia tyronibus facile erroris & confusionis ansum suppeditat, & leviori negotio nomina hæc, quam numeri retinentur, dum numerus nullam ideam de ossis exhibet, atque eodem jure lacrymale, nasale, jugale, palatinum &c. primum vel secundum dici potest, & auctores iam in modo numerandi non conveniunt, nominibus potius indicatis utendum esse censeo, quam numeris.

82 Primum par, *ossa lacrymalia* seu *ossa un-*
is, vocatur: in quibus consideramus originem
 omnis, situm, magnitudinem & circumferen-
 tiam, connexionem, substantiam tenerrimam;
 locum, pro conformatione canalis nasalis, u-
 sum, operationem chirurgicam, quæ in fistula
 lacrymali ibi fieri solet.

83 Secundum par sunt *ossa nasi*: in quibus si-
 tum, circumferentiam, figuram, substantiam,
 superficiem utramque, connexionem, locum, ubi
 cartilagine narium adhærent, & usum notamus.

84 Tertium *ossa jugalia sive zygomatica*, quæ
ossa malæ vocantur, constituunt: in quibus
 zymologiam, situm, circumferentiam, substan-
 tiam duram, connexionem, apophyses quatuor,
 loca, ubi muscoli masseter & zygomaticus ori-
 nem habent, foramina cum eorum usu.

85 Quartum par, *ossa maxillaria* efficiunt: in
 quibus consideramus circumferentiam, magnitu-
 dinem, situm, nexum, apophyses quatuor: 1.
 jugalem, 2. nasalem superiorem. 3. nasalem in-
 feriorem, cui septum nasi jungitur, & 4. pala-
 tinam (a), excavationes palatinas & nasales;
 sinus alveolos; *sinum*, vulgo *antrum Highmo-*
dictum (b), quamvis *Vesalio*, (c) *Columbo*, *Bau-*
ro, aliisque jam cognitum, hujusque magnitu-
 dinem, & orificii sive aperturæ sinus constitutio-
 nem in viventibus; usum duplicem; 1. pro vo-
 catione, 2. pro muci secretionem; canalem nasalem,
 operationem chirurgicam in certa ozænæ specie.

86 Quintum par *ossa spongiosa sive turbinata*
 D 3 *infe-*

(a) Hæ apophyses palatinæ a quibusdam male pro pecu-
 libus ossibus sub *ossium palatinorum anticorum* nomine
 tribuntur: quia nunquam sunt a reliqua hujus ossis par-
 te distincta. (b) Delineatio ejus vid. in *Palsni Osteo-*

Tab. II. fig. 2. & *Drakii Anatom. Tab. XVIII. fig. I.*
 II. Verum hos sinus quandoque deesse, notavit *Morgan-*
es Advers. anat. VI. pag. 116. sed rarissime,

(c) De fabric. Hum. corp. pag. 49.

inferiora vocatur. Hæc parva sunt, oblonga, friabilia, atque adhærent inferiori parti ossium maxillarium (85) & ossibus palatinis in cavo narium. Aeris ad pulmones irruentis frigus temperant, illapsum muscarum aliorumque animalium in fauces impediunt, & membranæ pituitariæ expansionem pro variis usibus augment. (a)

87 Sextum par, *Ossa palati* constituunt: in quibus notamus valde irregularem figuram & extensionem per nares usque ad orbitam; corpus & apophyses varias, pterygoideam, nasalem & orbitalem: (b) sulcum in superiori superficie cui vomer jungitur; usum, 1. ad formandum palatum, orbitam, & sinum maxillarem; 2. ad sustentationem membranæ palatinæ & uvulæ. 3. ad vocem.

88 Ultimum sive decimum tertium maxillæ hujus os, quod impar est, ob qualemcunque figuram *Vomer* appellatur: in quo situm, substantiam, superius crassam, inferius tenuem; circumferentiam, lamellam duplicem cum interjecto spatiolo, connexionem, septi narium compositionem, quod anterius, cartilagineum, posterius, osseum, ex vomere & processu medio ossis ethmoidis constans, & usum examinamus. (c)

Orbita.

89 Restant hic considerandæ magnæ illæ fossæ, in quibus oculi locantur, *orbitæ* dictæ; quæ componuntur ex concursu septem ossium, nimirum 1. coronalis, 2. sphenoidi, 3. plani, partitis ethmoidi, 4. jugalis, 5. maxillaris, 6. lacrymalis, 7. palatini.

90 In

(a) *Santorinus* Obs. anat. p. 28. hæc ossa non pro distinctis ossibus, sed pro apophysibus ossis palati tantum haberi vult. Verum ego ea sæpe distinctissima vidi.

(b) Vidi de hoc osse *Winslow* in *Histor. Acad. Reg. Scient. An. 1710. & Cant. pag. 20. Tab. 5. fig. 9. & 10.*

(c) Hoc os partem ossis ethmoidi esse vult *Santorinus* p. 87. verum & hoc, licet in adultis cum ethmoideo concieverit, in junioribus distinctissimum demonstrari potest.

90 In his notamus figuram, principium album & fundum angustiores, loca, ubi musculorum & palpebrarum ortum habent, & ubi glandulae, caruncula, atque saccus lacrymas locantur.

91 MAXILLA INFERIOR est magnum illud mobile capitis, inferiorem dentium seriem continens; a cujus mobilitate præcipuum manducationis negotium dependet. *Maxilla inferior.*

92 In hac consideramus, 1. os ipsum, 2. dentes.

93 In osse ipso notamus numerum, statum in infante, (ubi ex duobus constat ossibus) magnitudinem; figuram; substantiam, externam firmam, internam spongiosam; faciem externam & internam, huiusque marginem externum & internum; connexionem, locum ubi in pueris ex duobus ossibus in unum coalescit; & eminentiam posteriorem ad radicem incisorum, pro priorum musculorum insertionem; mentum sive genium: apophyses condyloides, cartilagine molli tectas (a), harumque cum ossibus temporum articulationes; & coronoides, earumque unum; duos angulos, alveolos dentium; foramina quatuor, duos canales efformantia, & transtrum vasis & nervis præbentia. *Usus* utriusque maxillæ præcipui sunt manducatio & loquela.

94 Superfunt considerandi DENTES utriusque maxillæ, qui sunt ossa durissima alveolis maxillarum, instar clavorum, infixæ: quæ junctura *symphosis* dici solet. *Dentes.*

95 In his consideramus situm, in alveolis profundis; connexionem, ope periostii & gingivarum, colorem naturalem candidum; numerum, viginti octo ad triginta duo, in quavis maxilla iv. xv. vel xvi. si numerus est perfectus; distributionem, in *incisores* quatuor, *caninos* duos, qui

D 4

in

(a) Quæ accurate delineata vid. in *Morgagn. Adversar.* l. fig. 1. 2. 3.

in maxilla superiori *oculares* vocantur, & *molar*
res octo, in quavis maxilla, & *dentes sapientie*
 duos. Porro examinamus eorum basin, ejusque
 substantiam peculiarem duplicem, lapideam si-
 ve vitream, & medullarem; radices, modo simi-
 plices, ut in incisoriis, caninis & priotibus mola-
 laribus; modo duplices, triplices, aut quadrup-
 plices, ut in molaribus posterioribus. Præterea
 cavitates illorum, membrana vasculoso nervea
 investita (a), & foraminula in singulis radicib-
 us, pro ingressu vasorum, nutritioni & sensui
 inservientium. Tandem dentium in infantibus
 ortum, & accretionem; mutationem quoque &
 regenerationem post annum septimum, & quan-
 doque in ipsis senibus; coalitum ac collapsum al-
 veorum in senibus mirabilem, post casum den-
 tium. (b)

96 Circa dentes præterea etiam adhuc singu-
 laria ipsis contingentia hic considerata: ut
 quando vel nimis distant, vel inter se (c), aut
 cum alveolis plane concresecunt; quando in pa-
 lato proveniunt, aut saltem extra seriem vel
 posituram naturalem.

97 Usus dentium, 1. cibos comminuere, 2. lo-
 quelæ inservire, 3. ad pulchritudinem conferre.

Fora-
 mina
 ossium
 cranii.

98 *Foramina capitis* eorumque usus, ut melius
 retineantur, conjunctim hic tractabimus, eaque
 dividimus in interna & externa: interna voca-
 mus, quæ intra cranii cavitatem bene in con-
 spectum veniunt; externa, quæ foris melius
 patent.

99 *Interna* majora numeramus, undecim pa-
 ria, nervis, arteriis, & venis cerebri transitum
 præ-

(a) Quæ a *Ruyfchio* descripta Thef. Anat. l. p. 48.

(b) Vid. *Ruyfchii* Observat. pag. 107. Simile prorsus ca-
 put senile osseum ipse asservo: in cuius utraque maxilla
 omnes dentes deficiunt, & alveoli toti, quousque alias ra-
 dices dentium pertingebant, omnino consumti & funditus
 quasi deleti sunt. (c) *Columbus* de re anatomica.

presentia; & unum impar, scilicet foramen magnum ossis occipitis, medullæ spinali potissimum, nervis spinalibus accessoriis, & arteriis vertebralibus patens.

100 Speciatim vero *primum par* illorum foraminum, (quod rectius est congeries foraminum ossis cribrosi) filamentis nervorum primi paris, *factorii* dicti, transitum concedit. *Secundum* in osse sphenoidæ, nervis opticis, & vasis sanguiferis. *Tertium*, *inæquale* & *lacerum* dictum, pari tertio & quarto nervorum; ramo primo quinti paris, & pari sexto, itemque vasis sanguiferis & emissario receptaculorum duræ matris. (a) *Quartum*, in osse sphenoidæ, ramum secundum quinti paris, qui per canalem ossis maxillaris foros infra orbitam pergit, & deinde per maxillam superiorem distribuitur, transmittit. *Quintum* vero, sive *ovale*, ramum tertium quinti paris & emissarium duræ matris. (b) *Sextum*, exiguum, admittit *arteriam per duram matrem* distributam, quæ ramusculos illos ossibus parietalibus imprimit. *Septimum*, inter sellam equinam & apophysin petrosam, nihil transmittit, sed dura matre clausum est, eique arteria carotis incumbit. Per *octavum* foraminum par inquant *arteriæ carotides internæ*, hinc *foramen coticum* dici potest, & simul nervus intercostalis egreditur. Hoc foramen canalis est varie inexus, quo fit, ut in vivis nimius sanguinis impetus in cerebrum multum infringatur. Per *nonum*, in osse petroso, *nervus auditorius*; per *decimum*, inter os petrosum & occipitale, quoque in duo divisum, *par vagum* & *sinus laterales duræ matris*, una cum *nervo spinali* egrediuntur. Per *undecimum*, (quod nonnunquam quoque duplex) in osse occipitis, juxta oras
fora.

(a) Santorinus Obs. anat. p. 75.

(b) Ibid.

foraminis magni, par nervorum nonum *linguale* dictum, exit.

101 In osse petroso intus adhuc *exigua* quædam *foraminula* sæpe occurrunt: quorum unum reflectit ramulum nervi auditorii ad duram matrem; reliqua, vasa sanguifera ad labyrinthum sive organum auditus internum transmittunt. Denique *singularis excavatio ossium cranii ob sinum duræ matris est observanda*: quæ incipit a foramine cæco ante cristam galli, per medium ossis frontis, infra futuram sagittalem ossium bregmatis, ad medium ossis occipitis excurrent, & dividit in duas, quæ horizontaliter utrinque in osse occipitis & parte bregmatis antrorsum abito postea singulari flexione descendit ad foramen decimum, ubi sinus laterales in venam jugularem se exonerant.

102 *Externa*, in osse frontis, duo sunt *propria* mox supra orbitam, *supraorbitalia* dicta, maximam partem *nervi ophthalmici Villisi* transmittentia: quorum loco sæpe tantum incisura quædam superficialis adest; & *quatuor communia* cum ossibus planis sive papyraceis in orbita, duo in quovis latere, quæ nervulos & vasa ad sinus ossis ethmoidis transmittunt. In *parietali* unum pro transitu venæ e cute cranii in sinum sagittalem duræ matris, vel e sinu sagittali ad venas capitis externas: quod vero, quia sæpe deest, a multis prorsus omittitur. In quovis *osse temporum* communia tria: quorum primum est foramen jugale, pro transitu muscoli crotaphitis; alterum ampla fovea, pro sinu venæ jugularis; & tertium *ductus Eustachii*, inter os petrosum & sphenoides, ab ore ad aurem internam ducens (§. 68.) *Propria* etiam tria; 1. meatus auditorius; 2. *Aqueductus Fallopii*, inter processum mastoideum & styloidem, portionem duram nervi auditorii transmittens; 3. post apophysin

nasoidem, pro ingressu venæ in sinum lateralem, vel e sinu laterali in venas occipitis. (a) In occipitali duo, quæ canales formant, post apophyses condyloideas, pro transitu venarum vertebraliū in sinus laterales duræ matris: quæ vero foramina modo alterum, modo ambo in multis craniis deficiunt. In *sphenoideo* præter interna jam descripta, & aperturas sinuum in nares, communia cum ossibus palati, quæ sunt aperturæ narium ad fauces; itemque canalem novum in parte suprema processuum pterygoideorum, pro novi emissarii transitu. (b) In *ethmoideo* 1. communia cum osse frontis in interiori latere orbitarum, modo jam indicata; & 2. aperturæ sinuum ethmoidalium in nares. Quibus 3. addi potest *foraminulum cæcum ante cribrum galli*, cum osse frontis commune; quod pro intimiori nexu duræ matris, & speciatim sinus longitudinalis inservit; imo secundum nonnullos ductum transmittit; cum venis nasi communicantem.

103 Foramina in *maxilla superioris osse maxillari*, 1. post priores dentes incisores, *palatinum* Maxillarium. *anticum* dictum, in nares hians; in viventibus vero, & cadaveribus membrana palati ita claudam, ut nulla in ore apertura conspici, & nihil, quantum hætenus observare potui, transmittere queat (c), atque, dum per hunc canalum membrana oris jungitur membranæ narium, pro

(a) Hanc sinuum cum venis externis communicationem primum notasse *Lyserum*, affirmat *Bartholinus* Anat. Reform. p. 463. (b) *Santorini*. Obs. anat. p. 75.

(c) Plerique anatomici recentiores liquidum per hunc canalum ex naso in os influere sustinent, atque hanc ob causam eum *Stenonis transitum a naribus ad palatum* vocant, qui etiam in capite osseo satis apertus & amplius apparet. Verum alias tam angustus, ut neque in vivo, neque in cadavere eum in os hiare, aut feram transmittere, unquamprehendere potuerim.

pro firmiori illius nexu cum palato inservire videtur; 2. *infraorbitale*, nervis quinti paris patens; 3. post dentes molares posteriores, per quæ vasa & nervi ad sinus maxillares ingrediuntur; 4. incisura in latere exteriori fundi orbitæ communis cum osse sphenoides, pro transitu vasorum ad nares & oculos; 5. *canalis nasalis*, communis cum osse unguis; 6. aperturæ sinuum in nares; & 7. *palatinum posticum*, commune cum ossibus palati, nervos ad palatum transmittit. In *osse jugali*, 1. commune sive jugale; 2. proprium, modo simplex, modo duplex, pro transitu nervi. In *osse palati*, præter commune modo descriptum, adhuc proprium, ubi jungitur cum processibus pterygoideis, pro nervorum transitu ad palatum.

104 In *maxilla inferiori* duo in *facie interna*, pro arteriæ, venæ, & nervi ingressu in substantiam maxillæ, pro ipsius & dentium nutritione; & duo in *facie externa*, pro exitu eorundem vasorum in gingivas & mentum.

105 Si forte hinc inde in capitis ossibus adhuc alia foraminula reperiuntur, vel extraordinaria sunt, (ut quandoque contingit) vel vasculis pro nutritione ossium ingressum concedunt.

Os hyoides.

106 Ad capitis ossa adhuc referri solet os, basi linguæ inhærens, & propterea *linguale*, vel ob figuram literæ græcæ υ, *ypsiloïdes* sive HY- OIDES, item *bicorne* dictum. Nullum aliud os tangit, & in junioribus ex tribus constat frustis mobilibus, *basi* scilicet, mediam partem occupante; & duobus lateralibus, *cornubus* dictis, quibus lingua connascitur. In adultis vero ad juncturam eorum cum basi sæpe duo adhuc alia, valde exigua, a multis neglecta, seminis tritici fere figura, reperi, (quæ *triticea* inde dici possunt) quibus ligamenta junguntur, quorum ope adhærent processibus styloideis. In

his

is ligamentis quandoque, sed rarissime, adhuc alia officula reperiuntur; hinc factum est, ut *esalius*, qui sex in eis vidit, alique, undecim cuncta ossis hyoidis numerent, sed immerito. Intervit hoc os linguæ pro firma basi, musculiquearii, qui tam ad linguam, quam laryngem movendam faciunt, ei inferuntur.

107 Quia *cartilagines laryngis* quatuor quandoque in senibus ex parte osseæ fiunt, nimirum *thyroides*, *cricoides*, & duæ *arytænoides*: hinc aliquo modo ad ossa referri possunt. Quoniam vero eorum natura & usus melius intelliguntur, quando recentes, quam quando exsiccatae, plura de iis hic non dicemus, sed ubi de pulmone loquimur, & nunc ad ossa trunci examinanda progredimur.

Laryngis ossa.

DE OSSIBUS TRUNCI.

108 TRUNCUS, tanquam secunda pars scheleti, constat ex *spina dorsi*, ossibus pectoris, ossibusque innominatis.

109 SPINA DORSI, Græcis *rhachis* dicta, *spina dorsi*. vocatur columna illa ossea, flexilis, a capite ad anum usque extensa, ex vertebrais potissimum & osse sacro constans, ac spinalem medullam continens.

110 Hanc consideramus primogenratim, deinde speciatim.

111 Generatim notanda occurrunt, nomen, figura quasi pyramidalis (a), & fere ut litera s inflexa; hujus figuræ ratio, connexio, & usus.

112 Speciatim vero perpendenda *divisio spinæ* in collum, dorsum, lumbos, os sacrum & coccygis.

113 Collum, dorsum, & lumbi constant ex
ver-

(a) Vid. de hac *Winslow* in Hist. Acad. Reg. Scient. A. 1720. in Memor. pag. 356. edit. Amstel.

vertebris sive *spondylis*: in quibus nunc rursus quædam in universum, quædam sigillatim monenda.

*Verte-
bræ.*

114 In *vertebris* in universum consideranda sunt numerus, viginti quatuor; & in qualibet basis sive corpus (quod anterius & ad latera convexum est, posterius sinuatum, pro spinæ medulla recipienda, substantiamque habet spongiosam, tenui lamella ossea cinctam); apophyses primo duæ, e parte posteriori corporis provenientes, ex quibus mox aliæ septem, nimirum una spinosa, duæ transversæ, duæ superiores, duæ inferiores; epiphysesque cartilagineæ; articulatio, qua quælibet recipit alteram, & vicissim ab altera, mediante cartilagine recipitur; foramen unum proprium magnum, pro transitu *spinalis medullæ*; & quatuor communia, sive dimidia, duo in quovis latere, quæ conjunctim viginti quatuor foramina in quovis latere columnæ hujus conficiunt; per quæ medullæ nervi e medulla in spina transeunt. Foraminula minora, in corpore *vertebrarum* potissimum conspicua, vasis sanguiferis pro nutritione ingressum concedentia.

115 In *adultis* ex uno *vertebræ* constant frustulo; in *infantibus* vero & pueris ex tribus: corpus enim & duo latera distincta sunt ossa, & adhuc desunt apophyses spinosæ.

Colli.

116 COLLUM septem constat *vertebris*; in quibus rursus quædam generatim, quædam speciatim consideranda se offerunt.

117 Generatim *colli vertebræ* reliquis sunt minores, substantiam tamen habent cæteris solidiorem. Corpus minus rotundum, & anterius quasi compressum est: superius, sinuatum; inferius, convexum. Pleræque hæ *vertebræ apophyses* habent novem; nam superius e corpore utrinque adhuc una elevatur, pro firmiori articulo. Præ-

terea

ea transversæ & posteriores, spinosæ dictæ, ræque bifurcæ sunt; & transversæ etiam sunt perforatæ, pro transitu vasorum vertebralium ad put. Foramina communia sex efficiunt paria, o nervorum colli transitu e medulla.

18 Speciatim prima vertebra peculiare habet nomen, & *Atlas* dicitur; caret corpore & apophysi spinosa, atque ad figuram annuli accedit. eo corporis adest arcus offensus, & loco processus spinosi, tuberculum inæquale. Ejus substantia reliquis solidior, supra & infra recipit, sed recipitur. Caput ejus anteriori parte articulat, quo in articulo caput flectitur & extenditur: foramen proprium, ob corpus deficiens, omnium maximum; processus transversi reliquis longiores; peculiare quoddam *ligamentum* semicirculare, quod processum dentiformem sequentis vertebrae amplectitur. (a)

19 In altera vertebra, *Epistrophæus* sive *Axis* a, consideramus nomen, in suprema corporis parte apophysin odontoidem sive dentiformem, quæ in apice inæqualis, ubi ligamenta, os occipiti necitur, fortiter inseruntur; articulationem instar cardinis cum prima vertebra, & motum capitis super hac rotatorium.

20 Tertiæ vertebrae quidam nomen *axis* tribuunt; quæ vero nihil habet, quod *axi* simile sed in hac & in reliquis colli nihil peculiariter occurrit; quod non jam generatim de iis fuerat dictum.

21 *Dorsum* sive *thorax* duodecim habet vertebrae: in quibus in universum notamus magnitudinem mediam inter colli & lumborum vertebrae; apophyses spinosas longissimas, & (excedentibus duabus ultimis) valde inclinatas; cartilagineas inter corpora minores, quam in collo, ut mo-

Dorsi.

) Vid. *Vesalius* Hum. Corp. fabrica, lib. 1. cap. XV.

) Ibid.

motum laxum, pectori non convenientem, impediunt; apophyses transversas crassiores, & 12^{ve} cartilagine obducta donatas, ob articulationem cum costis: quem in finem etiam in lateribus duorum corporum junctorum, si primam & ultimas excipias, una communis eminentis parva excavata conspicitur: foramina duodecim communia in quovis latere, pro exitu duodecim parium nervorum dorsi.

122 Speciatim primam dorsi vertebra[m] quidam *axillarem sive eminentem* vocant, eique supremam costa annectitur. Reliquis nonnulli quoque nomina imposuerunt, sed præter necessitatem: quod rectius numero distinguuntur.

Lumborum.

123 *Lumbi* quinque habent vertebra[s]: in quibus generaliter notamus corpora & cartilagine interjectas, crassissima; apophyses transversas longissimas, tenuiores tamen dorsi; spinosas crassissimas, rectas, & reliquis magis distitas; motum hic laxiorem, foramina pro nervis lumbis quinque communia in quovis latere. Quodam etiam his peculiaria nomina dant; sed sufficit eas numero distinguere.

Os sacrum.

124 In *Osse sacro* notamus nomen, situm, connexionem, figuram triangularem; superficiem externam asperam, & internam lævem, concavam, substantiam spongiosam; basin, apicem, apophyses duas laterales amplas, pro articulatione cum ossibus innominatis (a); apophyses duas superiores parvas, cum cavitatibus glenoidis, pro articulo cum vertebra inferiori; apophysin inferiorem, pro articulo cum osse coccygis; *canalem*, pro fine spinalis medullæ; *foramina* anteriora & posteriora, quandoque quatuor,

(a) Quod connexus ossis sacri cum innominatis mobilis sit, a nemine ante se observatum esse vult *Schelhammer*. *Analect. diss. VI. §. 57.* De hoc articulo & ligamenti, quibus hæc ossa junguntur, vid. ossa innominata.

or, quandoque quinque paria; diversitatem huius ossis in viro & fœmina.

125 *Ufus*: 1. spinæ pro basi inservire; 2. pelvis cum innominatis efformare & partes in ea contentas defendere; 3. partem inferiorem spinæ medullæ, seu potius ita dictæ caudæ equine, in canali suo continere; 4. nervis intestini recti, vesicæ, partium genitalium, magnisque lumbalibus, & ischiadicis per foramina anteriora transitum præbere; posteriora vero vel nihil, vel solum nervulos haud percipiendos, emittunt; musculis variis originem præbere.

126 In adultis unicum os est; quatuor tamen vel quinque frustorum divisiones semper ostendens. In infantibus recens natis, maximam partem adhuc cartilagineum est, atque in pueris adhuc ex multis constat frustis.

127 *Os coccygis* etiam in senioribus plerumque unicum est; in junioribus vero ex tribus vel quatuor constat cartilaginibus, ut plurimum distinctis, atque in infantibus mere cartilagineum est. hoc notamus nomen, situm, connexionem, figuram, substantiam, basin, apicem, apophyses transversas exiles, cavitatem glenoideam, cum sacro jungitur; motum in alvi difficili excretionem & partu; statum in feminis: usum quo sustentando intestino recto, variisque musculis inferendis.

128 In *quadrupedibus* multis hoc os longum est, & ex quamplurimis constat frustis; extrorsum reflectitur, & caudam constituit; unde etiam *os caudæ* appellatur; in homine vero breve est, & varias ob causas introrsum flexum.

DE THORACE.

129 Secunda pars trunci in sculto **PECTUS** *Thorax*, seu **THORAX** vocatur; suntque illa ossa, quæ
E cavi-

cavitatem efformant, in qua cor & pulmones continentur.

130 In hoc consideramus structuram ex parte osseam, & ex parte cartilagineam, hujusque compositionis rationem: figuram & ejus circumscriptionem; magnitudinem, partes tres; *vertebras* scilicet, *costas*, & *sternum*. De *vertebris* vero jam dictum est; ergo hic tantum de *costis* & *sterno* adhuc dicendum restat.

Costæ.

131 In *COSTIS*, Græcis *pleuræ* dictis, consideramus situm, magnitudinem valde diversam; medix quippe sunt maximæ, superiores & inferiores minores; proclinationem singularem versus inferiora; connexionem, motum, ligamenta, numerum, duodecim in quovis latere, divisionem in veras & spurias, & usum.

132 *Substantia costarum* partim ossea est, partim cartilaginea: hæc, in parte anteriori; illa, in posteriori. *Figura* est incurvata; intus, concava; extus, convexa, pro cavitatis pectoris meliori conformatione.

133 *Partes costæ* sunt corpus & extremitates. In corpore notamus superficiem internam & externam, labrum interius & exterius, superius & inferius, ac fulcum in labro inferiori, superioribus novem vel decem insculptum, vasa costarum condentem. A quibusdam *propriis nominibus* insigniuntur; rectius vero numero distinguuntur.

134 In *extremitatibus* anterioribus cartilagines septem costarum verarum cum sterno junguntur; octava, nona, & quandoque etiam decima, cum septima, ac simul inter se, per cartilagines transversas cohærent; reliquarum extremitates anteriores liberæ inter musculos abdominis & diaphragma hærent. In extremitatibus posterioribus in plerisque duo observantur capitula, quæ cum *vertebris dorsi*, ubi articulos mobiles constituunt

uunt (a), firmiter junguntur; & tuberculum
asperum juxta capitulum anterius, cui ligamen-
tum inferitur, capitulum vero anterius deficit in
duabus vel tribus inferioribus. (b)

135 In STERNO attendendum ad situm, si *Ster-*
uram pugionis, statum in infante, ubi ex plu *num.*
imis frustis constat (c); numerum frustorum in
dultis, ubi modo unum, modo duo, modo tria;
substantiam fungosam; partem ejus superiorem,
manubrium dictam, in qua utrimque cavitas pro
clavicularum articulo, cartilagine mobili instru-
ta; partem mediam, quæ angustissima; & in-
feriorem, quæ latior, cui adhæret cartilago, ob
figuram *ensiformis* sive *Xiphoides* dicta, sæpe bi-
arcata, non raro tota ossea; cavitates laterales
utrimque septem, pro articulo cum costis veris.
Usus sterni est, 1. partem anteriorem pectoris
ormare; 2. costas & claviculas sustentare; 3.
defendere partes pectori inclusas; 4. inservire in-
tioni mediastini, pro cordis sustentatione, &
usculorum variorum.

136 Ultimam trunci partem constituunt duo *Ossa in-*
ta, INNOMINATA quidem vulgo dicta; quæ *nomi-*
ero in infantibus & pueris ex tribus frustis di- *nata,*
nctissimis componuntur, quorum quodlibet suum *ileum,*
omen habet; vocaturque superius ILEUM, *ischi-*
terius, OS PUBIS sive *pedinis*; inferius & *um, &*
osterius, OS ISCHIUM. Hæc interventu *pubis.*
artilaginis junguntur quasi in medio (d) infi-
E 2 gnis

(a) De mirabili effectu harum articulationum in respi-
ratione, vid. Winslow in Hist. Acad. Reg. An. 1720.

(b) De costarum & vertebrarum mirabili coalitu vid.
Mynors dissert. Medico physicæ.

(c) Quomodo in infantibus non solum ex variis ossibus
constet, verum etiam tam ingenti vasorum sanguiferorum
opia abundet, videri potest in Ruysch. Advers. Anat. De-
d. II. Tab. II. fig. 3.

(d) Male igitur a quibusdam asseveratur, acetabulum in
ilio solo existere, cum commune sit omnibus tribus.

gnis illius cavitatis, *acetabulum* dictæ, & ad pubertatem usque ibidem distincta videri possunt; postea vero concreescunt, & in unum os abeunt, ita, ut ne minimum pristinæ divisionis vestigium relinquant.

137 Junguntur in parte posteriore utrinque ossi sacro per cartilagine & ligamenta, firmumque articulum, licet quodammodo mobilem, ibi constituunt; atque cum hoc osse cavitatem, quæ *pelvis* vocatur, conficiunt. In anteriori vero parte ossa pubis inter se per cartilaginem coeunt (*a*); ubi quandoque in mulieribus, præsertim junioribus, in partu difficili, diducta cartilagine, parum a se invicem recedunt (*b*, pro foetus egressu facilitando. Cohærent vero hæc ossa ulterius utrinque cum osse sacro per duo adhuc *peculiaribus robusta ligamenta*, transversum quasi digitum lata, & tres quatuorve digitos longa (*c*), quorum superius ab apophysi ischii acuta posteriori ad os sacrum abit; alterum vero & inferius *tuberculum ischii* ossi sacro jungit; quibus tamen non obstantibus, os sacrum & ossa ilei in partu a se invicem secedere observarunt varii. (*d*)

138 Ceterum in ossibus innominatis consideranda *figura*; *superficies* externa & interna, pro variorum musculorum origine; *apophyses* duæ anteriores, superior, & inferior, ac duæ posteriores, ampla & acuta; *incisura* magna inter has duas posteriores; *crista* ilei; *tuberculum* sive *tubero-*

(*a*) *Santorinus* conjunctionem horum ossium non per *synchondrosin* fieri existimat, l. c. Cap. XI. §. IV. quod vero aliis dijudicandum relinquo.

(*b*) Auctores varii, qui hoc observarunt, citantur in *Morgagni Advers. Anat.* III. p. 38. & *Stalpart. vander V. Viel. Obs. Cent.* I. p. 289. idem testatur *Santorin.* l. c.

(*c*) Vid. de his ligamentis *Couperii Myotom.* nova; itenque *Santorinus* p. 175.

(*d*) *Paræus* l. 23. c. 13. *Guilmeau Oeuvr. chir.* p. 298.

erositas ischii, variis musculis & ligamento (137.) ortum præbens, *foramen* ossis pubis & ischii commune, ovale, omnium in ossibus maximum & membrana clausum, pro puncto fixo musculorum obturatorum; *acetabulum* (a) pro femoris articulatione; in quo *minor cavitas*, pro glandulæ mucilaginosæ situ commodo; & *incisura*, pro vasorum in hanc glandulam & ligamentum teres (b) femoris ingressu; *locus insertionis* hujus ligamenti; & *supercilia* cum eorum usu notanda.

139 Denique hic non negligenda est consideratio diversæ constitutionis horum ossium in mulieribus & viris; in mulieribus enim tenuiora sunt, magis a se invicem distant, quam in viris, præsertim ossa pubis: ut sic non solum cavitationem pelvis, sed & angulum inter ossa pubis & ischii, majorem efficiant, pro foetus commodior gestatione, faciliorique in partu exclusione.

140 *Usus* horum ossium, præter jam indicatos, sunt 1. sustentatio spinæ dorsi, omniumque artium superiorum; 2. junctura reliqui corporis cum femoribus; 3. musculorum multorum origo; 4. formatio pelvis, quæ pars est abdominis, defensio partium contentarum.

Differentiæ in muliere & femina

Usus

DE EXTREMITATIBUS SIVE ARTUBUS.

141 *Extremities* sunt vel superiores, vel inferiores; superiores, manus aut brachia; inferiores, pedes audiunt.

De brachiis

E 3

142 Su-

a) De mirabilibus ejus vasis vid. Ruysch: Adversaria. at. Dec. II. Observ. i.

b) Haud pridem inter *Andryum* & *Peticum* Parisiis hinc ortæ sunt, utrum hoc ligamentum vocandum sit *teres*, *planum*. Planum revera in cadaveribus deprehenditur, teres; attamen usu invaluit, ut præstantissimi etiam atomici illud *teres* appellaverint.

142 *Superiores* complectuntur *scapulam*, *claviculam*, *os humeri*, sive *brachii*, *cubitum*, & *manum extremam*.

Scapula.

143 In *SCAPULA*, quæ Græcis *homoplata* vocatur, consideramus situm, numerum, figuram, connexionem, substantiam tenuem, satis firmam, *caput* cum cavitate glenoidea, (quam nonnulli *acetabulum scapulæ* appellant) *collum*, *basin*, *angulos* duos, *superiorem* & *inferiorem*; *costas* *superiorem* & *inferiorem*; *superficiem* *anterior*em, qua *costis* incumbit, *lævem*, & *conca-*
vam, *posteriorem* vero, *inæqualem*; *spinam præ-*
terea, *cristam*, *acromion*, *cavitatem* *supra* & *in-*
fra spinatam, *processum coracoidem*: duas inci-
suras, una inter *acromion* & *collum*, alteram
in *costa superiori*, juxta *processum coracoidem*,
ubi *musculus coracohyoideus* oritur; *ligamentum*
robustum, *acromion* & *processum coracoidem*
jungens, atque *luxationem humeri sursum im-*
pediens. *Usus*, 1. *sustinere* & *connectere bra-*
chium cum trunco; 2. *ortum aut finem præbere*
multis musculis; 3. *defendere aliquo modo con-*
tenta thoracis. Denique notamus, *acromium* &
processum coracoidem in *junioribus* esse *cartila-*
gines, postea fieri *epiphyses*, & tanquam *ossa*
distincta circa annum xvi. imo *circa vigesimum*,
quod in primis de *processu coracoidem* valet
adhuc deprehendi.

Clavi-
cula.

144 In *CLAVICULA*, quæ primum fere os
in *foetu*, observamus *nominis rationem*, *nume-*
rum, *situm transversum*, & *connexum cum sterno*
no atque acromio, *interventum cartilaginis mo-*
bilis; *figuram*, quasi litteræ *s*; *substantiam*, *spon-*
giotam, *fragilem*; *corpus*, pro *puncto fixo mus-*
culi pectoralis, deltoidis, mastoidei, &c. & *pro-*
tuberantiam pro *musculo subclavio*, unde etiam
ligamentum ad processum coracoidem abit; duas
extremitates, *rotundiores*, quæ cum *sterno* &
co-

ossa prima jungitur; planiorem, quæ cum acrobio articulatur: defectum in plerisque quadrupedibus: usum 1. pro brachii sustentatione, ne nimis, ut in bestiis, versus pectus ruat: quo ipso magna brachio agilitas conciliatur; 2. pro muscutorum variorum origine; 3. pro defensione magnorum, quæ subjacent, vasorum subclavulorum.

145 IN OSSE HUMERI sive BRACHII consideramus primo situm, juncturam, magnitudinem; deinde *corpus* multis musculis pro origine et fine interveniens; quod superius crassius est & rotundius, inferius tenuius & compressius: porro *tuberculantiam* asperam circa medium, cui spectatim musculi deltoidei & pectorales inferuntur; *sinuam* externam & internam, in duos condylos effinentes; intus *cavitatem* insignem, medullam continentem; motum præ omnibus reliquis ossibus liberrimum, sive amplissimum.

146 In *extremitate* vero ejus *superiori*, *caput*, magnum, levi cavæ scapulæ junctum, hinc tam facile excidit: *collum*, cui ligamentum annulare multi musculi bicipitis includuntur: & duo *tubercula*, majus & minus.

147 In *extremitate inferiori*, figuram & articulationem cum ossibus cubiti, ope trium capitulorum & duarum cavitatum: (a) duos *condylos*, & duo *tubercula*, quorum externus extensoribus, internus flexoribus carpi punctum fixum largitur; duas *foveas*, anteriorem & posteriorem, in extensione & flexione cubiti, duos ulnæ processus alternatim excipientes.

148 In CUBITO consideramus generatim situm, numerum ossium binarium, *ulnam* sive *cubitum*, stricte sic dictum, & *radium*, ob flexionem seu motus diversitatem; magnitudinem & affinitatem eorum diversam; *juncturam*, tam in-

E 4

ter

a) Delineatur hic articulus a Cantio Tab. 5 fig. 3.

ter se in extremis, quam cum osse humeri & carpo; *ligamentum* robustum, quo utriusque corpora colligantur: 1. pro firmiori connexione; 2. pro musculorum hic copiosorum commoda origine.

Ulna.

149 Speciatim in ULNA, (quæ & cubitus dicitur) si manus supina consideratur, notamus situm interiorem; longitudinem radio majorem; angulos sive *spinas* tres, quarum exteriori prædictum ligamentum, (S. 148.) duabus vero internis muscoli varii inseruntur. Motum admittit flexionis & extensionis.

150 In extremitate superiori, cavitatem 1. insignem, *sigmoideam* dictam, aut *semilunarem*, cum eminentia in medio, eminentiis & cavitati ossis humeri respondentem; 2. *cavitatem* exiguam in latere externo, pro articulo cum crista radii & duos *processus*; anteriorem coronoidem, & posteriorem *anconæum* sive *olecranon*, eorumque usus: *collum*, & mox sub eo *tuberculum*, pro insertionem muscoli brachialis interni, flexoris cubiti.

151 In inferiore, capitulum, malleolum quasi constituens; in quo 1. *cavitas* levior pro articulo cum carpo; 2. *apophysis* parva *styloides*, pro firmiori articulatione carpi, ne hic facile luxetur; & 3. *crista*, pro articulo cum radio; 4. *cavitas* inter hanc cristam, & processum styloidem, pro situ tendinis muscoli ulnaris, carpi extensoris, notanda.

*Radi-
us.*

152 In RADIO animadvertimus situm exteriorem; longitudinem ulna minorem; *spinam*, cuius ligamentum (148) inseritur; motum pronum & supinum. (a)

153 In extremitate superiori, capitulum cum ca-

(a) Radium in quadrupedibus arte concretum esse cum ulna, sicuti fibula cum tibia: quia illis motus pronus & supinus deest, notavit Schelham. Analest. dissert. V. §. 7.

vitate glenoidea pro articulo cum capitulo humeri; ejus *cristam*, quæ cum ulna ad latus articulatur; collum, & ultimo *tuberculum*, pro musculi dicti *bicipitis* insertione.

154 In *inferiori*, spectamus capitulum superiori crassius & angulosius, in cuius extremo *manica fossa*, pro articulo cum carpo, in latere inferiori *foveam*, pro rotatione cristæ ulnæ; in latere exteriori, *apophysin* brevem, crassam, pro ædicto carpi articulo firmando; in facie posteriori, aliquot leves incisuras: in quibus collocantur tendines musculorum extensorum manus digitorum, præsertim vero pollicis.

155 Sequitur jam MANUS EXTREMA, quæ *carpum*, *metacarpum*, *digitos*, & *ossa sesamoidæ* dividitur.

156 In CARPO considerata *definitio*, *situs*, *figura octo* in infantibus adhuc cartilaginea; hominum *figura* irregularis; *connexio*; pars posterior convexa; pars opposita, concava, pro communi tendinum & vasorum ad manum, digitorum transitu; *ordo duplex*, superior sive primus quasi capitulum efficit, pro articulo mobili cum radio; inferius vero cavitatem format pro recipiendo ordine inferiori, qui ossibus metacarpi articulatur, ubi vero in articulo primi & secundi ordinis horum ossiculorum inter se motus deprehenditur. (a) Hinc *articulus ossium carpi* triplex est; 1. inter se, 2. cum cubito, 3. cum metacarpo. (b)

157 IN METACARPO examinanda *ossa quatuor*, eorumque triplex quoque, cum inter se, cum carpo & digitis *articulatio*, atque in quo-

(a) Manifestum hanc in medio carpo articulationem se primo observasse affirmat idem *Schelham*. In Programmate hensi ultimo.

(b) Sunt, qui *carpi* ossiculis nomina imponunt; quod pro supervacaneum esse censemus. Si tamen forte distinguenda vel nominanda, numero illud fieri posse censeo.

quovis esse corpus & extremitates. In corporibus, figuram observamus quasi teretem; cavitates intus pro medulla; magnitudinem, ossa digitorum superantem. Pars gibba sive postetica earum *dorsum manus*, concava *volam* conficitur. Corpora a se invicem distant, & interstitia musculis *interosseis* dictis, digitos moventibus, replentur; capitula vero, sive extremitates junctæ & contiguæ sunt. Magnitudine inter se differunt illud enim, quod digitum minimum sustentat, minimum est; subsequencia versus pollicem, sensim fiunt longiora, aliter quam ossa digitorum. Extremitas carpo junctæ irregularis est figuræ sed quæ digitos tangit, capitula habet rotunda satis magna, quæ cum cavitate glenoidea digitorum articulantur.

Digiti.

158 In DIGITIS notamus situm, numerum nomina cuique peculiaris: ut *pollex*, *index*, *medius*, *annularis*, *auricularis*. Ossa tria sunt in unoquoque, quæ tres ordines, *phalanges* dictæ conficiunt: quarum superiores longe majores inferioribus. *Superficies* earum exterior gibba est interior plana & concava, ob prehensionis commoditatem. Prima phalanga, ubi cum capitulis metacarpi jungitur, cavitatem habet glenoideam, & motum quaquaversum. In altero extremo duo capitula, cum duabus cavitatibus secundæ junctæ, ubi flexio tantum & extensio fieri potest: quod eodem modo inter secundam & tertiam se habet. In superiori extremo phalangæ secundæ & tertiæ, inter duas cavitates, exigua eminentia adest, eundem præstans usum, quem olecranon. Extremitas ultima tertiæ phalangæ apicem habet paulo latiore, quam corpus, ut digitorum extrema fiant ampliora, pro variis usibus.

Pollex.

159 POLLEX speciatim crassiora habet ossa: quorum primum figura, articulatione, situque
qui-

dem convenit cum ossibus metacarpi, verum
 motu ab his differt. *Articulatio* primæ
 alangæ cum secunda, & secundæ cum tertia,
 coincidunt cum articulatione & motu secundæ
 tertiæ ceterorum digitorum. In reliquis di-
 gitis, præter ea, quæ jam dicta sunt, nihil pe-
 ciliare notandum occurrit. Restant *ossa sesamoi-*
deæ manus examinanda: sed de his infra §. 180.

DE EXTREMITATIBUS INFERIORIBUS.

160 EXTREMITATES INFERIORES, PE-
 ES dictas, constituunt, *femur*, *tibia* sive crus,
stella, *pes extremus*, & *ossa sesamoidæa*, totum
 corpus sustentantes.

161 In FEMORE, maximo & robustissimo *Femur*,
 majus corporis osse, consideramus situm, nume-
 rum, figuram, magnitudinem, motum, corpus
 extremitates, una cum eorum usibus.

162 In extremitate superiori perlustramus 1. *ca-*
pit magnum, & in hoc *fossam*, pro ligamento
lundo, sive *tereti* vulgo dicto, (licet revera
anum sit) (*a*) quo acetabulo jungitur, ne fa-
 luxetur; *locumque*, ubi hoc ligamentum ace-
 tabulo adhæret; *situm* capitis obliquum, & *ar-*
culum cum acetabulo. 2. *collum*, cui ligamen-
 tum robustum annulare, ab ambitu acetabuli o-
 ndum, inseritur, (*b*) quod collum & caput
 asi in *capsula* continet, pro firmiori articula-
 one. Præterea colli hujus progressum, non
 erpendicularem, sed obliquum, fere horizon-
 tem, extrorsum vergentem, pro femoribus
 magis disjungendis, ut firmitus stare & incede-
 queamus, & ob meliorem multorum muscu-
 lorum

a) De lite circa hoc ligamentum vid. *Examen de divers-*
ités d' Anatomie &c. par M. Andry. pag. 77. & seq.

b) Delineata hæc vid. in *Vesal.* cap. de Ligamentis, &
Wurdon. Tab. anat. 5. fig. 31. Vasa vero eorum eleganter
 picta in *Ruyfchii* Advers. Anatom. Decad. II. Tab. III.

lorum hic requisitorum collocationem; *substantiam* ejus spongiosam, cavernosam, ob quam saepe frangitur; *foraminula* pro ingressu vasorum nutrientium. 3. duas apophyses, *trochanteres* dictas, majorem sive externam, & minorem sive internam, musculorum femoris insertionibus inservientes; quæ vero una cum capite ante pubertatem distinctæ epiphyfes sunt. (a)

163 In extremitate inferiore contemplanda; duo capitula & cavitas media, pro articulo cum tibia; 2. *cavitas posterior*, pro tuto vasorum atque tibiam transitu; 3. *cavitas anterior*, pro patellæ collocatione & motu; 4. duo *condyli*, sive tubercula juxta capitula, pro musculorum pedem moventium puncto fixo; in quorum exteriori in peculiari conspicienda fovea, sæpe insigne ossis sesamoideum; quandoque etiam minus in altero tuberculo, præsertim in valde senibus, reperitur. (b) Tota hæc extremitas ad pubertatem usque distinctissima conspicitur epiphysis.

164 In corpore femoris notamus faciem anteriorem convexam, posteriorem concavam; ejus obliquitatem singularem, sive naturalem inflexionem; robur ingens; *spinam*, sive *lineam asperam*, pro muscoli tricipitis insertionem; & cavitatem magnam, pro medulla multa condenda. *Usus* ossium femorum est, ut corpus sive truncum sustineat, quando stamus vel ambulamus, & ut super capitibus eorum præcipua totius corporis flexio fiat. (c)

Patella.

165 PATELLA, quæ & ROTULA dicta, consideranda offert situm, figuram, numerum, ma-

(a) In superiori parte articuli femoris & ossis innominati *ligamentum* esse robustum, a D. Douglas inventum, quod valde muniret hunc articulum, ne mole corporis hic fieret luxatio; scribit Cheselden. in Anatomie sua. Verum quia illud clarius non describit, reperire hucusque non potui.

(b) Vid. delineatio eorum Tab. nostra I. fig. 2. 3. & 4.

(c) Schelham. Analect. diss. VI. §. 71.

gnitudinem, crassitiem diversam, superficiem anteriorem, æqualem, leviter convexam; & posteriorem, inæqualem, eminentia & duabus eis præditam; substantiam spongiosam & frægem; connexionem per tendines & ligamenta in femore (a) & tibia; motum ascendentem descendente in flexione & extensione tibie, denique usum, pro robore conciliando multis tibiam extendentibus, quibus pro trochlea servit, ut firmius stare & incedere valeamus. *infantibus*, imo & in pueris, mere adhuc *car-ginea* est.

66 In TIBIA sive CRURE in universum *Tibia*. amamus situm, os duplex, *tibiam* stricte sic dictam, & *fibulam*; magnitudinem & crassitiem eam diversam; articulationem utriusque tam inter se, quam cum femore & pede extremo.

67 In *tibia* speciatim situs in interiori cruris parte; corpus & extremitates perpendenda. *extremitate* vero *superiore* crassities, duæ cavitates glenoides, pro articulo cum femore, quibus duæ cartilagines *semilunares* mobiles inhaerent; (b) eminentia interjecta, quasi bifida; nervosorum & quasi *cruciformium* ligamentum, quibus femori jungitur (c), insertione; *vitæ* post hanc eminentiam, in qua *glandula serosa* collocatur. In facie anteriori tuberculum, extensores tibie, quibus patella innata est, præbentur; ad latera duo tubercula, punctum præbentia musculis quibusdam pedis extremi; quorum exteriori etiam arcte jungitur *fascia*: sic tamen, ut hæc nihil faciat ad articulationem cum femore, quia femur non attingit.

168 In

a) Ligamentum, quo femori jungitur, vid. in *Ruyssch* f. anat. VII. Tab. 3. fig. 1.

b) Vid. *Morgagn.* Advers. II. fig. IV. & V. *Winslow* Hist. Acad. Reg. Scient. An. 1719. qui de illarum mechanica dispositione & usu eleganter differit, & *Cant.* Tab. 5.

4. (c) *Bourdon.* Tab. anat. V. fig. 33.

168 In *extremitate inferiori*, notamus excavationem pro articulo cum tarso; in latere exteriori aliam pro articulo cum fibula; in latere interno apophysin crassam & robustam, *malleolum internum* dictam, pro articuli pedis firmitate. Utraque extremitas ad pubertatem usque dictis constat ossibus.

169 In *corpore* tres angulos sive spinas: quarum exteriori *ligamentum interosseo* jungitur fibulam cum hoc conjungens; anterior acutissima est, sed roboris causa crassissima, sola cute & periostio tecta: quapropter in contusionibus ejus dolorum valde sensibilem sæpe causa. Anguli in infantum tibiis vix apparent, sed eorum tibiæ fere cylindricæ sunt, tandem vero angulosæ fiunt. Denique tibia intus cavitatem pro medulla habet insignem.

Fibula. 170 In FIBULA, quæ & PERONE auditur, examinamus situm & juncturam, longitudinem crassitiem valde exiguam; *capitulum superius* quod articulationem cum femore non attingit sed tantum tibiæ lateri externo jungitur; *inferius*, *malleolus externus* dictum, ad articulum cum tarso concurrat, sua eminentia articulum firmat, & sic facilem luxationem multum impedit. *Corpus* fere triangulare est, & a tibia distat; ejus spinæ acutiori *ligamentum* inseritur *interosseo*, quod cum tota fibula pro commodiori insertionem musculorum multorum pedis extremitati inservit. *Motum tibiæ* unice sequitur, nullum habens peculiarem.

Pes extremus.

171 In PEDE EXTREMO consideramus situm, longitudinem in homine præ reliquis animalibus longissimam, ob firmiorem incessum pedis deinde *dorsum*; *plantam*, quæ concavæ ne vasa, dum homo stat vel ambulat, facile comprimantur; partes, quibus, dum stamus vel ambulamur, proprie insistimus; divisionem in

sum, metatarsum, digitos & ossa sesamoidea.
 72 In TARSO notamus situm, numerum *Tarsus*,
 stenarium ossum, ut *astragalus*, *calcaneum*,
naviculare, *cuboides*, & *tria cuneiformia*; ho-
 n figuram irregularem; articulationem cum
 ia, inter se, & cum ossibus metatarsi: atque
 onnexionem per ligamenta fortissima: denique
 tum in recens natis: ubi pluraque adhuc sunt
 filaginea.

73 Nominatim in *astragalo*, qui & *talus* vo-
 ur, situs, figura, articulatio cum tibia, fi-
 a, & calcaneo, atque capitulum pro articu-
 cum naviculari præcipue notanda.

74 In calcaneo, seu *osse calcis*, consideran-
 situs, figura, magnitudo, articulatio cum
 agalo & osse cuboide, apophysis retrorsum
 minens, ad lapsum supinum prohibendum,
 cujus faciem posteriorem inseritur tendo A-
 llis omnium fortissimus. In latere interiori
 avatio, pro tuto vasorum transitu ad meta-
 sum & digitos, conspicitur.

75 In *naviculari* seu *scaphoide*, situs, articu-
 o, cavitas glenoidea, pro capitis astragali ar-
 tulatione, & tres facies anteriores, ossa cunei-
 mia excipientes, perpendenda se offerunt.

76 In *cuboide* iustramus situm, in tarso late-
 externo, ubi sustinet os metatarsi extimum,
 id minimo digito articulatur, & simul os me-
 tarsi huic proximum; deinde articulationem
 in ossibus vicinis; *incisuram* in inferiori par-
 te in qua os sesamoideum frequenter, in ten-
 de musculi peronæi postici, reperitur.

77 In ossibus tribus *cuneiformibus* situm, ma-
 tudinem diversam, articulationem cum navi-
 ri & tribus ossibus metatarsi, pollicem scili-
 secundum, & tertium digitum sustentantibus.

78 In METATARSO notamus situm; os- *Meta-*
 quinque, in quibus corpora fere teretia, su- *tarsus*.
 perius

perius convexa, inferius concava, interstitia pro collocandis musculis interosseis; capitula posteriora, cum tarso juncta, inæqualia anteriora rotunda, pro articulo cum digitis, quæ multum eminent, ut vim musculorum digitos flectentium augeant; magnitudinem diversam horum ossium apophysi in extimi sive quinti ossis capitulo posteriori magnam, cui pes, adeoque tota mole corporis multum insistit.

Digiti. 179 In **DIGITIS PEDUM** pleraque ita se habent, ut in manuum; attamen tredecim plerumque tantum in adultis, sæpe tamen etiam quatuordecim hic inveniuntur ossa, longe minorra & tenuiora, quam in manibus (si pollex excipiat). Motum habent strictiorem, quam digiti manuum; atque digitorum maximus est pollex, quamvis solum duo habeat ossa sive internodia; reliqui sensim minores, aliter quam in digitis manuum: digitusque minimus ut plurimum, & sæpe etiam huic proximus, duo tantum distincta in senibus habent ossa, quia duæ ultimæ phalangæ haud raro concreescunt: hinc non nisi duodecim tunc numerare possumus.

Ossa sesamoides.

180 Superfunt **OSSA SESAMOIDEA**: quæ sunt parva officula; in annosioribus & senibus maxime conspicua, ad figuram seminis sesamaliquanto accedentia: quorum situs frequentissimus 1. in pollicibus manuum & pedum, in quolibet sæpe duo, non raro tantum unicum 2. unum in junctura metacarpi & digiti auricularis, in abductore hujus digiti frequentissime hærens (*a*); 3. unum sæpe in quovis condylo externo femoris (*b*); 4. unum sub osse cuboidei tarssi, in tendine peronæi postici. Hæc quatuordecim in virili ætate & senibus plerumque reperiuntur, quandoque tamen etiam unum in condy-

(*a*) Vid. ejus figura & situs in Tab. nostra I. fig. 5.

(*b*) Tab. I. fig. 2. 3. & 4.

condylo femoris interno, sed rarissime. Aliquot
es etiam unum in facie externa ossis metacar-
i, quod indicem sustentat, in tendine muscoli
ductoris indicis reperi; sæpius vero in pollici-
us manuum alterum deest. Plura igitur sede-
m rarissime, sed frequentius pauciora inve-
iuntur; hinc errant illi, qui ultra quadraginta
generatim adesse scribunt & numerant, atque
ivis digitorum articulo duo & adpingunt, &
scribunt, ut tamen plurimi fecerunt. Omnia
hærent tendinibus musculorum, exceptis iis,
æ in condylis femoris reperiuntur: hæc enim
incipiis musculorum innascuntur. Figura &
agnitudo eorum diversa est & irregularis. In
rioribus cartilaginea sunt, idcirco facilius in
nibus reperiuntur. Musculis pro trochleis in-
erviunt, eorumque vim augent. Conf. Notæ
b signo (1*).

DE NUMERO OSSIUM.

181 Exhibitis sic ossibus omnibus totius cor- *Nume-*
ris, facile jam erit *numerum* eorum nosse, in *rus of-*
o determinando Auctores tantopere variant. *fium.*
senibus plerumque ultra 260. non reperiun-
r; in juvenibus & pueris major quidem est
merus, verum incertior; quia multa in unum
stea concresecunt.

capite exposuimus sexaginta novem: ex qui-
bus cranium, una cum sex ossiculis auditus,
habet

	—	—	—	—	14
maxilla superior	—	—	—	—	13
maxilla inferior	—	—	—	—	1
dentes in utraque maxilla			—		32
os hyoides	—	—	—	—	5
larynx	—	—	—	—	4
<i>trunco</i> adsunt ossa 53. nimirum vertebræ					24
costæ	—	—	—	—	24

F

ster-

sternum (licet sæpe ex duobus frustis constet)				
os sacrum	—	—	—	
os coccygis	—	—	—	
ossa innominata	—	—	—	
In extremitatibus adsunt ossa 138. ut scapulæ				
claviculæ,	—	—	—	
ossa humeri,	—	—	—	
— ulnæ,	—	—	—	
— radii,	—	—	—	
— carpi, in singula manu octo,				16
— metacarpi,	—	—	quatuor,	8
— digitorum,	—	—	15.	30
— femoris,	—	—	—	
— tibiæ,	—	—	—	
— fibulæ,	—	—	—	
rotulæ sive patellæ,	—	—	—	
ossa tarsi utriusque pedis,			—	12
— metatarsi,	—	—	—	10
— digitorum,	—	—	—	20
— sesamoidea raro ultra 16. reperiuntur,				16

Igitur totius numerus sive summa erit — 260

182 EPIPHYSES (§. 51.) in hominibus circa annos pubertatis facile adhuc 124. distinctæ demonstrari possunt; quæ si his 260. addantur, numerare possumus in universum ossa corporis humani 384.

DE JUNCTURIS SIVE ARTICULATIONIBUS OSSIUM.

De jun-
cturis
ossium.

183 DE JUNCTURIS OSSIUM, quarum scientia in chirurgia adeo necessaria, Anatomici vulgo agere solent in principio osteologiæ; quod ego in fine ejus, cognitis prius ossibus, rectius fieri existimo: quapropter jam ad eas progredior.

184 Græci nomina iis imposuerunt Græca, a
figu-

ura articuli & medio conjungente desumpta; quorum vero explicatione, quia scriptores anatomici immensum variant, & confuse multi scribunt, sequenti modo eas, & ex mente *Galen* & *Hippocratis*, optime dispesci atque explicari esse credidi; alio tempore prolixius forte de acturus.

185 SYNTHESESIVE SYNTAXIS OSSIUM, (Latinis *commissura*, *conjunctio*) genus est ad hos Auctores omnium juncturatum, tam cum, tam sine motu, complectens duas species.

Artbron, id est, *articulum*, *juncturam*: quæ considerat contactum ossium sive figuram conjunctionis, sine respectu ad connexionem. Hujus species rursus duæ sunt:

Diarthrosis, motum habens manifestum; quo comprehenditur

(*Enarthrosis*, quando caput profundæ cavitati jungitur: ut caput femoris cum acetabulo.

Arthrodia, quando caput cavitati leviori jungitur: ut junctura humeri cum scapula.

(*Ginglymus*, si os suscipit & suscipitur: (Gallicis, *charniere*) sicut in junctura humeri cum cubito &c. Quibus a Fallopio *Trochoides* additur, ubi motus instar rotæ circa axin, sicut articulus primæ colli vertebræ cum secunda. His a recentioribus quibusdam adjecta est *Amphiarthrosis*; qua comprehendere volunt omnes juncturas cum motu manifesto, differentes a præcedentibus, vel figura, vel motu.

Synarthrosis, motum habens vel

(*obscurum*, ut ossa carpi, metacarpi, tarfi, metatarfi &c.

nullum, cujus species sunt: *sutura*, *harmonia*, *gomphosis*.

Symphysis, s. *unionem*, indicans ossium connexionem: & fit vel

sine medio, (scil. alieno, aut ab osse in adjectis diverso) ut in osse frontis, maxilla inferiori, ossibus innominatis, & vertebrae &c.

cum medio, (scil. alieno, ab osse adhuc diverso): cujus pro diversitate tres sunt species, ac quælibet cum & sine motu, ut

Synchondrosis, in ossibus pubis, vertebrae inter se &c.

Synnevrosis, in omnibus juncturis artuum futuris cranii &c.

Syssarcosis, in scapulis, osse linguale, gignivis &c.

DE PERIOSTIO, MEDULLA, LIGAMENTIS, ET CARTILAGINIBUS, tanquam partibus ad ossa adhuc pertinentibus

Periostium.

186 PERIOSTIUM est membrana nervosa vasculosa (a), sensus acutissimi; omnia ossa externe & interne proxime investiens, dentibus quantum super gingivas eminent, locisque, ubi muscoli inseruntur, exceptis; hinc in *externum* & *internum* dividitur, vocaturque *pericranium* ubi ossa cranii extus, *dura mater* vero, ubi intus ea investit.

187 Constituit rudimenta ossium in utero; organum est secretionis materię ossę, sicut membrana adiposa pinguedinis, & ossa ab hoc accretionem, augmentum, & nutritionem capiunt nam hujus vasa sanguifera ossa innumeris in locis penetrant, sicut in juniorum ossibus maxime observatur. Sensum ossibus largitur: nam hoc orbata, uri & secari possunt sine dolore. Termin-

(a) Vascula hujus copiosissima variis in figuris exhibuit *Ruyshius*.

oluminum & figuram præſcribit offibus: nam ubi eſum eſt, exoſtoſes, tophi, caries &c. oriuntur. Diverſam in variis partibus habet craſſitiem; internum tamen exteriori longe eſt tenuius, & offe intus nutrit; vaſaque ſanguifera & nervos recipit per ſingulares canales, offibus hinc inde ſculptos, quæ cum medulla communicat. Ori vulgo dicitur a dura matre cerebri: quod vero recte loquendo dici non poteſt; quia ſimul & eodem tempore cum dura matre in fœtu generatur.

188 MEDULLA, maſſa olim informis habita, conſtat ex ſubſtantia oleoſa, pingui, ſubtili, minutiffimis veſiculis membranaceis, in quibus e ſanguine arterioſo, fere ut pinguedo, pinguis hæcce ſubſtantia ſecernitur; contineturque plerique offium cylindricorum cavitatibus: ſed in cavernoſis offibus ſuccus tantum rubicundus, pinguis, quaſi medulloſus, deprehenditur. Maſſa medullæ, per prædictos canales, hinc in offibus occurrentes, ad cava offium penetrant: arteriæ materiam medulloſam adferunt & ſecernunt, venæ ſanguinem redundantem revehunt; nervi vero ſenſum ejus veſiculis largiuntur. (a) neque creſcit, neque decreſcit ſecundum lunæ augmentum vel decrementum, ut nonnulli exiſtimant; ſed prout animalia motu exercentur, vel quiete gaudent, idoneo & ſufficienti, vel inepto ſubulo, fruuntur. Hæc ſubtilis pinguedo ſive oleum, interſtitiis fibrarum offearum ſe inſiſtens, offa ab ariditate & fragilitate præſervat; non ea, ut olim putarunt, non nutrit.

189 LIGAMENTA ſunt vincula robuſta, ut primum membranacea, juncturas mobiles ſpectant annuli cingentia, connectentia, offiumque illis firmiſſime innata; nunc cartilaginea, nunc

F 3

ner-

a) Experimenta Duvernei hac de re vid. in Hiſt. Acad. Scienc. A. 1700.

nervea quoque aut tendinea, sive teretia, colligandis ossibus destinata. Dantur quidem adhuc alia ligamenta, quam quæ ossa ligant; sub quibus vero semper partes membranaceæ intelliguntur, certas partes colligantes; ut ligamenta musculorum, linguæ, uteri, penis &c. de quibus suo loco.

Cartilaginee.

190 **CARTILAGINES** deinde ad ossa pertinent, quæ, ut §. 31. dictum est, sunt partes ossium æmulæ, elasticæ; nihil vero plerumque vel parum medullæ aut medullosi continentis.

191 Cinguntur suo *perichondrio*; & 1. ad ossa conjungenda, ut in vertebra, &c. 2. ad cavitates articulorum formandas; 3. ad extrema ossium obducenda; eaque polita, & lævia reddenda, ubicumque eorum motus requiritur, inseriuntur. Ceterum etiam ad asperam arteriam, laryngem, bronchia, nares, aures, oras palpebrarum, aliasque partes, de quibus infra, constituendas, utilissimæ sunt.

DE SARCOLOGIA,

& quidem primo

DE TEGUMENTIS COMMUNIBUS CORPORIS HUMANI.

192 Consideratis hactenus ossibus, tanquam fulcris machinæ humanæ, partibusque ad ea pertinentibus, progredimur nunc ad partes molles examinandas: quarum doctrinam §. 35. **SARCOLOGIAM** vocavimus.

193 Dividi hæc potest 1. in doctrinam de *Tegumentis* sive *velamentis communibus* corporis humani, 2. in *Splanchnologiam*, 3. in *Anchiologiam*, 4. *Neurologiam*, 5. *Myologiam*, & 6. *Adenologiam*.

194 In

194 In Splanchnologia considerantur 1. viscera abdominis *chylopæa*, sive digestionis alimentorum destinata: quæ sunt, ventriculus, intestina, hepatis, lien, & pancreas; 2. *uropæa*, sive urinæ secretioni inservientia; ut renes, ureteres, vesica urinaria, urethra; 3. *partes generationi destinatae*; 4. *organa respirationis & circulationis sanguinis*, in thorace & collo sita; ut pulmones, cor, diaphragma, partesque ad has pertinentes; & denique ultimo *cerebrum, organaque sensuum* in capite collocata.

195 Antequam vero ad interiora pergamus, **MEMBRAMENTA COMMUNIA**, totum corpus tangentia, prius consideranda sunt; quorum in bestiis quidem plura, in homine vero non nisi tria reperiuntur: ut **CUTICULA, CUTIS, & EPIDERMIS**, s. *membrana adiposa*: quas partes jam, cum sequentibus reliquis, in forma tabularum, ut vocant, exhibebimus; ut tyrones in sectionibus omnia, quæ in parte quavis corporis notanda & discenda occurrunt, uno quasi intuitu perspicere intuerique possint.

196 **CUTICULA** est membrana tenuis, totam cutem, cujus quasi pars est, arcte ambiens, inde & Græco vocabulo *Epidermis* vocatur. In hac notanda:

ad hæc, firma cum cute, interveniente corpore reticulari *Malpighii*; sic, ut in sectione cadaverum non scalpello, sed aqua fervente separari possit. Alias tamen etiam in viventibus eam putrefactione, igne, & vesicatoriis a cute recedere observamus.

Color, in Europæis albus; in *Æthiopibus*, niger. *structura vel substantia* ex minutissimis lamellis, & quasi squamulis, arcte tamen cohærentibus, microscopio observandis, constat: in quibus copiosissima

Foraminula, pilis, transpirationi, & sudori exitum.

rum, Mercurio aliisque rebus ingressum præbentia; *pore* vulgo dicta. His quidam *valvulas* tribuunt, pro sudore moderando; quod tamen vi elastica horum vasorum potius fieri existimo.

Crassities diversa, eaque maxima in plantis pedum & volis manuum: reliquis in partibus valde tenuis.

Sulci, sive *lineæ*, incisuræ Plinio, varii, profundiores, & leviores ubique, præsertim vero in volis manuum, conspiciuntur; ex quibus multi vaticinari conantur. In apicibus digitorum spirales sunt, ductusque cutis excretorios, certo ordine hic dispositos, defendere videntur.

Regeneratio, in viventibus facilis est; attamen ejus *Ortus*, non a condensatis ab aere exhalationibus corporis, ut veteres voluerunt; sed potius secundum *Leeuwenhœkium*, ab expansione ductuum cutis excretorios; vel secundum *Ruyfchium* ab expansione papillarum cutis nervearum, multas minimas squamulas sive lamellas, inter se cohærentes, conficientium; ut mihi videtur, ab utrisque simul. Vid. Notæ sub num. (2*)

Vasa, neque a *Ruyfchio* subtilissimis suis injectionibus detegi, neque ab aliis adhuc certe demonstrari possunt; hinc læsa sanguinem non fundit, & sensu fere destituitur; a subtili tamen liquido eam nutriri & regenerari necesse est.

Usus, 1. defendere cutem ab attritu, dolore, & siccitate, atque sic 2. sensum tactus juvare, & moderari, 3. moderari humorum nimiam exhalationem.

197 CORPUS RETICULARE MALPIGHII, sive RETICULUM CUTANEUM, est tenuissima membranula, innumeris minimis for-

foraminulis, reticuli instar, perforata, cuticulæ proxime subjacens, eique, dum vel arte vel calore a cute aufertur, firmissime adhærens, ut vix de separari possit, & interior quasi tantum ejus superficies videatur. In hoc examinanda.

Locus, ubi maxime reperitur: illis in partibus, ubi sensus cutis exquisitissimus est, nimirum in volis manuum, apicibus digitorum, & plantis pedum; deinde etiam in lingua, & quidem longe manifestius & accuratius, quam alibi conspicitur; ex qua etiam ejus natura & constitutio melius patent, quam ex omnibus aliis partibus. In aliis partibus ob tenuitatem vix conspicitur.

Color: in Europæis album est; in Æthiope vero (cute licet candidissima) nigerrimum: in semiæthiope, dilutius nigrum: hinc color hominum, & præcipue nigrities Æthiopum, maxime ab eo dependet. (a)

Uti: per foraminula sua pilos, papillas cutaneas, ductusque excretorios & absorbentes cutis transmittit; quæ certo ac determinato ordine detinet, ne facile de sede sua dimoveri queant: papillarumque mollitiem & ad tactum aptitudinem conservare videtur.

8 CUTIS est membrana robusta, instar corii crass-

a) Vid. *Ruyfchii* recentissimas hac de re observationes *Advers. anat.* Dec. III. pag. 26. qui etiam frustum cutis Æthiopis, cum cuticula ex parte inde separata & dependente, in spiritu mihi transmissit: in quo apparet cutis candidissima, ut in Europeis; cuticulæ superficies exterior, atra: interior vero, ubi reticulum conspicitur, nigerrima. In quo apparet, in corpore reticulari præcipuam nigritudinis sedem esse. Confirmat idem *Santorinus*, *Obs. anat.* 2. qui simul indicat, colorem cutis Europæorum multum colore bilis pendere; nam in ictero flavo, bilem quoque flavam; in ictero nigro, nigram; in chlorosi vero palam. Conferri de cuticula uberius merentur *Malpighius* *Tactus organo*, & *Ruyfchius* in *Epist. prima*, fig. 4. 5. & 7. qui posterior prioris inventum egregie illustravit.

crassa, elastica, totum corpus investiens: i qua consideranda

Connexio: superficies superior cum *reticulo Malpighii*, & cuticula: inferior vero cum *pinguedine*, & quidem in quibusdam locis laxè, in aliis arctissime, cohæret.

Crassities & durities varia, in variis corporis partibus & in variis quoque animalibus, sicut e diversitate corii patet.

Sulci, incisuræ sive *lineæ*, multi, cum cuticula communes.

Foramina } *majora*, ut in ore, naso, auribus
habet } & ubi tamen cutis potius reflexa
} quam perforata, dici potest.

minora, vulgo *pore*: qui rursus sunt vel *maiores* vel *minores*, pro pilorum, transpirationis, & sudoris exitu, mercuriique, contagiorum &c. ingressu. *Majores*, præsertim in naso, nudus oculus percipit; *minores* vero microscopia, atque mercurii transitus per corium demonstrant.

Structura sive *substantia* ex

Fibris tendineis singularibus tenacissimis implexis.

Vasis sanguiferis copiosissimis, ex *Ruyschii injectionibus* stupendis primum rite cognitis. Vid. ejus scripta.

Nervis copiosis, papillas ut plurimum *pyramidales*, per *rete Malpighianum* in cuticulam protensas, constituentibus; quæ in labris volis manuum, præcipue circa apices digitorum, & in plantis pedum, cuticula ablata maxime conspicuæ, *tactusque organum* constituent *primarium*. (a)

Glandulæ cutaneæ miliares copiosissimæ, a plerisque recentioribus, post *Stenonem* & *Malpighium*,

(a) *Ruysch. Epist. Tab. XVII. fig. & Advers. Anat. Dec. II. Tab. 1. fig. 3.*

ghium, in cute ubique statuuntur, pro secretionem materiæ exspirandæ; quæ tamen vix, vel saltem paucissimæ, demonstrari possunt, earumque attributa functio a solis in cute arteriolis fieri potest. (a)

olliculi sive *Receptacula cutanea*, aliorum forte sunt *glandulæ sebaceæ*. (b)

us cutis est: 1. partes subjacentes involvere & defendere; 2. organum tactus esse; & 3. emunctorium universale sanguinis, ope sudoris & transpirationis: quæ vero simul pro ariditate cutis avertenda inservit.

9 *PILI* ad cutim quoque referri solent; atque in capite, ubi *CAPILLI* dicuntur, maxime notabiles sunt: horum

ars extra cutem apparet teres: at microscopio perlustrata, inæqualis est, pellucida, & sæpe nodosa; sed nec cava (c), nec ramosa: extremitas vero sæpe instar penicilli in filamenta fissa.

ars intra cutem radix, & ob figuram *bulbus* vocatur: verissimiliter cava & vasculosa, ut pennæ avium juniorum in radicibus, quæ vasculosa pars folliculo includitur, in setis & majoribus pilis barbæ bovis, felis &c. conspicuo. (d)

rigo: in cute & infra cutem in pinguedine (e): probabiliter ex nervis, ob dolorem, qui in evulsione eorum percipitur. (f)

ateria nutriens eadem est, ac aliarum partium; non excrementitia, ut veteres voluerunt; nec post mortem crescunt, ut vulgo credunt, sicuti certo experimento edoctus sum. (g)

Color:

(a) Ib. Dec. I. pag. 9. (b) Ibid. descripta. Conf.

ota (3*) (c) *Leeuwenhæck* Act. Erud. 1683. p. 511.

(d) *Ghirac* in Suppl. II. Act. Erud. Tab. VIII.

(e) *Ruyfch.* epist. I.

(f) Idem Thef. Anat. X. pag. 5.

(g) Vid. & *Ruyfch.* Adversar. Anat. Dec. II. p. 46.

Color: in regionibus calidissimis, nigerrimus; in temperatis, fuscus vel niger: in frigidis, flavus, rufus, subfuscus; qui vero in senibus ubique in canum mutatur; & in cuprum transstantibus, in viridescentem.

Longitudo: ratione *partium corporis*, in capite longissimi sunt; ratione vero *subjectorum aut regionum*: sub zona torrida, brevissimi & crispissimi; in temperatioribus, longiores.

Consistentia ad tactum: 1. pro diversitate *subjectorum & regionum*: in Æthiopibus & siccioribus duriores; in humidioribus & infantibus molliores. 2. Pro diversitate *locorum corporis*: in pudendis & alis, durissimi; in capite molliores; in reliquo corpore, brevissimi & molliissimi.

Originis tempus: quidam connascunt, ut in capite, ciliis, & superciliis; quidam vero certam ætate proveniunt, uti barbæ, alarum, & pudendorum. Sic & quidam pili semper, quidam vero post nativitatem non crescunt.

Usus: 1. caput calefacere & ornare; 2. partes quasdam defendere, ut *cilia, supercilia, vibrissæ*; reliquorum vero pilorum non adeo manifestus.

200 UNGUIUM (§. 32.) situs, numerus, figura, magnitudo, & color omnibus nota sunt; sed notanda

Partes: pars extrema *apex*, opposita *radix* sive principium appellatur; hæc tenuior & mollior; illa crassior & durior; candicansque ad radicem pars *lunula* vocatur.

Substantia. Constant ex papillis cutaneis prolongatis, induratis, & ordine parallelo firmiter conjunctis; propterea in radice, ubi papillæ adhuc teneriores, valde sensiles; in apicem vero, ubi induratæ, sine dolore resecari possunt. Illæ papillæ tam a radice, quam ab inferiori

par-

parte, & cute proveniunt; propterea in progressu versus apicem, ob maiorem papillarum accedentium copiam, crassiores sunt & fortiores, earumque beneficio firmissime cuti subjunctæ cohærent. Aquatamen fervida in cadaveribus facile separari possunt.

Nutritio: Sicuti aliæ papillæ cutaneæ sua habent vasa, a quibus nutriuntur; ita & hæc ea habent in principio: quæ papillæ quasi radices sunt, ex quibus deinde simili modo, ut in pilis, fibræ solidæ induratae emergunt: atque sic eadem etiam ratione nutriuntur & crescunt. Cessat vero hæc accretio post mortem, secus ac multi perhibent. (a)

us: 1. munire digitos, ne tam facile ab injuriis externis lædantur. 2. In manibus apprehensionem, præsertim rerum subtiliorum, expeditiorem reddere. 3. Iis commode utimur ad partes prurientes scalpendas; & ad varia, sordes v.g. abradendas. 4. In pedibus ingressum firmant, & dolorificam allisionem præcavent, &c.

animalia quædam (in quibus analogam habet conformationem) eis apprehendunt, & prædam arripiunt: ut feles, leones. Aliquibus inserviunt hamorum loco, ut scandere possint, sicuti simiis, sciuris. Quædam iis loco calceorum, alia armorum loco utuntur; ut equi, boves, &c. dum iisdem se defendunt & feriunt. Vid. *Schraderi* nostri dissertatio de *Armatura brutorum*.

¶ In PINGUEDINE (§. 28.) seu MEMBRANA ADIPOSA notanda

us: ubique fere per totum corpus sub cute; præterea inter muscutorum interstitia, in orbita oculi, in omento, mesenterio, circa renes, & variis aliis in locis.

Sub-

(a) Confirmat hoc *Ruyfch.* *Advers. Anat.* Decad. II. pag. 46.

Substantia ex

Membrana tenui transparente, innumeras cellulas, seu loculos, inter se invicem communicantes, habente, &

Materia pingui, oleosa, quasi butyracea sanguinis, cellulas has replente: ex arteriis illius membranæ, non ex glandulis, secreta. In valde emaciatis vero tantum adest membrana illa cellulosa, a materia pingui vacua.

Distinctio Authorum inter *adipem* sive *sebum*, & *pinguedinem*: secundum quam in homine non datur verus adeps.

Vasa sanguifera, arteriæ & venæ, a partibus vicinis copiosa, cellulas membranaceas aduentia & quasi cingentia; *nervi* vero pauci; hinc parum sentit.

Vasa adiposa, tanquam peculiaria vasa, a quibusdam adduntur; quæ vero a vasis laterali-
bus sanguiferorum & prædictis cellulis non distincta esse arbitramur.

Circulatio; motus, sive regressus pinguedinis ad venas, ex consumptione ejus in certis morbis & motu fortiori animalium, sæpe valde celeri, abunde patet.

Usus; 1. defendere corpus vestimenti loco a frigore; 2. a salium acrimonia; & cutis, musculorum, aliarumque partium, quibus interjacet, flexionem conservare; 4. partium quarundam motum facilitare; ut oculorum, maxillæ; 5. loca vacua sive interstitia replere: quo respectu primo ad pulchritudinem facit in facie, collo, oculis &c. deinde, dum spatia replet inter anum, vaginam uteri, & ossa ischii, dictæ partes in sæcum & fœtus exclusionem rite extendi sive dilatari possunt; 6. dolorificum attritum prohibere, ut in plantis pedum, natibus, & pubis regione, quibus pul-
vina.

De Panniculo carnosio & membr. musc. com. 65
vinaris inttar subjacet; 7. forte penuriæ tem-
pore aliquo modo, dum venas rursus ingre-
ditur, corpori pro nutrimento inservire.

602 **PANNICULUS CARNOSUS** pro quar-
corporis humani integumento sive tegumento
communi a multis describitur: qui est tunica
finea, musculosa, robusta, quæ quidem in be-
stis multis adest, inter cutem & pinguedinem,
suo beneficio, ut in bobus videmus, cutem
a vent & muscas abigunt; sed in homine ta-
men non reperitur, nisi in facie; forsasse, quia
facies, utpote vestibus instructus, eo aliis in
poris locis non ita indigebat, quare plura de
eo non dicemus.

603 **MEMBRANA MUSCULORUM COM-
MUNIS** quoque inter tegumenta communia a
nonnullis refertur; quæ pinguedini subjecta esse,
omnes musculos cingere dicitur. Verum &
tamen immerito pro universali tegumento habe-
re; quia per totum corpus non est expansa;
solum in quibusdam partibus reperitur; mul-
tissimo vero in locis deficit. Male etiam *Mangetus*
in *Verbeyeno* tunicam adiposam, ut numerum
tegumentorum compleant, in tres mem-
bras dividit (a), cum ex hac reliqua in ho-
mine deficientia arte formari non possint.

604 Sequuntur jam, absolutis velamentis com-
munibus, **ABDOMINIS TEGUMENTA** sive
PARTES CONTINENTES PROPRIÆ, ut,
præter duo *ossa innominata*, *os sacrum* cum ap-
pendice sua, & quinque *vertebras lumborum*,
diaphragma, *musculi abdominis*, & *peritonæum*;
in ad ventris sive abdominis partes examinan-
dum primum progredimur; quia hæc ob fæces,
quas continent, præ reliquis corruptioni maxi-
me sunt obnoxia; sic postea reliquæ diutius &
melius

a) *Morgagn. Advers. Anat. II. pag. 17.*

melius sine fœtore & corruptione tractari conservarique possunt.

205 Circa MUSCULOS ABDOMINIS nunda

Situs Occupant & conficiunt maximum abdominis ambitum.

Linea alba, per medium abdominis, a sterno a juncturam ossium pubis, extensa, ex tendinibus horum musculorum mire inter se implexis confecta, in cujus medio est *umbilicus*.

Numerus; vulgo quinque paria, (a)

1. *rectum*, ortum habens in ossibus pubis; finem in sterno, & quatuor costis; in quibus varix distinctiones tendineæ.
2. *oblique descendens*; provenit ex costa 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. & definit aponevrosi suæ in spina ilei, osse pubis, atque maxime in linea alba; quam tamen multæ fibræ transeunt.
3. *oblique ascendens*; oritur ex ambitu ossium ilei; atque inseritur partim costarum spurriarum margini inferiori, partim juncturæ tendini præcedentis lineæ albæ.
4. *transversum*; provenit a lumborum processibus, costis spuriiis, atque crista ilei, & sub recto in lineam albam abit.
5. *pyramidale*; valde exiguum, oritur basi suæ ad juncturam ossium pubis, ad 4. digitos transversos recta ascendit, & definit in lineam albam sed modo penitus desideratur, modo unicuique in uno latere tantum musculus adest, modo uterque.

Vasa; arteriæ & venæ ab intercostalibus, lumbis, mammariis, & epigastricis vicinis.

Nervi, a dorsalibus & lumbis.

Annulus in parte inferiore oblique descendens; pro

(b) Figuras horum præstantissimas vid. in Couper's Myotomia in sollo.

pro transitu processuum peritonæi & vasorum spermaticorum in viris; pro ligamentorum uteri rotundorum in mulieribus: in herniis, pro intestini & omenti: ascendentes vero & transversum non penetrant, sed sub eorum limbo transeunt.

Ligamentum Poupartii dictum inter spinam ilei & os pubis, sub quo vasa cruralia, musculus psoas &c. egrediuntur. (4*)

us; 1. continere & defendere contenta abdominis; 2. motu suo perpetuo digestionem & progressum chyli juvare; 3. excretionem fecum, urinæ, sætus, & secundinarum, tempore partus promoveri; 4. respirationi inservire; 5. flexiones corporis varias adjuvare; 6. ad vomitum (5*), & forte etiam ad saltum concurrere.

206 Musculis abdominis transversis proxime subjacet & adhæret PERITONÆUM: quod est tenuis, lævis, & lubrica membrana, totum abdomen interius investiens, & viscera abdominis eaque, quasi in sacco, continens. Præterea hæret cum diaphragmate, omnibusque visceribus abdominis, quorum omnino involvit ventriculum, intestina, mesenterium, omentum, hepar, nem, & pancreas, quæ propterea in duplicatio- peritonæi sita esse dicuntur. Renes vero, ure- res, cisternam, vasa majora abdominis &c. for- m ab anteriore; sed vesicam a parte superiore git, aliter quam in brutis. (a)

membrana constet duplici: inter quas vasa umbilicalia sita, (b) multisque in locis substantia cellulosa cincta est.

gamenta efficit hepatis, venæ umbilicalis, in- testinorum varia, uteri lata, &c.

G

Pro-

(a) Quo modo vesicam regat, figuris eleganter ostendit eselden. Tract. de Lithotom. ubi hoc scitu summe est cessarium. (b) Santorini. p. 264.

Processus duos extra abdomen demittit, vasa spermatica & testes involventes: circa quos notandus

1. *Progressus mirabilis* inter musculos abdominis;
2. *hiatus*, in abdomine canum, in homine deficiens;
3. *septum*, testiculum a parte superiori separans.

Involucra ligamentorum rotundorum in mulieribus, eorumque diverticula a Nuckio delineata. Aदनogr. fig. 39. & 40.

Arteriae & venae, ab epigastricis, mammariis, lumbaribus, & diaphragmaticis; quibus quidam addunt *vasa lymphatica*.

Nervi, a diaphragmaticis, dorsalibus, lumbaribus, ossis sacri.

Glandulae quoque in eo a nonnullis adesse statuuntur; quæ tamen in statu secundum naturam non conspicuæ. (6*)

Usus; 1. continere contenta abdominis; nam eo nimium dilatato, secto, vel rupto, e sede sua dilabuntur, vel herniæ oriuntur; 2. tunicam extimam præbere partibus in abdomine contentis fere omnibus; quæ propterea membranam suam extimam vulgo dicuntur habere a peritonæo; 3. formare processus peritonæi & tunicam vaginalem testium.

207 CONSPECTUS CONTENTORUM ABDOMINIS.

Aperto prudenter peritonæo spectantur

Vasa, umbilicalia dicta, in adultis in ligamenta mutata, duæ arteriæ, una vena, & *urachus*, intra duplicem peritonæi lamellam contenta (a); quæ in animalibus brutis, annosioribus, fere disparent; aut saltem minus in conspectum prodeunt, quam in homine. Arteriæ ve-

(a) *Santerinus* Obser. anat. p. 164.

ro umbilicales, ex observatione *Duvernei*, semper cavitatem retinent, usque ad fundum vesicæ urinariæ, & hæc vesica inde perpetuo ramos accipit. (a).

omentum seu *Epiploon*, intestinis incumbens.

Intestina, maximam abdominis partem occupantia;

{ in medio, *tenuia* dicta.

{ in circumferentia, *crassa*.

Mesenterium, sive membrana intestina conjungens.

Ventriculus, in parte superiori & sinistra magis situs.

Hepar cum *vesicula fellis*, in latere vel hypochondrio dextero.

Plien, in latere sinistro, post ventriculum, diaphragmati costisque spuris adhæret; hinc non conspicitur, nisi protracto ventriculo.

Renes duo, sub intestinis latentes, & lumbis incumbentes.

Vesica urinaria, in infima abdominis parte, *pelvis* dicta, ossibus pubis ope peritonæi nexa; quæ in homine, si non distenta, plerumque vix adparet. (b)

Pancreas: quod est glandula magna, post ventriculum sita.

Partes quædam generationi inservientes; ut

{ *Virorum*, *Vesiculæ seminales*, &c.

{ *Mulierum*, *Uterus*, ligamenta ejus, *ovaria*, *tubæ Fallopiæ*, aliæque partes ad hunc pertinentes.

Arteria magna seu *aorta*.

Vena cava.

Vena Portæ.

Arteriæ & venæ iliacæ, *emulgentes*, *mesentericæ*, aliæque.

a) *Garengéot Chirurgie* To. I. p. 222. Plura de his vasis capite de fœtu.

b) *Vid. Cheselden.* figuras pag. præced. laudatas.

208 **OMENTUM** est pars membranacea, pinguedine plerumque multa instructa, sub peritonæo intestinis proxime incumbens.

Synonymia; Rete vel reticulum; quia sæpe foramina in eo apparent, quando elevatur; quæ vero non sunt naturalia; Græcis *epiploon* dicitur.

Situs, plerumque superiorem solum abdominis partem occupat; non raro tamen quoque per inferiorem extenditur.

Pondus; in homine adulto, nec pingui, nec macilentio, circiter ℥ss; sed in *brutis* ratione pinguedinis multum variat.

Connexio; in parte *inferiori*, liberum est & fluctuat; in *superiori*, antè, cum ventriculi fundo, duodeno, & liene; postè, cum intestino colo & pancreate.

Substantia ex

Membrana tenerrima duplici, marsupium quasi venatorium formante, cavitate, *Bursa* dicta, instructa.

pinguedine, in cellulis adiposis, *ductus* quasi formantibus, contenta, vasa sanguifera ambientes; inter quos

Areolæ, sive spatia membranacea.

Arteriis, a cœliaca copiosissimis, *epiploicis* dictis (a)

vasis | *venis*, a vena portæ, in primis a ramo splenico.

| *nervis*, ab intercostali & vari vago; & *lymphaticis*.

Apertura naturalis insignis, a *Vvinsloo* detecta, sub magno lobo hepatis, prope collum vesiculæ fellis, per quam omentum flatu pulchre distendi potest. Vid. Nota (7*)

Ductus adiposi Malpighii, nil sunt nisi vasa lateralialia

(a) In *Ruysschii* Thes. anat. II. Tab. V. fig. 1. elegantissima harum arteriarum delineatio videri potest.

ralia sanguiferorum, qui in cellulas, sanguifera ambientes, pinguedinem deponunt; quæ vero cellulæ, ut in reliqua pinguedine (20..) inter se (a) & cum venis quoque communicant. Conf. Notam (8*)

Ufus; 1. lubrica pinguedine sua intestinorum motui inservire; 2. intestina fovere contra frigus; 3. bilis præparationi succurrere, præbendo partem pinguem; quicquid enim ab omento refluit, hepar ingreditur; 4. acrimoniam humorum temperare; & 5. forte rursus nutrire in nutrimenti defectu, sicut de pinguedine generatim dictum est.

09 **VENTRICULUS** sive *Stomachus*, est pars membranacea, cava, in sinistro potissimum hypochondrio, mox sub diaphragmate, inter hepar & lienem oblique sita; in quo notanda

Figura: quæ cum articulo luforio convenit.

Divisio; in *orificia* duo, & *fundum*, qui anteriora spectat.

Orificia | *sinistrum*, sive *Cardia*, quod longe altius dextro, cum gula continuum, multisque nervis instructum; &
| *dextrum*, sive *Pylorus*, cui intestina junguntur; ubi *valvula singularis*, ventriculum claudens. (b)

Ligamentum, quo pylorus ventriculi supremo nequitur.

Magnitudo; varia, in heluonibus ut plurimum maxima, ut & in viris plerumque major, quam in feminis.

Numerus; in homine unicus: in bestiis vero variis, plures.

Arteriæ, gastricæ dictæ, a cœliaca.

Vasa | *Venæ gastricæ*, ad venam portæ tendunt, ubi notanda

G 3.

Vasa

(a) I. M. Hoffm. idea p. 23.
nostra fig. 6.

(b) Vid. ejus delineationem

Vasa

Vasa brevia, ad ramum splenicum
 } abeuntia, &
Vena coronaria, ventriculum am-
 } biens.

Nervi: in primis circa sinistrum orificium
 intrantes, a pari vago, admodum insi-
 gnes; hinc adeo sensiles.

Lymphatica ad receptaculum chyli abeunt.
Substantia; membranacea, ex quinque tunicis
 conflata.

1. *Membranacea*; cujus fibræ transversæ, &
 sub ea

2. *cellulosa*.

3. *Musculosa*; in qua fibrarum ordo varius
 & quasi inextricabilis; quædam enim quasi
 circulares a parte superiori ad inferiorem
 descendunt; aliæ in superiori ventriculi
 parte, inter utrumque orificium; aliæ a
 sinistro latere ad dextrum oblique excur-
 runt; quædam orificia ambiunt. (9*)

4. *Nervæa*; rugas efficiens, multis vasis san-
 guiferis & parvis *glandulis*, liquidum ga-
 stricum secernentibus, instructa; quæ in
porcis facilius, quam in *homine* observan-
 tur. (9*)

5. *Villosa*, tenuis, *porosa* (a), præcedenti ar-
 cte adhærens.

Usus, 1. *Concoctio*, h. e. ut alimenta recipiat,
 contineat, solvat, mutet, per pylorum ad in-
 testina expellat, & forte etiam subtiliorem eo-
 rum partem absorbeat. 2. famem excitare.

210 *INTESTINA* sunt canales magni, longi,
 membranacei, a ventriculo ad anum usque ex-
 tensi: in quibus notanda

Longitudo, sexies quasi major homine, ex quo
 deprompta sunt.

Cir-

(a) *Ruychb.* Thes. anat. 11. Tab. V. fig. 2. de papillis
 ventriculi. Vid. *Ruychb.* Advers. 311. p. 33. (9*)

circumvolutiones mirabiles, earumque utilitas. Connexio; ope mesenterii, cum vertebris lumborum. Numerus; proprie unum; sed dividi solet in sex, quorum *Tria* dicuntur *tenuia*, ut

1. DUODENUM; a longitudine xii. quasi digitorum; *ortum habens* ad pylorum, & primo parum ascendit, dein descendit, & postea iterum ascendendo, transverse versus renem sinistrum excurrit. Recipit, ad iii. vel iv. digitorum distantiam a pyloro uno hiatu prominente, *Oscula* ductus cholidochi & pancreatici, pro bile & succo pancreatico suscipiendo. Tunicas habet crassiores, & cavum majus, quam reliqua tenuia. *Valvulas* conniventes *Kerkringii*, (a) sive *rugas* in principio habet nullas: in progressu quamplurimas, *juga* quoque dictas. (b) *Glandulas Brunneri* copiosissimas pro liquidi tenuis secretionem. (c) *Arterias* a cœliaca; *venas*, ut reliquorum intestinorum, a Porta.

2. JEJUNUM, quia plerumque reperitur *vacuum*, ob chyli fluiditatem, stimulum bilis majorem, & vasorum lacteorum copiam. Ejus *Situs* est in regione supraumbilicum. *Valvulas* quoque conniventes habet multas.

Principium; ubi duodenum desinit; & *finis*, ubi valvulæ obliterantur. Hinc *longitudinem* ejus in diversis cadaveribus diversam observavi; nunc tantum 13. nunc 16. spithamas æquabat, & ut plurimum ileo brevius erat.

3. ILEUM, quia ejus *situs* potissimum est umbilicum, juxta *ossa ilei*. *Longitudo* quandoque

G 4

que

(a) Spicileg. anatom. pag. 89. (b) Santorin. p. 167.

(c) Tract. de Gland. Duodeni: conf. Notæ (10.ª)

que vix xv. quandoque vero xx. spithamas excedit. *Principium*, ubi valvulæ conniventes vix amplius conspiciuntur; *finis* vero, ubi crassa incipiunt; quo loco lateri sinistro coli, singulari modo, ut valvula inde fiat, inseritur. (a) quam *valvulam coli*, *Baubini*, appellant. Ceterum valvulas habet nullas; sed *Glandulæ* circa finem ut plurimum plures adsunt, quam alibi.

Tria crassa, ob amplitudinem majorem ita dicta;

1. **CÆCUM**; quod sacculi instar, una cum *appendice vermiformi*, situm est ad os ileum dextrum. Incipit infra finem intestini ilei, & in fundo sacculi finitur. Longitudo hujus intestini non excedit 3. vel 4. digitos transversos. In appendice, in latus cæci plerumque hiante, glandulæ observantur; quæ una cum situ ut plurimum erecto innuunt, eam aliquid secernere. In *gallinis*, &c. duplex; in piscibus plurimis, multiplex est hæc appendix (b), in homine vero quandoque deest. (c)

2. **COLON**, situm est in circumferentia tenuium, in variis subjectis varie & mire flexum: *Principium* ejus est, supra ilei finem; & finis, ad os sacrum. *Connectitur* ope peritonæi cum osse ilei, rene dextro, vesicula fellis, hepate, omento, ventriculo, liene sinistro &c. *Longitudo*, quandoque vix quinque; sæpius tamen septem spithamas excedit. *Amplitudo* omnium maxima. *Ligamenta* habet tria, secundum longitudinem excurrentia, & in processu vermiformi desinentia. (d) *Appendiculæ adiposæ externæ* (e),
ad

(a) Vid. dissert. nostra de Valvula Coli, item fig. hujus compend. 7. Morgagn. Advers. III. fig. II.

(b) Vid. Grevv. Comparative Anatomy.

(c) Ex Observ. Morgagni Advers. anat. III. p. 27.

(d) Ibid. fig. III. (e) Ruysch. Mus. anat. pag. 75. 76.

ad lubricanda intestina inserviunt: *valvulae conniventes* in hoc intestino maximæ; tunicæque robustiores sunt, quam in tenuibus.

3. **RECTUM**, dicitur, quia ejus *situs* ferè rectus super osse sacro. *Longitudo*, palmas circiter duas. *Latitudo*, trium digitorum. *Principium* ad imam lumborum vertebra; *finis* vero, *anus* dictus, musculos habet tres: primo *sphincterem*, pro ano claudendo, & *elevatoros duos*, pro eodem retrahendo; de quibus in Myologia. *Neditur* osi sacro, *coccygis* ac *vesicæ* in viris; at in mulieribus, *vaginæ* uteri. *Tunicæ* ejus omnium crassissimæ sunt & carnosissimæ. *Valvulae* hic ut in colo non adsunt; sed tantum leviores quædam rugæ, ne fæcum exitus remoretur. *Lacunæ*, in quas setæ sæpe immitti possunt, (a) in vesículas desinentes. (b) *Anus pinguedine* multa cingitur; ut in fæcum excretionem facile dilatari queat.

4. **STRUCTURA INTESTINORUM**, membranacea, ex quinque tunicis composita.

1. *Membranacea*, sive communi a peritonæo.

2. *Cellulosa Ruysschii*, mesenterio continua, & flatu detegenda, in pinguibus animalibus sæpe pinguedinem continens (c).

3. *Musculosa*, ex duplici fibrarum ordine composita, longitudinalium, (quæ maxime in parte mesenterii adversa) & annularium, motui intestinorum inservientium.

4. *Nervea*, glandulis, vasculis, & cellulis copiosis instructa, ceterisque amplior: unde rugæ & valvulae. Vid. Not. (16*)

5. *Villosa*: fines sanguiferorum (d) & principia vasorum lacteorum sustinens; unde accurato

a) Vid. fig. nostra 28. Tab. VI. (b) Morg. Adv. Anat.

p. 10. 11. (c) Thes. Anat. VI. Tab. V. fig. 2.

d) Albin. diss. de intestinis.

rato examine cribri instar apparet (a); ergo percolationis chyli organum, vid. (12*)

Vasa copiosissima, substantiam eorum perreptantia.

Arteriæ, mesaraicæ dictæ: superior, pro tenuibus intestinis; inferior, pro crassis mirabiles anastomoses conficientes.

Venæ, quoque mesaraicæ, ad venam portalem & hepar abeunt.

Nervi, a pari vago & intercostali.

Vasa lactea, quæ & *lymphatica*, de quibus mox seorsim. Rectum intestinum etiam vasa ab hypogastricis recipit.

Glandulæ Peyer (b), præter *Brunnerianas* duodenari, in

intestinis tenuibus plerumque congregatæ parvæ, *miliares*; quandoque etiam *solitariae*: majores versus duodenum, minores versus crassa; liquidum in intestina deponentes; pro chylo attenuando & intestinis lubricandis.

crassis & appendice vermiformi, *solitariae*, *majores*, lenticulares, maximæ in recto cum ostiolis, liquidum, pro fæcum & intestinorum lubrico, ne fæcum excretio nimis sit molesta, fecernentes.

Ufus intestinorum tenuium, concoctionem ciborum continuare, secretionem chyli perficere, fæcesque ad crassa propellere; *crassorum*, fæces colligere, & suo tempore expellere.

212 **MESENTERIUM** est membrana in homine crassa, pinguis, in medio intestinorum, præsertim tenuium, sita; unde ratio nominis intelligitur. In hoc consideranda

Substantia: quæ ex membranis, pinguedine, vasis omnis generis, & multis glandulis in homine constat. Con-

(a) *Ruyfch. Epist. XI. Tab. 12. Gland. intest. fig. 1. 2. 3. 4.*

(b) *Exercit. de*

plexio, in parte superiori, cum tribus superioribus vertebris lumborum; in inferiori cum intestinis, præsertim jejunò & ileo; quibus intimam quoque largitur tunicam.

divisio; partem illam, quæ colon tangit, quidam *Mesocolon*, reliquam *Mesenterium* sive *Mesenteræum* appellant.

Communicatio: in qua, si ab intestinis separatum est, notandæ

Plicæ, specie ornamentorum manuum. (*Manchettes*.)

Longitudo, trium circiter ulnarum, cui tamen junguntur intestina quadruplo longiora.

Membrana, seu *tunicæ*, duæ: anterior & posterior; intra quas *cellulosa substantia*, pinguedinem continens, glandulæ, & *vasa mesenterica* locantur. Hanc quidam haud inepte pro *peritonæa* numerant, & *cellosam* appellant. (*a*)

Sanguifera, eadem cum intestinis, mirabiles hic anastomoses, arcus, & insulas constituentia.

Nervi quoque a pari vago & intercostali.

Lactea & lymphatica, de quibus mox sermo.

Glandulæ multæ, per totum mesenterium dispersæ (*b*); quarum

Numerus, magnitudo, & situs valde variant, In canibus tantum unica adest, sed major, quam in homine, *Pancreas Aselli* vulgo dicta. In decrepitis fere evanescunt.

Usus harum est, liquidum secernere; eoque chylum transeuntem diluere; vasa enim lactea eas transeunt.

Usus

a) Warthon. Adenogr. Cap. VIII. Ruysch. Thef. anat. p. 76. optime ab Eustach. Tab. anat. XXVII. Drak. XX. & Chesfeld. Tab. 17. & 18. delin. (*b*) Elegans in repletio vid. in Ruysch. Opusc. de Gland. fabric. p. 81.

1. suspendere, colligare, & in situ re-
 nere intestina.
 2. sustentare vasa sanguifera intestinorum
 ac lactea.
 3. viam, vasis lacteis ad receptaculum
 breviorē facere.

213 VASA CHYLIFERA constituunt VASA LACTEA, & ductus thoracicus; illa sunt canaliculi subtiles in intestinis & mesentericis chylum vehentes; circa quæ notanda

Inventor, Asellius; A. 1622. olim quidem jam ab Erasistrato & Galeno notata, sed pro arboribus, lacte plenis, habita. (13*)

Tempus optimum ea demonstrandi: duabus vel tribus horis post pastum, in bestiis antea bene pastis, & recens strangulatis, quia tunc chilo turgent: nam extra tempus digestionis tantum lympham vehunt, & vasa lymphatica sunt.

Methodus ea optime demonstrandi: ductus thoracicus, de quo mox agemus, in talibus bestiis filo est constringendus. Sæpe tamen etiam si ligatura satis in his apparent.

Difficultas ea demonstrandi in hominibus inde oritur: quia non calidi, aut mature satis potest mortem dissecantur; nam in frigidis plerumque disparent. Haud raro tamen in suffocatis strangulatis, variisque morbis defunctis observari possunt.

Origo: ex intestinis, potissimum tenuibus omnibus, radicibus innumeris, ac pluribus longioribus in homine (a) quam in canibus. (14*) Deinde etiam, sed rarissime, ex crassis. (b)

Distinctio vasorum lacteorum, in lactea

pri-

(a) Vid. nostra delineatio fig. 8. ex homine: quas enim delineationes alii dederunt, ex bestiis videntur desumptæ.

(b) Vid. observ. nostra in Ephem. N. C. Cent. V. p. 334. Schelhamm. in M. N. C. & in Analect. Anat. præfatione, in mesocolo visæ, in Ast. Anglic. N. 307. p. 2283.

primi generis ; quæ ab intestinis ad mesenterii glandulas ;

secundi generis ; quæ a glandulis ad receptaculum , ubi eorum finis , abeunt . Hæc prioribus ampliora , sed pauciora .

bulæ semilunares , duplices , oppositæ , refluxum impediennes , sed non ita frequentes , ut in aliis lymphaticis . (*a*)

; chylum & lympham ex intestinis per mesenterium ad cisternam sive receptaculum chyli deducere .

ductus vasorum lacteorum in animalibus penetratis ; in quibus chylus venas mesaraicas intrauditur .

DUCTUS THORACICUS , seu **CHYLIFERUS** , est canalis tenerrimus , chylum vasis lacteis , & lympham e lymphaticis recipiens , eaque per thoracem ad venam ut plurimum subclaviam devehens . In quo notanda *ventor* , *Pecquetus* (*b*) A. 1651 . Diu quidem ante hunc jam ab *Eustachio* (*c*) , sed obscure nimis descriptus .

capitulum , *cisterna* , vel *receptaculum chyli* , dictum , in sinistro latere superiorum vertebrarum lumborum , sub aorta , & vasis renis sinistri , situm ; reliquo ductu specie sacculi paullo amplius , haud raro duplex , & figuræ irregularis , vid. (15*)

is , in vena subclavia , ut plurimum sinistra , vel in jugulari .

gressus & situs , sub aorta in canibus , in homine vero ascendit in dextero latere vertebrarum dorsi inter aortam & venam azygos : nunc simplici , nunc diviso trunco .

titudo , calami straminei crassioris , ubi induratus .

Me-

(*a*) *Ruyfch.* dilucidatio Valvularum . (*b*) Vid. *Pecqueti* Experim. anat. (*c*) Lib. de Vena azygos .

Methodus optime demonstrandi in animalibus
 si ex. gr. in cane, bene pasto, recens j
 lato, in thorace prope subclaviam, filo
 tur; sic simul cisterna, vasa lactea, & l
 phatica bene in conspectum prodeunt.
 etiam in homine mortuo, si, secundum S
 mannum (a) in vas lymphaticum magnu
 per venam emulgentem sinistram; vel va
 iliacas, vel cavæ partem inferiorem de
 rens, flatus, vel liquidum, vel cera inji
 tur; vel 2. si in vas lacteum secundi generis
 centro mesenterii indagandum, idem te
 tur, ex descriptione Henningeri (b); vel
 pleura inter venam azygos & aortam ca
 disseccatur, plerumque ibi deprehendi pot
Substantia, ex membrana tenera, subtili, &
 lucida.

Valvulae, in toto ductu, sicut in lacteis & l
 phaticis, chyli reflexum impediētes; plu
 in homine, quam in bestiis.

Valvula semilunaris (c) tegens finem ejus in f
 clavia. (16*)

Usus; Chylum ex cisterna, & lympham ex
 sis lymphaticis per thoracem ad sanguin
 transferre.

215 **VASA LYMPHATICA**, ob similem st
 cturam, idemque demonstrandi tempus va
 chyliferis mox subjungimus. In quibus notant
Descriptio; sunt vasa subtilia, tenera, pellucida
 liquidum vehentia aquosum, *lymphæ* dictu
 in intestinis vero, præsertim tenuibus, di
 stionis tempore, chylum quoque vehunt;
 tunc, ut supra dictum, *vasa lactea* vocant
 quæ in intestinis eadem sunt vasa.

Inventor; eorum, quæ extra intestina, Th. B
 tho

(a) In pecul. dissert. hac de re edita, Argentor. 1711

(b) In Ephem Nat. Curios. Cent. IV. Append. p. 1.

(c) Læver de Corde Tab. 6. fig. 2.

Bartholinus & *Rudbeckius*, Anno 1651. (a) Angli tamen, ut *Glissonius* (b), *Charletonus* (c), aliique, *Iolivio* suo inventionis gloriam adscribunt.

us; in superficie plerarumque partium, præsertim hepatis parte concava, collo vesiculæ mellis, trunco venæ portæ & cavæ, &c.

uctura, ex tenuissima membrana, sicuti lactea. *valvulæ* copiosissimæ, semilunares, duplices, a *Ruyschio* optime demonstratæ, lib. de Valvulis lymphaticorum. (17*)

ncipium, in plerisque corporis partibus; nam in omnibus nondum demonstrata sunt; licet probabile sit, ea adesse.

is, sive insertio

1. in venas majores varias, in primis cavam, portæ &c.

2. in cisternam sive receptaculum chyli.

3. in ipsum ductum thoracicum.

us ea demonstrandi; vel

ligando ductum thoracicum, vel venam cavam, portæ, splenicam, renalem, vel aliam majorem in animali adhuc vivente, vel recens jugulato;

flatum fortiter impellendo in venas, vel arterias, vel ductus excretorios viscerum, præsertim adhuc calentium.

; lympham a nutritione redundantem, vel a massam sanguineam, vel ad vias chylificas, a partibus revehere. *Lympha* vero ipsa effluens pro chylo & sanguine rursus diluens inservit.

PANCREAS est glandula magna, plana, carnei ut plurimum coloris, post ventriculum, trans-

(a) Vid. *Bartholin.* de Vasis. lymph. & lacteis: atque *Rudbeck.* de ductibus hepaticis aquosis: vel *Hemsterhuis* de visceribus aurea. (b) Tr. de hepate, Cap. XXXI.

(c) *Oecon. animal.* Exercit. IX. p. 107.

transversim a duodeno, versus lienem ex
sa; in qua considerata

Connexio: cum duodeno, mesenterio, vasis spl
cis & liene.

Simplex in homine; at in canibus & felibus q
bipartitum.

Longitudo; octo vel novem quasi pollicum.

Latitudo: digitorum duorum, vel duorum c
dimidio.

Crassities; unius digiti. *Pondus*, trium circ
unciarum.

Figura; in homine ad linguam caninam ac
dit; latior prope duodecimum, angustior fen
versus lienem.

Membrana cingitur, quæ cum peritonæo co
nua est.

Substantia, glandulosa; ex multis minoribus c
glomerata.

Vasa habet, *arterias* a cœliaca, & ramo sple
co; *venas* quoque a splenica; *nervos* a p
vago & intercostali: *vasa lymphatica* vero
certa sunt.

Ductus excretorius, ex multis minoribus con
tus; cujus

Inventor primus, *Mauritius Hoffmannus*, P
fessor postea *Altorsius*, Patavii A. 16
in gallo Indico; & deinde post hujus
monstrationem demum a *VVirfungo*, I
varo, in homine repertus est; teste a
topta *Th. Bartholino*. (a)

Numerus, ut plurimum unicus in homin
quandoque duplex; quod ordinarium in a
feribus, anatibus, gallis Afric. phasianis;
plex vero in gallis, columbis, aquila &
Situs, in medio pancreatis, venam qu
vacuam referens, *crassitie calami strar*
nei tenuioris.

Fi

(a) Anatom. refor. l. I. c. 13. & Jo. Maur. Hoffmanno, diss
in Hornii Microcos. p. 164. item in Idea Machin. hum. p. 42.

[*Finis*, seu apertura in duodeno obliqua, 4. vel 5. digitis infra pylorum, ut plurimum eodem orificio cum ductu cholidochō; quandoque vero duplicem habet aperturam. In bestiis multis ad notabilem distantiam infra cholidochum, peculiari orificio in duodenum inferitur.

sus; secernere liquorem, *succum pancreaticum* dictum, qui naturæ est salivosæ, & ad chylum attenuandum intervīt.

7. *HEPAR* sive *JECUR*, est viscus maximum, rubicundum, in dextro hypochondrio situm, bilis secretioni destinatum; in quo

magnitudinis ratio; ut copiosa bilis prodigestione secerni possit.

figura; irregularis, superior superficies convexa & æqualis: inferior concava, inæqualis, *vesiculam fellis & glandulas* continens.

prominentia, ubi vena portæ hepar ingreditur, *porta* dicta, & alia adhuc, quam *lobulum Spigelii* quidam appellant.

fissura magna, quæ in partem dextram, quæ crassior, & sinistram dividitur; sed non in tales lobos, ut in canibus.

connexio; ope 1. *ligamenti suspensorii*, dextri & sinistri cum diaphragmate; *rotundi*, cum umbilico; quod vena fuit umbilicalis in fœtu. 2. *Membranzæ propriæ* posterius cum diaphragmate; 3. *Vasorum*, in primis venæ cavæ & venæ portæ.

membrana, hepar ambiens, tenuis est, cum peritonæo continua.

capsula Glissonii est tunica peritonæo continua, venæ portæ ramos, arteriam, & ductus bilarios prope & intra hepar includens. (a)

Arteriæ; pro nutritione 1. a cœliaca; 2. cysticis;
H 3. dia-

(a) Eam jam *Walae* notam fuisse docet *Morg.* Ep. ana. 1. §. 66.

3. diaphragmatica; 4. interdum etiam mesenterica superiori.

Venæ; 1. a *Vena portæ*, cavam superficiem intrante: quæ venæ & arteriæ officium præstat; sanguinemque affert probabilis secretionem; de qua alibi plura; 2. a *Vena cava*; 3. a diaphragmatica, per reflexu sanguinis supervacui ad cor.

Nervi; a plexu hepatico nervi intercostalis
Vasa biliaria (quibus sæpe glandulæ adjacent) sunt ductus

Cholidochus communis; oblique in duodenum hians.

Cysticus, ex vesicula fellis ad cholidochum, angulo acuto cum hepatico coiens; in hominibus tortuosus, & sæpe valvulis variegatis instructus. vid. (18*)

Hepaticus, ex hepate ad cholidochum; cujus rami per totum hepatis distributi, *Pori bilarii* dicuntur.

Hepatico cysticus & radices felleæ in bobus. (18*)

Vasa lymphatica, deteguntur, 1. ligatura venæ portæ in vivis; 2. flatu in arteriam vel ductum hepaticum;

Canalis venosus in fœtu, & *sinus venæ portæ* magnus.

Substantia secundum

Veteres, ex sanguine circa vasa sanguifera concreto.

Malpighium, & plerisque recentiores, *glandulosa*. (19*)

Ruyschium, *vasculosa*, ex congerie vasculorum minimorum.

VESICULA, aut *cystis fellea*, est vesicula, ad figuram pyri aliquo modo accedens, sita in parte hepatis concava: in qua

Magnitudo: parvò ovo gallinaceo fere æqualis.
Collum sive *Cervix*, quæ quasi sphinctere claudi potest.

Fundus, qui, nobis erectis, deorsum; collum vero sursum spectat: incumbit collo, illudque suo colore tingit.

*Cohæsi*o, 1. per membranam communem; 2. per vasa

Ductus cysticus, ad cholidochum abiens: de quo supra.

Frænulum, quo ductus cysticus cystidi jungitur.

Structura, ex quatuor membranis: 1. comuni, 2. cellulosa & vasculosa, 3. musculari, ex fibris tenuissimis rectis, obliquis, & transversis; 4. nervea, intus rugosa & reticulata, humore unctuofo imbuta, in qua subinde minimæ glandulæ; quæ fabrica ductibus quoque bilariis communis videtur.

Vasa communia cum hepate, quæ hic *cystica* vocantur. (a)

Radices felleæ in bobus, non in homine a me inveniuntur.

Modus, quo bilis in vesiculam fertur. In homine pars maxima e ductu cholidochi per cysticum ascendere; pars vero amarissima ex ipsa vesicula provenire videtur. Sed in bobus etiam per hepatico-cysticos & radices felleas. (a) (19**)

Hepatis, secernere bilem sive fel ex sanguine Venæ portæ; secundum veteres vero, sanguificare.

Vesiculæ felleæ: colligere bilem, ulterius eam perficere, ad certum tempus asser-
 vare, & tandem expellere.

H 2

Bi-

(a) Ruysch. optime delineata Ep. V. ubi & alia huc pertinentia. (b) V. Bohn. in Act. Erud. A. 1682. p. 26. 1683. p. 126. Verheyen. Tab. XI. fig. 6.

Bilis: chylum attenuare, oleosa aqueis ne-
scere, intestina stimulare, acidum chy-
um ex parte immutare.

Bilis vero duplex est: *hepatica*, quæ fere insigni-
da, tenuis, & vix colorata; *cystica*, quæ cras-
sior, coloratior, & amarissima.

218 LIEN sive SPLEN, est viscus atro-rubens
in sinistro ventriculi latere sub diaphragmate
ad costas situm, in quo notanda

Numerus; ut plurimum unicus; quandoque plures
inventi. (a)

Figura, varia; haud raro linguæ quodammodo
æmula; concava versus ventriculum, convexa
versus diaphragma & costas, sæpe tamen
irregularis est, & hinc inde varias fissuras obtinet.

Connexio, cum ventriculo, per vasa brevia, cum
pancreate, omento, diaphragmate & rene si-
nistro, per membranas.

Magnitudo, varia; *Longitudo* sæpius 5. vel 6. cir-
citer pollicum; in porcis, canibus &c. multo
longior, at tenuior. *Latitudo* 3. pollicum; *cras-
sities* unius. *Pondus* XII. circiter unciarum.

Membranae; una in *homine*, *porcis*, *canibus*; alia
in *vitulis* duæ; exterior, *communis*, robusta
laxe adhærens per vasa sanguifera interiori
propriae, quæ priori ablata; flatum transmittit.

Vasa, pro parvitate hujus visceris admodum insignia;

Arteria, a cœliaca, in homine aquam, ære-
rem, aut mercurium injectum per venas
facile transmittens, *splenica* dicta.

Vena splenica, in vitulis mox ab ingressu in
cellulas mutata; in homine vero per to-
tum lienem, ut in aliis visceribus, ramo-
sissima est. (b) In vitulis utraque vasa,
in

(a) Schelham. Analest. diff. X. §. XII. Cbeselden. A-
natom. 181. (b) Demonstrante Ruyschio, contra plerosque
recen-

in uno extremo; in *homine* vero, variis distinctis ramis, in toto tractu superficiei concavæ sive internæ ingrediuntur.

Nervi, a plexu splenico. *Ductus* vero *excretorius*, nullus.

○ *Vasa lymphatica*, ad receptaculum abeuntia. *Substantia*, *cellulosa* & *glandulosa* statuitur; *cellulosa* quidem est in vitulis; sed in *homine*, *vasculosa* & *fibrosa*; glandulas enim, quas adesse scribunt, *Ruyschius* vascula esse demonstrat. (20*)

Glandula lymphatica, una vel altera, fabæ circiter magnitudine, extra lienem, circa vasorum in eum ingressum sæpe reperitur.

Sus, mihi verisimillimus est, sanguinem hepatis, ex quo bilis secernenda, natura sua spissum, fluidiorem reddere, & sic cavere obstructions & bilis secretionem promovere. (21*)

9 **RENES** sunt duo viscera rubicunda, phaseoli figuram repræsentantia, utrinque in lumbis sita, in quovis latere unus; quorum concava pars introsum, convexa extrorsum respicit. In his præterea consideranda

itus; ad infimas duas costas spurias, sic tamen, ut nunc æquali, nunc diversa paullo altitudine siti sint; modo enim sinister altior dextro, modo dexter sinistro, contra opinionem vulgarem.

nnexio cum lumbis, costis inferioribus, intestino colo, renibus succenturiatis, vasis renalibus, & ureteribus.

embranæ duæ; prima communis, *adiposa* dicta, robusta, laxè renes ambiens, propriis vasis instructa; *altera propria*, tenuis, & arcte undique substantiæ renum adhærens.

agnitudo; longitudo, digitorum circiter quin-

H 3

que

entiores, Epist. IV. Tab. 4. qui plerumque lienis visu; loco humani, descriptionem dederunt.

que vel sex; latitudo, trium, & crassitiei unius cum dimidio.

Superficies in adultis æqua & levis; in foetu vero sæpe, vitulis, bobus, ursis &c. in variis inæqualitates & lobos divisa.

Vasa; membrana peritonæi, sive capsula, ut hepate, inclusa.

Arteriæ & venæ amplæ, modo una, modo plures, *emulgentes* ac *renales* dictæ; quarum hæ, ex vena cava; illæ, ex aorta. *Nervi* a plexu renali. *Ductus excretorius*, reter, dictus.

Lymphatica, ad receptaculum chyli abeuntia. *Substantia*, firma ac dura, duplex in eis observatur.

Exterior sive *corticalis*, secundum *Malpighium* glandulosa; sed secundum *Ruysehium* (a) tota pulcherrime vasculosa. Vid. Notæ (22*).

Interior, tubulosa, *tubuli urinarii Bellini* dicta, desinens in *papillas VIII. X. vel XI.* multis foraminulis in *pelvim* hiantes (b) quæ tamen *papillæ* in omnibus non apparent. (c)

Pelvis est *cavitas* renum membranacea, productiones emittens, *tubulos pelvis* dictas, *papillas renales* amplectentes.

Usus; urinam, pro depurando sanguine, fecerere in pelvim, & inde per ureteres ad vesicam dimittere.

220 **RENESSUCCENTURIATI**, *capsulæ atrabiliarie* sive *glandulæ renales* ab *Eustachio* primum descriptæ (d) sunt duæ glandulæ flavescentes, compressæ, utrinque superiori renum parti incumbentes, in quibus angustissima cavitas,

(a) Thes. anat. III. Tab. 4. fig. 2. & 3. Th. IV. Tab. 1. fig. 1. (b) Ruyseb. Thes. III. fig. 3. & Thes. IV. Tab. 1. fig. 1. (c) Schelham. Anat. diss. XI.

(d) Lib. de Renibus.

De Renibus succenturiatis & ureteribus. 89
vitas, liquore fusco subdulci imbuta. In his
notanda

Figura: irregularis, quadrata, triangularis, ovata &c.

Magnitudo, varia: in adultis, sæpe instar nucis vomicæ majoris; in fœtu vero major, & æqualis renibus, imo subinde major.

Membrana ambiens, tenuis est, arcte cingens substantiam glandulosam, eamque cum rene conjungens.

Vasa sanguifera, quandoque ab aorta & cava, sæpius ab emulgentibus. *Nervi*, a plexu renali. *Vasa lymphatica*, multa.

Ductus excretorius, nullus cognitus: ideoque & *Usus* incertus; qui tamen major in fœtu, quam in adulto, esse videtur. (23*)

221 **URETERES** sunt canales duo membranacei, calami scriptorii quasi crassitie, inæqualis tamen diametri: a quovis rene ut plurimum unus ad vesicam extensus. Horum

Ortus in renibus; ubi infundibuli forma ampliati, *pelvim* faciunt.

Finis, in vesicæ parte inferiori & posteriori: ubi oblique intra membranas ejus progrediuntur, & ad modum valvulæ, angustis orificiis, in vesicam terminantur, nihilque ex vesica admittunt.

Figura: non recta, sed quodammodo ad figuram literæ s inflexa.

Substantia, membranacea: ex tribus tunicis composita: (1) *communi* a peritonæo, (2) *musculari* tenui, (3) *nervea*, humore lubrico obducta, in qua subinde *glandulæ* (a) observatæ.

Vasa: sanguifera, & *nervi* a partibus vicinis.

Usus: urinam, in renibus secretam, ex pelvi suscipere, ad vesicam deferre: his enim obstructis, urina supprimitur; adeoque ejus ad vesicam nullæ aliæ dantur viæ.

H 4 Am-

(a) *Ruyseb. Obs. XV. Morgagn. Advers. III. 71.*

Amplitudo præter naturam sæpe insignis, a calculis renalibus transgressis subinde ipsis indicitur. Vid. Ruysch. Obs. xv. & Coschvitz. differt. de Valvul. in ureteribus.

222 VESICA URINÆ est pars membranacea cava, piri fere forma in pelvi sita, ad urinam colligendam & expellendam destinata: circum quam indigitanda

Magnitudo: quæ circiter libram unam liquidi capit in adultis.

Connexio: 1. singularis cum osse pubis, per peritonæum, aliter quam in bestiis; 2. cum partibus genitalibus, per urethram; 3. cum umbilico, per urachum & arterias umbilicales; 4. in maribus, cum intestino recto; 5. in feminis, cum uteri vagina.

Divisio: in cervicem sive *collum*, corpus vesicæ, & *fundum*. Horum tunicæ sunt tenuiores, illius crassiores.

Sanguifera, ab *hypogastricis*, umbilicalibus, & *hæmorrhoidalibus*; at in mulieribus quoque ab uterinis.

Vasa Nervi, ab intercostali, & inprimis osse sacro.

lymphatica, a nullo observata novi, nisi a Zelleri. (a)

Structura: membranacea, ex tribus membranis constans.

1. *Communis* dicitur, peritonæo continua, fundum solum ambiens (b) sub qua plerumque pinguedo observatur. (24*)

2. *muscularis*, ex vario fibrarum, præsertim tamen longitudinalium & transversarum, tractu, composita. (24*)

3. *nervea*, humore mucoso obducta, in arteriis vel glandulis hujus tunicæ, juxta col-

(a) Disput. de Administr. vasor. lymph. p. 3.

(b) Cheseld. de Lithotom.

collum subinde conspicuis, secreto. (a)
hinter, est series fibrarum transversarum, sub
 rectis extremum colli vesicæ arcus specie am-
 pliens, & claudens; ad urinæ involuntarium
 exitum cohibendum: in viris, intestini recti;
 in mulieribus, vaginæ fibris cohærens; conf.
 Santorin. p. 203.

ramina tria: duo, ubi ureteres (221.) ingre-
 iuntur, per quæ urina influit: & unum ma-
 ius in collo, pro via urinæ in urethram.
 6: ex definitione jam constat.

23 URETHRA est canalis membranaceus,
 cylindricus, vesicæ collo continuus, urinæ
 exitum concedens: in mulieribus, vix
 digitos superat: sed multo longior in vi-
 de qua vero plura in partium genitalium
 descriptione.

Circa PARTES GENITALES VIRORUM
 notanda primum TESTICULI, sive *didymi*,
 duo, in scroto contenti; quorum
forma & magnitudo, omnibus nota.

lucra sive velamenta communia & propria sunt,
 SCROTUM, sive *bursula*, infra penem de-
 pendens, pilis in adultis instructum: in
 quo notanda

Sutura, qua in dextrum & sinistrum latus
 dividitur.

Substantia, ex cuticula, cute, & membra-
 na musculosa, *dartus* dicta, constans,
 cujus ope corrugatur.

Septum, ex duplicatione darti factum, quo
 scrotum in *duos loculos* dividitur. Vid.
Ruyseh. & Rau de septo scroti.

Vasa, a pudendis & hypogastricis. *Nervi*,
 ex osse sacro.

Usus: continere & fovere testiculos.

2. TU-

2. TUNICÆ tres:

1. *musculus cremaster*, sive *elevator testis*
2. *vaginalis*, laxè testem ambiens a cæco peritonæi.
3. *albuginea*, robusta, arcte cum substantia testis cohærens; vasa spermatica recipit, & ad testem transmittit.

Vasa præter communia cum scroto modo indicata, speciatim

Arteriæ spermaticæ, ut plur. ex aorta, angustæ principio oriundæ.

venæ: dextra, ex vena cava; sinistra, plerumque ex emulgente sinistra, valvulis sæpe constitutæ, varias anastomoses & corpus paniforme, pyramidale, formantes.

nervi a plexibus nervorum pelvis & lumbaribus
lymphatica; in animali vivente copiosa videri possunt.

Substantia: vasculosa, ex tenuissimis vasculis; *mineralia* dictis, intestinorum more intortis, cæcans (a) pulchre apparens, si testis aceto maceratur; *glandulæ* vero in eo nullæ patent.

Corpus Highmori: in homine, in dorso testis; in cane, in illius medio: cui cavitas, pro semine scipiendo, adscribitur. (b)

Usus; semen prolificum generare, in quo vermiculi (c).

225. II. EPIDIDYMIDES, sive *Parastatæ* duæ in quovis teste una: quæ sunt partes oblongæ fere cylindricæ, testiculi oræ superiori, erunt vel bombycis similitudine, incumbentes. his consideranda

Connexio; cum teste, ope membranæ albugineæ & cum

(a) *Cheselden. Anat. Tab. 28. & eorum dissolutio Ruyss. Thef. IV. Tab. I. fig. 2. & Thef. X. Tab. III. fig. 3. itemque nostra 24.* (b) *Highmor. Anat. Tab. X. & XI. Lealis fig. 1.*

(c) *Leeuwenhæck variis locis; Boerhaave Instit. Med. ed. altera p. 256. sed in Harris Lexico-techn. Vallisner. de gener. Tab. 1. & Cheseld. Tab. 28. delineantur. (25*)*

& cum vase deferente. (Conf. de his & reliquis partibus genital. Graaf.)

incipium; in teste, quinque vel sex vasculis seminalibus minimis.

is; in altero extremo, ubi vas deferens incipit.

membrana ambiens, robusta, cum albuginea continua.

stantia, quoque vasculosa, ut testium; vasculis tamen, non solum magis conspicuis contentis; sed quorum meatus etiam per injectiones visui se sistunt. Omnia vero hæc vascula tandem in unum ductum, vas deferens dictum, abeunt.

a, eadem cum testibus, spermatica dicta.

vi; ab iisdem ramis ac testium.

s genituram ex testibus recipere, ulterius digerere ac perficere, & ad vas deferens transmittere. Conf. Nota (36*)

. III. VAS DEFERENS, sive ejaculatorium dictum, est canalis robustus, albicans, nervum deferens, calami straminei mediocris crassitie, nus ab epididymide qualibet, ad vesiculâs feminales & urethram extensus. In hoc notanda us & progressus; ab epididymide per processum peritonæi ad abdomen ascendit, & deinde ad collum vesicæ reflectitur.

is; in anteriori parte vesicularum seminalium, partim recta in urethram; partim oblique in vesiculam feminalem desinit; sic, ut in utramque, pro necessitatis exigentia, liquidum suum reponere possit.

stantia; valde robusta & tenax, fere ut nervus fortis.

ritas; in principio & progressu vix setam admittit; prope vesicam multo amplior; in fine rursus angustior, nihil sponte in urethram transmittens; sed solum in cœstro venereo.

Usus,

Ufus, liquidum genitale ex epididymidibus continuo ad vesiculas seminales; at in coitu atque ad ipsam urethram, deferre. Forte & perfectiorem ejus elaborationem conferre.

227 IV. VESICULÆ SEMINALES, sunt receptacula duo membranacea, cellulosa, p. posteriori colli vesicæ juncta, ad semen ex his deferentibus recipiendum, ulterius perficiendum, & suo tempore per urethram expellendum. Harum

Longitudo; trium digitorum transversorum; *titudo*, unius.

Substantia; ex membrana valida, vasculosa, quasi musculosa, varias cellulas inter se communicantes efformante, & peritonæo robore adhuc cincta; quæ vero cellulæ in cæcum quasi intestinulum unum resolvi possunt. (a)

Ductus excretorius, duplex, ex quavis vesicula unus, duplici osculo in urethram ut plur. conflans; contra *Lealem*, qui unum ductum, numque solum osculum statuit & delineat. (b)

Vasa sanguifera, a vasis vesicæ & intestini recti copiosissima.

Nervi, a pelvis plexibus. *Facies interna*, reticulata, rugosa, ut in cystide fellea. (c) *Glandulæ* quoque a nonnullis hic visæ perhibentur. *Ufus* ex definitione jam patet.

228 V. PROSTATÆ, rectius *Prostata*, est intricatum corpus, globosum, quasi cordiforme, mox ante collum vesicæ situm, & totum urethræ principium cingens. (d) Hujus

Magnitudo; instar nucis circiter juglandis.

Prominentiæ duæ, natiformes, in parte posteriori

Eminentia, caput gallinaginis dicta, in urethra cum duobus osculis, quæ ductibus ejaculatoriis & vesti-

(a) *Lealis* de part. semen. confic. fig. II.

(b) Ibid. (27*) (c) *Santorin.* p. 201.

(d) *Chesel.* de Lithot. Tab. VI.

z vesiculis seminalibus communia sunt; *sint-*
que novo his sæpe interjecto. (a)

stantia glandulosa & spongiosa robusta mem-
brana cincta.

aminula, live ductus excretorii hujus glandu-
e, ex cavernulis in urethram, humorem al-
bicantem excernentes: in hominibus, decem
vel duodecim; in canibus, quamplurimi.

, cum vesiculis seminalibus communia.

; liquorem albicantem secernere; qui vero,
um eum etiam eunuchi habeant, fœcundum
men non constituit, licet in coitu quoque ef-
fundatur; sed pro lubricanda urethra & vehi-
culo seminis inservire videtur.

V. PENIS primarium generationis organum
est, cujus

nyma: membrum virile, virga, mentula, co-
nis, priapus, &c.

ura, situs, numerus, magnitudo, omnibus no-
ta sunt.

es sunt; 1. penis ipse; 2. glans; & 3. ure-
thra. In *pene* notanda,

Cuticula, & cutis, tanquam tegumenta com-
munia.

Præputium: quod est cutis replicata, glan-
dem tegens: in cujus inferiori parte *fræ-*
nulum: quæ utraque papillis nerveis, &
glandulis, (rectius forte folliculis: nam
veræ glandulæ hic vix conspiciuntur) a
Tysone Anglo, *odoriferæ* dictis, stipata
sunt. (b)

Tunica, propria, robusta, naturæ tendineæ,
reliquam penis substantiam amplectens;
quæ quandoque duplex, cum interjecta
tuni-

tunica cellulosa, post inflationem & excitationem conspicua. (a)

Corpora duo cavernosa, seu *spongiosa*, mammam penis molem constituentia: quæ distincta oriuntur utrinque ab ossibus pubis & peculiaribus quasi *thalamis* (b), deinde juncta, ad glandem usque extenduntur: in quæ, si liquidum vel flatus immittitur, vel mercurius immittitur, penis rigidus, atque intumescit.

Septum inter duo corpora cavernosa, a conjunctura parietum horum corporum provenit; & in parte posteriori crassius; anteriori, tenuius atque cribri instar perforatum.

Ligamentum Vesalii, quo penis jungitur synchondrosi ossium pubis. (c) De lateribus vid. Not. (28*)

Musculi penis varii sunt, erectioni potissimum inservientes: de quibus videatur *Myologia*.

Vasa penis, eorumque mirabilis copia ac distributio, vid. in Tabula nostra V.

GLANS, caput, sive *balanus*, anterior pars penis est; cujus figura & color nota sunt. hoc vero ulterius notanda

Superficies, lævis, quasi polita, & valde sensilis, ob *papillas nerveas*, in pene rigida maxime conspicuas.

Urethræ finis, reliqua urethræ parte paulo angustior, sub qua *frænulum* penis.

Corona, circumferentia posterior glandis dicitur; cum subjecta cervice: in quibus nonnulli *parvas glandulas* statuunt, (d) *Santorini*.

(a) *Ruysch. Epist. XV. Tab. XIX.* Hanc vero cellulam tunicam non semper adesse, ipse *Ruyschius* in *Advers. Anat. Decad. 1. pag. 21.* indicat. (b) *Santorini. p. 88.*

(c) *Morgagn. Advers. Anat. I. Tab. IV. fig. 4.*

(d) *Littrius Hist. Acad. Reg. 1700. Morgagn. Advers. I. Tab. IV. fig. 4. K.*

torinus vero tantum oscula sive ductulos.
stantia ex epidermide maxime & corpore cavernoso, quod urethræ continuum, & hic globum, vel bulbum quasi, expansum est, constat (a); quibus tunica penis intexitur. (b)
 URETHRA: quæ est canalis membranaceus, re cylindricus; vesicæ collo continuus ad extremum usque glandis se extendens, ad urinem & semen transmittendum. Hujus corpus, in sulco quodam, qui efformatur in inferiori penis parte, interstitio duorum corporum cavernosorum.
 Ingressus: non est rectus, sed singulari modo flectitur. (c)
 Longitudo duodecim vel tredecim pollicum.
 Crassitudo: cum calami scriptorii crassitie fere convenit.
stantia; ex membranis duabus robustis, interiori & exteriori: quibus *substantia* spongiosa sive *cavernosa* interjacet, ubi *glandulae* exiguae a nonnullis statuuntur. (d)
Bulbus sive protuberantia urethræ: est pars ejus prostaticis proxima, parte reliqua crassior, pollicem longa, & bulbum quodammodo referens, substantiæ spongiosæ crassioris.
superficies interior varia habet *foraminula*, rotunda, oblonga, & *canaliculos*, ex quibus sæpe liquidum viscidum exprimi potest; quod urethram lubricat, & contra urinæ acrimoniam inservire videtur. (e) Conf. *Littre* nova urethræ descriptio loco cit.
 Ad penis considerationem adhuc pertinent
 GLAND.

Ruyfch. Observ. anat. Obs. 100.

Santorin. p. 191.

Fere ut *Alghisius* delineavit in Tract. de Lithot. *Morgagn.* Adv. III. p. 82. eum descripsit.

Ita sustinet *Terraneus* lib. de Gland. p. 32.

Morgagn. Advers. I. Tab. 4. fig. 4. c.

GLANDULÆ COVVERI, *mucosæ* dictæ
quarum tres describit. (a)

1. *duæ*, in utroque urethræ latere una, alter musculos acceleratores & bulbum urethræ sitæ, figuræ ovatæ aliquo modo compressæ, parvæ fabæ quasi magnitudinis, liquidum diaphanum, mucosum (quod per singularem ductum excretorium duos fere digitos longum, perforata utque urethræ tunica) in urethram transmittentes; quod pro lubricanda & detegenda urethra ab urinæ acrimonia invivire videtur. In plerisque tamen, in quibus glandulas inquisivi, cadaveribus, et præsertim adeo magnas, ut a *Covvero* lineantur, reperire non potui; hinc valde dubito, an semper adsint. (29*)

2. *una*, quæ *tertia* est, in angulo curvaturæ urethræ sub ossibus pubis, intra corpus spongiosum sive cavernosum urethræ, esse dicitur, atque etiam ab ipso loco quasi figura delineatur: quam tamen quod videre mihi nondum licuit.

231 GLANDULA LITTRII (b), est glandula, inter utramque urethræ membranam sita, proxime infra prostatas, *Coloris* obscure ruberis, pollicem *lata*, duas lineas *crassa*, urethræ internam membranam instar zonæ ambiens eamque multis osculis minimis perforans: per quæ liquidum mucosum, ad urethram illineatam, infundit.

232 VASA penis, urethræ, & harum glandularum sunt

Arteriæ, ab hypogastricis, & pudendis.

Venæ,

(a) Descriptio Glandul. nuper detect. 4. Lond. 1790 cum fig. quæ etiam in *Drakii* Anthropol. Tab. IV. & *Terræ* Lib. de Glandul. p. 65. Tab. 2. lit. M. M. delineatæ sunt. Describuntur etiam a *Littrio* Hist. Acad. Reg. A. 1700. (b) Locò modo citatò.

Venæ, valvulis instructæ, ad ejusdem nominis venas sanguinem revehunt: in pene vero (Vid. Tab. V. nostra) & deinde sub ossibus pubis prius mirabiles anastomoses, quas *Santorinus* p. 193. *labyrinthum* vocat, concientes.

Nervi, ab ultimis ossis sacri. *Vasa lymphatica* a *Covvpero* (a) & *Drachio* (b) pulchre delineata.

33 *Usus penis* { *primarius*, ad coitum & sobolis procreationem.
 secundarius, ad urinæ excretionem.

34 IN PARTIBUS GENITALIBUS MULIERUM notandæ

ARTES EXTERNÆ, sive eæ, quæ sine sectione, & tantum diductione videri possunt; ut
 C *Pudendum* seu *vulva*; in cujus medio, *rima* & *os* vaginæ: ad inferiorem partem, *frenulum* ac *perineum*

Labra duo, & *mons veneris*, a pinguedine substrata tumida, ac crinibus obsita, una cum eorum usu.

CLITORIS, seu *mentula* muliebris: in qua notanda

⊙ *Situs*; in superiori rimæ parte, tota ferre ut plurimum extra veneris stimulum, sub cute sive præputio latens.

Figura & magnitudo ordinaria, ad apicem digiti auricularis accedit; extraordinaria, subinde ingens, ut penem virilem quandoque æquaverit (c): sed sine urethra.

Glans, sive *apex*, qui vero non est perforatus; humore tamen fœtido inquinatus, ut corona penis. (d)

I

Præ-

a) Myotom. reform. Fig. 10. (b) Anthropolog. Tab. VI.

c) Qualia exempla habent *Panarollus*, *Platerus*, *Plazius*, *Rhodius*, *Graafius*, & *Tulpius*, &c. (d) *Santorin.* p. 191.

Præputium glandem obvelans a cute pendendi, quod papillis nerveis est instructum, & hinc valde sensile.

Ligamentum, quo ossibus pubis jungitur fere ut in pene. (a)

Crura, duo; clitoride triplo longiora al. ossibus pubis.

Corpora duo cavernosa, cum septo medio, fere ut in pene virili, substantiam ejus constituentia: quæ membrana nervea cincta sunt.

Musculi erectores, duo, ut in eodem pene; qui ab ossibus ischii oriuntur, & in corpora cavernosa inferuntur.

Vasa; (quæ & reliquis externis partibus sunt communia)

Arteriæ & venæ, ab hypogastricis & pudendis.

Nervi, ab osse sacro; quorum insignes rami per dorsum clitoridis excurrunt, unde adeo sensibilis.

Ufus; gratum titillationis sensum excitare, atque voluptatem veneream mulieribus augere.

NYMPHÆ, sunt partes duæ membranaceæ, utrinque ut plur. una, rubellæ, cavernosæ, cristis gallorum sub gutture pendentibus similes, modo majores, modo minores, præputio continuæ, atque interiori labrorum lateri junctæ; in quibus notanda

Papillæ nerveæ, copiosæ, unde valde sensiles.

Glandulæ parvæ, substantiam sebaceam fecernentes. (b)

Ufus;

(a) Graaf. de Mulierum organis, cap. 3. & Morgagn. Advers. I. pag. 20.

(b) Morgagn. Advers. I. Tab. III. ec.

Usus; titillationem atque voluptatem augere, ut & urinæ flexum ita dirigere, ne pedes madefiant.

Orificium vaginae, sive *os uteri externum*, cavernosa substantia cinctum, quæ in venere intumescit: in virginibus, angustius; in venere sæpe utentibus, & quæ pepere-
runt, largius: semper tamen vagina reliqua est angustius.

HYMEN, est membrana, modo circularis, modo lunata, modo alia ratione constituta (*a*) in virginibus vaginam coarctans, atque in puellis parvis semper præsens; (30*) in quibus exiguam habet aperturam ad vaginam; in adultis vero plerumque majorem. In coitu primo, nisi forte jam antea læsa, laceratur, sanguinemque sæpe fundit.

Carunculæ myrtiformes, ex hymenis laceratione oriuntur, & nunc duæ, tres, nunc quatuor eo ipso loco observantur, ubi olim hymen erat; desuntque in infantibus.

Urethra, sive *meatus urinarius*; circa quem notanda

Situs; recta infra clitoridem, parva eminentia se prodens.

Longitudo, duorum quasi digitorum transversorum.

Amplitudo, major quam in viris; in fine tamen reliqua parte angustior, magnam admittens dilatationem.

Ductuli, liquidum mucosum, contra urinæ acrimoniam, excernentes, ut in virili, originis adhuc incertæ. (*b*)

I 2

La-

2) Ibid. GG. Santorin. Tab. 2. fig. I. e. Conf. delineationis ejus, sicuti in puella, 14. annos nata, a me inventa est, Ephem. Nat. Cur. Cent. VII.

) Morgagn. Adv. I. §. 10. & IV. p. 44. Terraneus de id. p. 44.

Lacunæ Graafii, sive oscula circa urethram conspicua, sunt ductus, humorem pro vagina lubricanda excernentes, ex urethra corpore glanduloso oriundi. (a)

235 PARTES INTERNÆ, generationi inservientes sunt

I. VAGINA UTERI; quæ est canalis amplius intestino recto non multum absimilis; sed robustior; ab orificio vaginæ, inter vesicam & rectum, quibus adhæret, ad uterum extensus. Hujus

Longitudo, sine distractione; sex vel septem digitorum.

Amplitudo, major intestino tenui; atque in diversis casibus, præsertim partus tempore multum dilatari apta; orificium vero reliqua parte angustius, & sphinctere coarctatur.

Substantia: membranacea, intus rugosa, nervosa, papillaris; (observatore Ruyschio) & hinc valde sensilis; extus musculosa, qua per nem in coitu blande complecti queat.

Connexio: pars anterior, cum vesica; posterior cum intestino recto; superior, cum utero concreta est.

Rugæ vaginæ, quæ non sunt circulares, sere ut in jejuno.

in virginibus, maximæ, præcipue in parte anteriori;

in venere sæpe utentibus, minores, quæ attritæ; &

post crebriorem partum, fere prorsus oblitterantur.

Usus; 1. pro voluptatis venereæ, tam maris, quam feminæ, augmento; 2. pro faciliori dilatatione in partu.

Lacunæ sive oscula, uti circa urethram, ita & cir-

(a) Morgagn. Adv. I. Tab. III. f. & **

(b) Morgagn. Advers. primis §. 31. Tab. III.

circa os vaginæ hinc inde reperiuntur, sætas sæpe admittentes, magnam partem a glandulis substratis, *prostatæ Bartholini* dictis, liquidum mucosum pro vagina lubricanda & forte stimulo veneris excitando secernentibus, venientes.

Musculus sphincter sive *vaginæ constrictor*, est fibrarum muscularium series, orta a sphinctere ani, amplexens orificium vaginæ, & sub clitoride ejus cruribus inferitur. Ibidem *corpus cavernosum*, orificium hoc ambit; quo in venere a sanguine distento, arctatur, ut penem virilem gratus afficiat, & ab eodem vicissim grate afficiatur.

us; penem & genituram virilem admittere; foetum vero, secundinas, menstrua, & lochia ex utero emittere.

6 II. **UTERUS**, sive *Matrix*, est pars, in mulieribus, inter vesicam & intestinum rectum sita, cava, figura piri aliquo modo compressi, generationi foetus destinata. In quo notanda *Connexio*; pars *posterior* libera est; *anterior* cohæret vaginæ; *partes laterales*, per ligamenta; quæ duplicia;

Clata, membranacea, cum peritonæo continua, utrinque uterum & vaginam pelvis parietibus jungentia. Duplici ea constare membrana, nuper observavi, quibus *cellulosa*, flatu facile detegenda, interjecta est, fere ut in mesenterio.

rotunda; a parte superiore uteri orta, transeunt per annulos muscutorum abdominis, & mox ibidem terminantur in pinguedine juxta inguina. Constat ex membrana duplici, plexu vasculoso (a), fibrisque lacertosis, in puerperis & prægnantibus maxime conspicui. (b)

I 3

Ma-

a) Morgagn. Advers. IV. pag. 49. 50.

b) Santorin. Observ. pag. 229.

Magnitudo; in adultis non gravidis, *longitudo* est trium quasi pollicum; *latitudo*, in parte superiori, duorum; in inferiori, unius *crassities* vero sesquipollicis. In virginibus adhuc minor; sed in gravidis, pro diverso tempore, varia.

Divisio; pars superior & latior; *fundus*, inferior, *cervix* appellatur; & in hac, vagina prius aperta, se offert conspiciendum.

Orificium, sive *os uteri internum*, figura ferè glandis penis in vaginam hians; exiguum valde in virginibus; in iis vero, quæ pepererunt, & in gravidis paullo majus, atque in his humore valde glutinoso clausum; in partu tamen, miraculo naturæ, foetum perfectum transmittit.

Substantia musculosa, vario fibrarum carnearum plexu composita, copiosissimis vasis interjectis. In non gravidis compacta & firma est; in gravidis *spongiosa*, *sinuosa*, & mirabiliter dilatari potest, sine crassitie decremento. Vid. Nota (31*). Extus membrana robusta a peritonæo; intus in *cavitate*, quæ in virginibus parva est (a), membrana *porosa*, nervea, cingitur, quæ in puerperis quasi disparet. (b)

Vasa sanguifera tortuosa, anastomoses innumeras conficientia, & in gravidis quasi in *sinu* (c) dilatata osculis in uterum & vaginam hiant, & *menstruorum fontes* sunt. (32*)

Arteriæ; 1. *spermaticæ*, ex aorta; 2. ab hypogastricis maximæ; 3. ab hæmorrhoidalibus externis, omnes mire inter se communicantes; ita ut, si aer, cera, vel mercurius in unam earum, quamcunque, injiciat.

(a) Vid. in Morgagn. Advers. I. Tab. III.

(b) Ibidem Advers. IV. pag. 47.

(c) Morgagn. Advers. IV. p. 48. Vater. de Utero.

jiciatur, reliquæ omnes, etiam alterius lateris, facile repleantur.

Venæ, quoque triplices, ejusdem nominis, valvulis destitutæ, arteriis longe ampliores; præsertim in gravidis, per quas flatus in cavum uteri & vaginæ; & contra quoque per hæc sæpe in venas impelli potest. (a)

Nervi, ab intercostalibus & ossis sacri.

Vasa lymphatica, olim in bestiis tantum, nunc quoque a Morgagnio in gravidis observata. (b). Quæ enim humano adhuc utero appinguntur, ficta esse videntur.

Ostiola, interjectis rugis, ceu valvulis (c), in cervice uteri, ductus videntur, liquidum glutinosum secernentes.

Vesiculæ, sive *corpuscula globosa*, in uteri cervice & orificio quandoque observantur (d), humorem mucosum continentia, a multis pro *hydatidibus* habitæ (e), a quibusdam pro *glandulis* (f), liquidum illud glutinosum secernentibus, quod in gravidis os uteri intus claudit. Ab aliis, pro **NOVO ET VERO OVARIO**, in quo foetus effingitur, habentur (g). Nonnullis *vesiculæ seminales mulierum* audiunt (h), ex quibus in coitu semen prolificum profundius suspicantur. (i) Hinc *usus* adhuc dubius. In puerperis & gravidis confertissima sunt, (k) magisque quam alias conspicuæ.

I 4

237

- (a) Fanton. Anat. corp. hum. p. 186. Vater. loc. cit.
 (b) Advers. IV. p. 76. (c) Ibid. Advers. I. Tab. III.
 (d) Ib. delineatæ. (e) Vid. Auctor. a Morgagn. Advers. I. 32. recensiti; & Ruysch Advers. anat. decad. I. p. 5.
 (f) Morgagn. eodem loco, & Verheyen. l. c. c. XXXIII.
 (g) Naboth. dissert. de Sterilitate; & Frid. Hoffmann. in Medic. rational. Tom. I. & contra hanc opinionem Gælie Hist. Anat. p. 183. Etmull. Epist. de Ovario novo, Hilscher. diss. de Generat. p. 2. (h) Lettres des Des-voes p. 70. & Blegny Zodiac. Tom. 1. p. 20. (i) Hein- ci dissert. de Velic. seminal. mulierum. (k) Santorin, 213.

237 III. Ovaria, olim TESTES MULIEBRES dicta, sunt duo corpora quodammodo globosa, lævia, albicantia, (utrinque unum) fundo uteri annexa; circa quæ notanda

Connexio: 1. cum fundo uteri, ope ligamenti teretis, a veteribus vas deferens mulierum dicti, quod vero meatu ad uterum destituitur.
2. cum tuba Fallopiana & lateribus pelvis per ligamenta uteri lata, & alas vespertilionum.
3. ope vasorum spermaticorum cum variis aliis partibus.

Figura; fere ovata, superne, gibbosa; inferne, plana.

Magnitudo; pro ætatis & temperamenti ratione diversa; in vigore ætatis & libidinosis maxima, ad zij. ascendens, & vesiculis prominentibus sæpe ornata; in vetulis vero exsiccata, parva, corrugata, vix zß. pendens, cicatricibus fœda.

Alæ vespertilionum: sunt membranæ ovariis & tubis interjectæ.

Membrana alba, valida, cinguntur a peritonæo.

Substantia: membranacea, fibrosa, reticulata, plurimis vasis intertexta, inter quæ sæpe apparent *vesiculæ rotundæ*, plures, pauciores, pro ætatis & temperamenti diversitate, humore albo ovi simili repletæ, qui humor ebulliendo consistentiam, colorem, & gustum quoque albi ovi adipiscitur: hinc ob analogiam cum ovis a *Stenone* primum (a) dicta sunt OVULA, quorum maxima pisum vix æquant. Quandoque x. xv. xx. imo plura in uno ovario visa sunt: quandoque vero vix unum vel alterum observari potest: creduntur prima fœtus rudimenta continere. (b)

Hydatides ibidem quoque sæpe reperiuntur: quæ vero

(a) In dissect. pisc. ex can. gen. (b) Vid. Brendel. de Embryone &c. Vallisnerius de Generat. aliique.

vero morbosæ, & sæpe hydropis in mulieribus causa sunt.

Corpora lutea, sunt substantia quasi glandulosa (*a*), lutei coloris, intestinulorum tenuissimorum similitudine contorta (*b*), ovulis substrata, quæ in sinu eorum continentur, cum in virginibus, tum maxime in gravidis & puerperis conspicua, usus adhuc dubii. (*c*)

IV. TUBÆ FALLOPIANÆ, (*Ruffo* jam notæ) sunt duo canales fere conici, tortuosi, utrinque unus, fundo uteri juncti, a similitudine cum tuba a *Fallopio* ita dicti; in his notanda

Connexio, cum utero, arcta & continua, cum ovariis, laxa, per alas vespertilionum.

Longitudo; VI. VII. quandoque VIII. IX. circiter digitorum.

Amplitudo; circa medium fere minimum digitum æquat.

Extrema vero angustiora, & quidem extremitas utero juncta minima est, in ejus cavum hians, flatum ac stylum tenuem transmittens. Altera, libere in abdomine fluctuans, amplior est, tubulum mediocrem admittit, *fimbriisque* multis, sive *laciniis*, quasi muscularibus, ornata est, ovario, quando opus est, se applicantibus; vid. Tab. III. fig. 10. 11.

Substantia; membranacea, cavernosa, ex duplici membrana constans; quarum exterior cum peritonæo, interior cum interiori membrana videtur continua. Intus rugosa est, & lubrico humore imbuta; sed non, ut in bestiis, cellulosa.

Sa copiosissima, corpus cavernosum intra membr-

) Secundum Graaf. Malpigh. Brendel. Berger. &c. Vallisner. & Santorin. p. 221. & seq. (*c*) Conf. agn. Adv. IV. p. 51. & 78. Vallisner. & Santorin. loc. cit. vid. Nota (33^a)

branas earum efficientia, ut erigi sive reddæ reddi queant, quando ovario applicanda a quibus etiam intus humectantur. (a)

Usus; Tempore fervidi coitus influxu copio sanguinis atque spirituum eriguntur, & natura naturali, orificia libera, ope fimbriarum sive laciniarum muscularium, ovariiis applicantur; genituram prolificam masculinam transmittunt; (b) ovulum imprægnatum ovario recipiunt, & ad uterum, si nihil impedit, deferunt. (c)

(Oviductus in gallinis aliisque avibus appellantur) 239 Usus uteri, genituram virilem admittit ovulum fœcundatum ex ovario & tuba Fallopiana recipere: fœtum per ix. utpl. menses continere, fovere, & nutrire, ac tandem perfectum, vi sua musculosa, per os suum & vaginam expellere.

240 Post imprægnationem nova contingit partus in feminis productio; quæ tamdiu in eis existunt, quamdiu durat graviditas. Harum principalis est EMBRYO sive FOETUS; reliquæ, ut membranae fœtus, placenta uterina, funiculus umbilicalis, vasa umbilicalia (quæ conjunctim Celso SECUNDÆ, vulgo Secundinae vocantur,) & liquor pellucidus glutinosus, cui fœtus innatat, omnes propter hunc factæ sunt.

241 Circa FOETUM igitur perfectum consideranda

I. MEMBRANÆ, cum in utero, quasi in ovo includentes. (e)

I. Ex-

(a) In Drake Anthropol. Tab. X. fig. 2. ea delineat, describit. Vid. hac de re notæ nostræ n. 34.* (b) Ruyssch. Thes. anat. V. Tab. V. fig. 1. atque Advers. anat. dec. pag. 3. Fallop. Observ. anat. & Graaf. de Org. gener. m. cap. XIV. (c) Exempla fœtuum in tuba hac, & alia extra uterum repertorum vid. Nota (35*) (d) Embryones parvi, vid. in Ruyssch. Thes. anat. VI. Tab. 2. & (e) Tales in membranis, Thes. X. f. 3. & Tab. VI. nostræ

Exterior, CHORION dicta, crassa, spongiosa, villosa, & vasis sanguiferis copiosissimis repleta est, utero contigua, atque in lamellas sive membranas duas dividua.

Interior, sive secunda, AMNIOS vocatur: quæ tenuis & pellucida est, priori contigua; in qua vero vasa vel nulla, vel paucissima, conspiciuntur; & liquor ille glutinosus, pellucidus, fœtusque in ea continentur; quæ vero membranæ in partu rumpuntur, & liquorem emittunt.

ALLANTOIS, seu *farciminalis* dicta, in omnibus bestiis, præsertim vaccis, urachio continuo, pulchre reperitur: sed non in homine: & pro urinæ collectione in eis inervit. (a) Longitudinem habet in vaccis duodecim circiter pedum; ejusque diameter, quando flatu distenta est, pedem superat: adeoque pars ingens & stupenda est. Sustinent quidem nonnulli, eam æque esse necessariam in homine, quam in bestiis; & hinc evincere volunt, quod quoque necessario in homine existat. Alii autem inter chorion & amnion, alii sub amnionem statuunt (b): verum quia eam præstantissimi anatomici non inveniunt, & urachus in fœtu humano plerumque clausus reperitur, aliarumque graves rationes reddi queunt, quare Deus mulieres ab hoc lotii onere liberare voluerit, a virisque nondum admittitur. Vasis sanguiferis autem destitutam esse volunt; quæ vero copiosius reperi & delineavi. (c)

II. PLACENTA, veteribus, *hepar uterinum*, dicta; in qua considerata numerus, in mulieribus respondet numero fœtuum: ita tamen, ut in gemellis sæpe coalitæ

(a) Vid. observ. nostra de Allantoide Eph. N. C. cent. obs. 24. (b) Vid. Act. Angl. N. 271. p. 835. ubi testata est. (c) loco antea citato.

litæ sint; quorum tamen vasa inter se communicare non videntur: in multis vero fœtibus, præsertim vaccis, plures & quàmque centum pro uno fœtu, reperiuntur; cuncturque ibi COTYLEDONES. Vid. *Fab. ab Aquap.* de fœtu formato.

Figura orbiculata, diametrum habens octo ceter novemve pollicum, & crassitiem pollicis unius.

Connexio: pars convexa & spongiosa utero hæret, *interventu membranæ tenuissimæ, reticulatæ, villosæ, chorio continuæ*: concavitas vero, fœtum recipiens, vasa multa & amplius ostendens, atque funiculo umbilicali juncturæ cingitur levi membrana chorii & amnii.

Locus, cui in utero adhæret, nullus est certus & perpetuus; plerumque tamen ejus fundus, ubi *Ruyfchius* haud pridem *novum in puerperis muscolum*, fibris spinalibus constanter sibi detexisse visus est; (a) sæpe etiam pariter posteriori.

Substantia, secundum recentiores plurimos est *glandulosa*, ex innumeris parvis glandulis composita; quæ vero videri nequeunt. Hinc melius secundum *Ruyfchium*, variosque alios hunc jam sequentes, *vasculosa* statuitur, ex meris vasculis, arteriis scilicet & venis umbilicalibus, subtilissime divisis intertextis, constans (b): nam cui usui hærent glandulæ, ubi secretio illius, quæ ex utero placentam intravit, jam facta esset.

Usus: 1. una cum chorio sanguinem & succum nutritium absorbere, ut intestina chylum (c) eumque deinde ad fœtum, per venam umbilicalem, transmittere. 2. Verisimiliter etiam san-

(a) Vid. Adv. anat. Dec. III. Tab. III.

(b) *Ruyfch.* Thes. anat. V. Tab. I & Hist. Ac. Reg. 1714.

(c) *Ruyfch.* ibid. p. 16. conf. Hist. A. R. An. 1707. p. 240.

anguinem & urinam, a foetu ad matrem, per arterias umbilicales rursus emittere. Vid. Not. (36. *)

III. VASA UMBILICALIA foetus, post partum in *ligamenta* illa (§. 217.) abeuntia, sunt *arteriae duae*, vena longe tenuiores, oriundæ ut plur. utrinque ex iliacis, internis, sive hypogastricis arteriis, quandoque ex ima parte aortæ: progrediuntur in utroque latere vesicæ ad umbilicum; hinc per funiculum umbilicalem, spiralibus contorsionibus, ad placentam: ubi, in infinitos ramulos divisæ & subdivisæ, finiuntur, sanguinemque e foetu ad placentam, & inde forte quoque rursus ad matrem transferunt. (a) *Quare vero duæ, non una, ut unica vena?* Forte, ne facile hæmorrhagia lethalis oriatur, si funiculus umbilicalis casu abrumpatur; vel aliam ob causam post partum non statim, aut non satis ligetur.

na una: arteriis duplo amplior, in placenta ex innumeris ramusculis, in unum truncum coalitis, orta: pergit inde, similibus fere contorsionibus spiralibus, inter arterias, per funiculum umbilicalem, & deinde per umbilicum ad hepar foetus: ubi finitur in *sinu venæ portæ*, in quem, sanguinem, cum succo nutritio, in placenta haustum, infundit: unde per singularem *canalem*, *venosum* dictum (b), cylindricum, venæ umbilicali quasi oppositum, ex hoc *sinu portæ*, magna parte mox ad venam cavam & cor transit; pars vero reliqua ramis venæ portæ per hepar distribuitur.

bus, in vitulo, ove, &c. est canalis pyramidalis, a fundo vesicæ primo ad umbilicum exten-

) Conf. Nota (36. *)

) Vid. Tab. nostra III. fig. 12.

extensus, quem transit, & deinde sensim in
nuo ampliatus, in *allantoidem* (S. 241.)
tunicam, ad angulos utrinque fere rectos,
ve transversim in latus aliquod terminatur (a)
ad quam urinam e vesica deducit. (b) In
tu humano totus pervius non est (c), aut
men rarissime; sed plerumque instar ligam
ti solidus reperitur: hinc canalis munere
hoc tunc haud fungi videtur; præsertim qu
tunica allantois, aut alius ejusmodi locus,
quem se exoneret, haud reperitur.

244 IV. FUNICULUS UMBILICALIS,
pars funiculi specie contorta, crassitie digiti
aut pollicis, ex una vena & duabus arteri
umbilicalibus dictis, (243.) communi men
brana crassa, sed molli, quasi spongiosa,
cellulis plurimis, liquore glutinoso limpid
repletis (d); amnio continua, cinctis comp
sita; cujus.

Ortus est in placenta, multis venæ & arteri
rum radicibus; finis, in umbilico foetus.

Longitudo, nunc duarum, nunc trium, nun
quatuor quasi spithamarum: 1. ut foetus li
bere, sine avulsione placentæ ab utero, f
movere possit; 2. ut foetu excluso, etiam
vasa hæc non mox sint ligata, tam facil
lethalis hæmorrhagia non oriatur.

Usus: generatim, ex vasis umbilicalibus con
stat; speciatim, ne vasa hæc seorsim singul
pergentia a foetu facile lædantur, & ut hu
jus ope placenta post partum ex utero com
modus educi queat.

245 V. NUTRITIO FOETUS in utero: quam
fieri putamus

men-

(a) Vid. *Fabr. ab Aquap.* de foetu formato. Tab. 13. 14.

(b) Vid. *Ephem. Nat. Cur.* Cent. VI. observ. 24.

(c) Cent. III. & IV. obs. 184. p. 465.

(d) Vid. *Roubaud.* in *Hist. Acad. Reg. An.* 1714.

ensibus primis organis digestionis nondum perfectis, per solum funiculum umbilicalem; *ensibus vero ultimis*, multas ob rationes, etiam simul per os, a *liquido* blando, *glutinoso*, etum ambiente, quod ex amnio excerni videtur. Nam reperitur 1. simile liquidum in *œsophago*, & *ventriculo*, tam fœtus humani, quam bestiarum; 2. mutatum & quasi gestum hoc conspicitur in intestinis tenuibus; *fæces* in crassis, & subinde etiam toto ileo, aliquoties observavi, *meconium* dictæ, reperiuntur copiosæ; 4. multum illius liquidi prius mensibus ambit fœtum, paucum vero sæ ultimis reperitur: quod alia ratione non consumi videtur, quam a fœtu; 5. quia illud *liquidum* fœtum ambiens nutritioni tam idoneum est, ut aptius desiderari non posset; 6. undque in os, *œsophagum*, & *ventriculum* previdetur a perpetua renitentia uteri pressio-musculorum abdominis & aeris ambientis); ut *œsophagus*, intestina, vasa lactea, etusque thoracicus hoc ipso melius dilatentur, aperta servantur, & functioni destinatæ *sim* affuescant, &c.

IV. SITUS FOETUS in utero:

ensibus primis & mediis varius est & prorsus incertus;

ensibus ultimis, plerumque sedens quasi peripitur, capite & collo inclinato; genibus versus genas, & calcaneis ad nates retractis. Manus ejus ut plurimum sunt demissæ; & pedes quasi amplectuntur. (b)

vi ante partum, plerumque ita se vertit, ut ut prolabatur deorsum ad os uteri; nates vero

Vid. Nota (37.*)

An. 1722. gravidam incidî, quæ octavo gestationis glande plumbea, per caput trajecta, intersecta erat. caput jam infimam, nates vero supremam uteri parcupabant.

vero & pedes sursum erigat. Sæpe tamen to gestationis tempore variat, & ad partem instantem usque caput in suprema vel laterali uteri parte percipitur. Vid. Spigel. de partu formato.

247 VII. PARTUS, qui est fœtus perfecti, naturalis per vaginam ex utero, ruptis foetalibus membranis, exclusio: cujus

causæ excitantes, quotquot ab Authoribus videntur, go recensentur, ut uterus majorem expansionem non admittens, stimulus meconii, urinæ, aeris & respirationis necessitas, incertæ ac dubiæ sunt.

legitimum & ordinarium, sunt menses ix. solares, aut x. lunares: seu hebdomades quadraginta.

præmaturum, menses vii. vel vii. temporibus tamen fœtus vitalis adhuc vivere sive superstes esse potest.

nimis præmaturum, si fœtus antequam optimum mensem excluditur; partus ABORTUS dicitur; & talis esse non solet.

modus ordinarius sive *naturalis* est, si fœtus per os uteri exitum molitur: ubi os uteri aperitur, membranæ fœtum ambientes rumpuntur, liquor contentus effunditur, fœtusque uteri musculorum abdominis, & diaphragmatis contractione expellitur; reliqui ejus in partu morbi, morbofi habentur, & causæ sunt partus difficilis, imo sæpe impossibilis; nisi arte emendetur. Interea tamen illi partus, ubi fœtus pedibus vel natibus exitum quærit, ad naturalem quam maxime accedunt: & vel sine artis ope, vel levi tantum adminiculo nasci poterunt.

248 DIFFERENTIÆ notabiliores, quæ inter fœtum & adultum, ante, aut brevi post partum intercedunt.

abdomine, (præter certum quandoque humorem)
 enæ & arteriæ umbilicales, & canalis venosus
 in hepate, pervia & ampla satis sunt, in
 adultis solida, contracta.

hepar valde magnum. *Ventriculus*, liquore glu-
 tinoso; *intestina* vero crassa, & sæpe etiam
 ileum, meconio repleta.

processus vermiformis intestini cæci, utpluri-
 mum amplior, quam in adultis, & fœcibus
 quoque repletus.

veses, *succenturiati* dicti, majores quam in
 adultis.

veses ipsi inæqualem habent superficiem ut vi-
 tulini.

figura, figuræ longioris, ad umbilicum valde
 protenta.

omen in fœtu feminino plerumque præclare
 occurrit.

thorace, (præter similem, ut in abdomine,
 humorem)

mandula thymus, major quam in adultis.

almones, qui non respirarunt, collapsi & ni-
 gricantes reperiuntur, atque aquæ injecti
 fundum petunt.

corde, *foramen ovale* inter dextram & fini-
 ram auriculam (38*) cum *membrana* sua
clauante, & *canalis arteriosus*, inter arteriam
 pulmonalem & aortam, aperta, pro peculiari
 sanguinis circulo in non natis: quia respirare
 queunt in utero. Prope cor in venæ cavæ
 unco inferiori *valvula insignis*. (a)

capite: (præter magnitudinem plerumque
 signem)

ca cranii hinc inde distant, inprimis ubi fon-
 tanel-

K

anel-

) A Winslowv descripta in Hist. Acad. Reg. An 1717.
 172. Cheselden. in Anat. edit. I. Tab. IX. fig. I. sub
 le nobilis nomine eam describit, sed in edit. III. hanc
 am & descriptionem rursus omisit.

} *tanella* dicitur, & suturis destituuntur. *Car-*
rebrum valde molle.

Dentes, adhuc imperfecti & sine radicibus
 } *mandibulis*, sub gingivis absconditi latent.

} *Meatus auditorius* nondum perfectus est,
 membranula quadam peculiari, cum epidermi
 de continua, post partum sensim rursus evan-
 scente, clauditur. (a)

Ossa totius corporis, paucis exceptis, vel molli-
 ra, vel imperfecta adhuc sunt: & quædam a-
 huc *prorsus cartilaginea*. *Articulationes* quoque
 nondum perfectæ. (b)

DE THORACE,

ALTERA TRUNCI PARTE.

249 **THORAX** sive **PECTUS**, dicitur magis
 illa pars corporis, inter abdomen & collum
 sita. In hoc consideranda

Partes: quæ sunt vel

Continentes, sive cavitatem efficientes,

} *communes*: cuticula, cutis, & pinguedo
 (S. 197. 198. 201.)

} *proprie*; *mammæ*, *musculi pectorales*
intercostales, alique plures; *iter*
diaphragma, *pleura*, & denique *os*
sa; ut *costæ* viginti-quatuor, *ster-*
num, *scapulæ* duæ, & *vertebræ* duo
decim, de quibus in *Osteologia*.

Contentæ in cavitate; ut *mediastinum*, *pul-*
mones, *cor*, & *pericardium*, cum *vasis*
inde oriundis magnis; præsertim *truncus*
arteriæ aortæ & *pulmonalis*, *venæ cavæ*, &
pulmonalis; *ductus thoracicus*, & denique
œsophagi sive *gulæ* pars maxima, &c.

Ufus;

(a) *Kerkring*. *Osteogenia* p. 222. & *Ruyfch*. variis in locis.

(b) *Kerkring*. *ibid*.

Ufus; actionibus vitalibus, id est respirationi & sanguinis circulo potissimum inservire. Quibus in mulieribus etiam lactis præparatio accedit.

MAMMÆ igitur hic primum describendæ; quarum figura omnibus nota. In viris nullius cogniti sunt usus; hinc mulierum potius considerandæ; ubi notanda

us, in quadrupedibus, abdomini; in mulieribus, thoraci adhærent; plures ob causas.

nerus; in homine, duæ sunt; in bestiis variis, varius.

quisita pulchrarum mammarum; sunt magnitudo mediocris, distantia modica, cutis tenera & candida, substantia duriuscula, non flaccida aut pendula, & papilla parva rosea.

gnitudo, varia: in virginibus mediocris; in gravidis, puerperis, & lactantibus, maxima; in puellis ante pubertatem & in vetulis minima: varians quoque variis in regionibus.

pus incrementi est annus circiter decimus quartus vel quintus; quo turgere sive fororiari incipiunt.

pus decrementi, varium: plerumque annus circiter quinquagesimus, nunc citius, nunc tardius.

illa: quæ est eminentia parva, fere cylindrica, rubella in medio mammæ, *areola* cincta; cujus

stantia cavernosa est, fere ut penis; hinc erigi sive intumescere solet in contrectatione & lactatione infantum: constans fibris nervosis, reticulatis, sensum acutum præbentibus: vasis sanguiferis copiosis, a mammariis, tubulorum lacteorum extremis, & epidermide, reliquam substantiam cingente.

aminula, seu *orificia tubulorum lacteorum*, in lactantibus optime, quando lac expriment,

munt, conspicua, sunt VII. VIII. ad X. homine.

areola, glandulis parvis obsita (a), in viribus grate rubella, in mulieribus junioribus plerumque obscurior, aut pallide fusca; vetulis, livida, fœda.

Cusus: pro lactatione fœtus, quæ sine papilla iri nequit.

Substantia mammarum: præter tegumenta corporis communia, epidermidem scilicet, cutem tectam, & pinguedinem; constant ex singulari & bicante glandulosa fabrica, substantiæ uberis in bestiis haud absimili, medium potissimum mammæ occupante: quam copiosa pinguedo magnam mammarum substantiam constituentem undique ambit, (b) & cujus centro papilla respondet.

Globosa vero corpora, a Nuckio (c) potissimum & Verheyeno (d), aliisque, qui hos inspecti sunt, pro glandulis multis sejunctis, delineata & descripta, glandulæ revera non sunt sed pinguedo: quod etiam confirmat Morgagnius. (e)

Substantiæ vero illi glandulosæ, præter vascula, interjecti sunt ductus, sive tubuli lactiferi ex glandulosa substantia oriundi, per anastomoses juncti, in lactantibus amplii, in sinu quasi & cellulas dilatati, lac secretum colligentes & asservantes, cum arteriis & venis communicantes; sicut illud lactis generatio, huiusmodi ejus dissipatio evincere videtur.

Hæc omnia tantum in mammis turgidis, magnis, & in primis puerperarum ac lactantium conspici possunt; vix vero vel prorsus non in puer-

(a) De harum natura vid. Morgagn. Advers. I. §. 1. & IV. p. 8. & seq. (b) Vid. Morgagn. Advers. IV. fig. 3.

(c) Adenograph. fig. 2.

(d) Anet. Corp. hum. Tab. XVIII. fig. 2. & 4.

(e) Advers. II. 92. & V. 7. 8.

puellis impuberibus, vetulis aliisque mulieribus
maciatis, aut exiguis mammis gaudentibus,
apparent.

a: arteriæ & venæ, a subclaviis, intercosta-
libus, & axillaribus, *mammariæ* dictæ; quarum
illæ, internæ; hæ, externæ appellantur.

vi; a dorsalibus *spinalis* medullæ.

a lymphatica Warthonus (a) addit.

1. lac ex arteriis in glandulosa substantia
cernere, (quod nulla arte alias e sanguine
parari potest), in tubulis & sinubus lactife-
is colligere, asservare, & suo tempore infan-
per papillam præbere. 2. venustatem femi-
is conciliare. 3. stimulum veneris utrique se-
ui excitare; virili, dum pulchras mamillas
vel solum aspiciunt; feminino, quando earum
mamas contrectant masculi.

Mammis remotis, considerata occurrunt.

1. duo *musculi*, *pectorales* majores dicti, u-
trinque unus, sub mammis siti, ad brachia
tendentes.

2. *musculi intercostales*, externi, viginti duo,
totidemque interni, inter costas siti, ele-
vando costas, respirationi inservientes; de
quibus vero prolixius in myologia.

3. *Membrana pleura* dicta, mox speciatim exa-
minanda; totum thoracis cavum investiens.

His indicatis, *pectus aperiendum*; ubi notan-
costarum utrinque in parte cartilaginea,
exta partem osseam, dissectio, & sterni eleva-
tio; quod dum fit, occurrit.

MEDIASTINUM; quod est membrana du-
plex, pleuræ continua, sita sub sterni, eique
rimiter cohærens, thoracem secundum longitu-
dinem in duas partes dividens; ubi notanda
interstitium cellulosum, satis notabile inter u-
tramque membranam, in parte diaphragmati

K 3

vici-

*) Adenograph. cap. XXXVI,

vicina; in quo subinde inflammationes abscessus oriuntur. (39*)

Connexio; cum sterno, pleura, pericardio, aliisque vicinis.

Situs, non accurate sub medio sterni, sed semel ad latus sinistrum descendit, quo dextra thoracis pars amplior fit sinistra. (a)

Vasa: arteriæ, & venæ, a mammariis & diaphragmaticis, subinde vero propriæ, ab aorta cava, mediastinæ dictæ.

Nervi, a diaphragmaticis & pari vago, exigui.

Vasa lymphatica, ad ductum thoracicum abeuntia.

Usus; I. bipartiri thoracem secundum longitudinem, ob varia commoda, ut 1. ne, uno lobo pulmonis ulcerato, mox alter inficiatur; 2. ne pus, aqua, &c. in una thoracis cavitate contenta, simul utrumque pulmonem afficiant; 3. ut uno thoracis latere vulnerato, in altero adhuc respiratio conservetur, ne vulneratus mox suffocetur. &c. II. Cor pendulum sustentare pro liberiori ejus motu, præsertim quando supini decumbimus.

254 Mediastino dissecto & sterno remoto, considerandus

SITUS PARTIUM IN THORACE.

Diaphragmatis, in parte inferiori, transverse

glandulæ thymi, in superiori & media,

pulmonis, in utroque latere;

cordis in medio quasi pericardio involutum,

ita tamen, ut maxima ejus pars sita sit in latere sinistro;

œsophagi, sive *gulæ*, in parte posteriori & sinistra;

vasorum majorum ut *venæ cavæ*, & *venæ azygos*, in parte posteriori & dextra;

Arteriæ aortæ; maxime in latere sinistro & posteriori;

du-

(a) Winslow. in Hist. Acad. Reg. A. 1715. p. 309.

ductus thoracici, in homine inter aortam & venam azygos.

Antequam autem hæc specialius considerentur,

PLEURA prius examinanda; quæ est membrana lævis, robusta, tensa, costis musculisque intercostalibus adhærens, & totum thoracis cavum cingens. In hac notanda,

1. quod constet ex duobus quasi sacculis; quorum quilibet unum latus thoracis investit, & singulus singulum lobum pulmonis continet, quodque ex horum conjunctione in medio thoracis oriatur *mediastinum* (253.)
2. quod ex duplici lamella valde vasculosa componatur.

Arteriæ, ab intercostalibus, mammariis, diaphragmaticis, copiosissimæ. (a)

3. *Vasa* | *Venæ*, a venis ejusdem nominis, ac arteriæ: quæ vero in venæ azygos, ut & cavæ truncum superiorem omnes exonerantur.

| *nervi*, ex vertebra thoracis, & a diaphragmaticis.

Lymphaticæ, ad ductum thoracicum abeuntia.

4. *Glandulæ* a quibusdam in ea statuuntur, sed immerito. Conf. Not. (6*)
5. *usus*: investire, lubricare, & firmare totum thoracem.

THYMUS, est glandula, in recens natis valde insignis, in superiori thoracis parte, proxime sub sternone sita, pericardio, truncu aortæ & venæ cavæ superioris incumbens. Hujus *extensio*; a pericardio, secundum situm trunci aortæ, ad carotidem usque initium, imo

K 4

quan-

quandoque ad thyroideam usque glandulam fere ascendit, ut aliquoties vidi.

Figura: incerta, varia, sive irregularis. (a)

Color; in infantibus pallide carneus; in adultis, obscurior.

Magnitudo: in recens natis, maxima; *longitudo* trium circiter digitorum: *latitudo*, duorum & crassities, dimidii digiti: in pueris sensim decrescit (b); & tandem in adultis & senibus penitus fere rursus evanescit.

sanguifera; glandulosa, conglomerata, membrana cincta.

Vasa *sanguifera* modo a subclaviis, vel mamariis aut mediastinis; modo a carotidibus & jugularibus.

Lymphatica, nunc ad ductum thoracicum nunc ad venam subclaviam abeunt carentque ut plurimum valvulis. Vid. Not. (40*)

Nervi, a pari vago aut intercostali.

Humor lacteus quandoque in recens natis in eo reperitur.

Ductus excretorius nullus cognitus, ideoque &

Ufus adhuc incertus. Forte lympham secernit

eamque per vasa lymphatica ductui thoracico infundit, pro sanguinis & chyli dilutione, sicuti glandulæ mesentericæ & pancreas agunt in diluendo chylo. Major hinc usus ejus est in non natis, quam in natis; quia illi respiratione adhuc destituuntur, a qua tenuitas sanguinis maxime procuratur. *Bellingerus* vult, eum in utero præparare liquidum fœtus nutritium, illudque per singulares ductus ad

(a) Vid. figura nostra 14. & 15. Tab. IV.

(b) An. 1725. in puero XIII. annos nato, hæctica extirpato, eam scirrho induratum & valde ingentem vidi.

si os ejus demandare (a); quos vero ductus nemo adhuc invenire potuit.

DIAPHRAGMA est pellis ampla, muscicola, robusta, abdomen transverse a thorace distinguens; unde Latinis *septum transversum* appellatur. In hoc notanda

Situs obliquus, inter abdomen & thoracem: sic, ut anterior & dextra pars altior, posterior longe sit declivior.

Superficies superior est convexa, inferior vero concava

Connexio, cum sterno, costis spuriiis, pericardio, mediastino, & vertebrae lumborum.

Figura vulgo cum reticulo lusorio, vel raja pisce comparatur: at in transversum valde est oblonga & elliptica. V. fig. n. 13.

Foramina, duo magna in eo notari solent.

Vid. nostr. fig. 13.

Primum, in sinistro latere, pro gulæ & paris vagi transitu.

Alterum, in dextro, per quod vena cava inferior transit.

Interstitium, inter duo capita partis inferioris, aortam, venam azygos, & ductum thoracicum transmittens.

Nomen: *phrenica* audiunt: φρένες enim *diaphragma* significat.

Arteriæ, 1. ab aorta, vel cœliaca; 2. a subclavia aut mammaria; & 3. ab intercostalibus ac lumbaribus. (b)

Venæ, a cava, azygos, & subclavia.

Nervi, 1. duo magni diaphragmatici, utrinque a vertebralibus colli oriundi; qui toti fere in illud inferuntur (c); 2.

ramuli a pari intercostali & vago.

Lym-

) Tract. de Fœtu nutrito, Londin. A. 1717. edito.

) Ruysch. Epist. IX. p. 13. (c) Sinister ramus longior, dextro, Winslow H. A. R. An. 1715. P. 313.

Lymphatica, venam jugularem adeunt. (a)
Membrana cingitur, superne a pleura, inferius
 a peritonæo.

Substantia: musculosa, cujus pars superior an-
 pla, & elliptica, a costis spuris, musculi
 abdominis transversis, & cartilagine xiphoi-
 de carnea oritur; tendineque suo centrum
 diaphragmatis nervosum, fere triangulare
 conficit; inferior vero, duplici surgit prin-
 cipio utrinque ex lumborum vertebra, & fe-
 re in centrum superioris inferitur. (b)

Usus 1. pro *respiratione*; nam in inspiratione
 movetur deorsum; in expiratione vero sur-
 sum in cavum thoracis. 2. pro *motu conten-
 torum abdominis*, ventriculi, intestinorum
 hepatis, lienis, chyli, bilis &c. promovendo
 3. pro *juvanda expulsionem* fæcum, urinæ, fœ-
 tus in partu, secundinarum &c. 4. transmittit,
 præter dicta, nervos intercostales.

258 **PULMO** est viscus maximum thoracis; in
 quo notanda

Situs; in utroque thoracis latere, cor quasi in
 medio continens.

Connexio; 1. cum sternum & vertebra ope media-
 stini. 2. cum corde, ope vasorum pulmona-
 lium. 3. cum aspra arteria.

Color; in infantibus græte rubens, in adultis &
 senibus lividus, aut ex albo & nigro variegatus.

Figura; si inflatur, ungulis quodammodo bubulis
 similis; superius convexa, inferius concava.

Divisio; in duos lobos magnos, (*Celso* fibras)
 dextrum & sinistrum; quorum sinister, qui
 minor, in duos; dexter vero, qui major, in
 tres minores, & hi deinde in innumeros mi-
 nimos dividuntur.

Membrana, qua cingitur, cum pleura continua
 est

(a) *Nuck*. Adenogr. p. 142. (b) *Elegantes diaphragma-
 tis figuræ* vid. in *Couperii* nova Myotomia Tab. 34. 35.

Substantia spongiosa Celso, sive vesiculosa Malpighio, ex meris vesiculis minimis, quasi corneis, & vasis variis composita; quæ sunt bronchia; ex annulis principio imperfectis, in progressu vero frustis vario modo commissis, cartilagineis, & membranis contractilibus composita; quæ a trachea orta, primo in ramos, dein in ramulos innumeros divisa, desinunt in minimas illas vesiculas, (interstitia relinquentes inter se communicantia) præcipuam pulmonum substantiam constituentes, quæ ramulis racemorum instar adherere videntur.

Arteria & vena pulmonalis; fere ut bronchia divisæ, ea ubique, vario tamen in variis situ, comitantur, & tandem extremis suis ramusculis, circa vesiculas, rete vasculosum Malpighii efficiunt, serviuntque non nutritioni pulmonum, sed circulo sanguinis per pulmones. (41*)

Arteria bronchialis, Ruyschii vulgo dicta, nutritioni pulmonis dicata, ex aorta, aut intercostalibus, modo simplex, duplex, imo triplex oritur, & bronchiis ubique arcte cohæret. (a)

Vena Bronchialis, ex intercostalibus vel azygos. (42*)

Nervi, a plexu thoracis paris vagi & intercostalis.

Vasa lymphatica, ad ductum thoracicum abeuntia.

1. Respiratio; qua sanguinis attenuatio in ti vasculoso perficitur. 2. voci & loquelæ servit. 3. odoratui. 4. sanguinis emundatorium. &c.

ASPERA ARTERIA, Trachea, sive Fistula spi-

la spiralis, est canalis cartilagineus a faucebus ad pulmones extensus: cujus

Situs, in media & anteriore colli parte.

Connexio; cum faucibus, pulmonibus, & œsophago

Divisio in Laryngem & Asperam arteriam, sitae dictam.

LARYNX est pars ejus suprema, crassior, si caput; in quo

Apertura ad pulmonem, *Glottis* dicta, figuræ re ellipticæ, quæ cartilaginibus ac muscibus

(a) ampliatur & angustatur, pro vocis in loquela & cantu mirabili variatione. (b)

Structura, potissimum ex cartilaginibus quinque

1. *Thyroide* sive *scutiformi*, quasi quadrangula in anteriori parte sita, quæ pomum Adam, vulgo dictum sua prominentia efficit, & reliquarum maxima est.

2. *Cricoides* sive *annulari*; ceterarum fere bathe infimam partem occupante: cui inferius aspera arteria adhæret.

3. 4. *Arytænoidibus* duabus (c): gutturniur quasi efficientibus, figuræ singularis: quæ parti posteriori & superiori cricoidis peculiaribus utrinque articulis junguntur, ut glottis aptius constringi, & dilatari queat. (d)

5. *Epiglottide*: figura sæpius folii hederæ, superiori & anteriori thyroidis parti, super quam mox post radicem linguæ erecta eminet, juncta: cui etiam ligamento suo medio, duobus vero lateralibus ossis hyoidis cornubus, & duobus posterioribus, arytænoideis cartilaginibus nectitur: quæ in deglutitione, fere ut pons mobilis, glottidem tegit, ne quid in eam incidat.

Membrana, laryngem investiens, valde sensibilis, plu-

(a) De his v. Myol. (§. 324.) (b) V. Dodart. in H. A. R. An. 1700. (c) Santorin. quamlibet ex duplici constare vult, & VII. numerat. p. 97. (d) Quatuor has priores cartilagines sæpe ex parte in ossa mutari monuimus (§. 107.).

plurimisque osculis pertusa, liquidum lubricans
colorantibus.

Glandulæ arytænoideæ, & *epiglottidis* per utram-
que hujus faciem extensæ, liquidum mucosum
cernentes pro tota aspera arteria lubricanda.
Triculi sive *sinus laryngis*, sunt cavæ, modo
majores, modo minores, intus super glottidem
extensæ, voci inservientes. (a)

Aspera arteria, sive *Trachea*, stricte sic dicta, est
canalis ille cartilagineus reliquus, quodam-
modo conicus, a larynge ad bronchia exten-
sus: cujus

Principium, rotundum, digitum facile admittit.
Trachea, paullo angustior, sub sterno thoracem su-
perat; ibique, antequam pulmones ingreditur,
in principio in duos ramos, dextrum & sinistrum,
qui *bronchia* dicuntur, dividitur, quæ utrinque
per pulmones subtilissimis ramis distribuuntur,
donec in vesiculas desinant.

Tracheæ substantia: ex annulis cartilagineis xvi. ad xx.
& tunicis.

Annuli, imperfecti sunt: nam a parte postero-
ri tota trachea, ut & principium bronchio-
rum, membranacei existunt: partim, ne de-
glutitioni obsint; partim, ut pro vocis va-
riatione & excrementorum expulsionem hi
canales constringi & dilatari queant.

Tunicæ quatuor sunt; earumque exterior *mem-
branacea* est; altera *glandulosa* (b); tertia,
musculosa, qua fibris transversis extrema cu-
jusque annuli inter se conjunguntur & contra-
hantur (c); quarta, sive interna, *tendinea* ac
robusta, longitudinalibus fibris tracheam &
bronchia breviora reddere potest, atque in ea
plu.

a) De tota aspera arteria vid. Morgagn. Adv. I. Tab.
I. & V. p. 59. & seq.

b) Vid. Morgagn. Adv. I. Tab. II. fig. 1. oo.

c) Ibid. P.

plurima oscula glandularum tunicæ securæ apparent. (a)

Vasa : arteriæ, a carotidibus externis; venæ, jugularibus.

Nervi; a recurrentibus & plexu cervicali.

Usus; 1. communis cum pulmone. 2. specialis in deglutitione.

Glandulæ etiam notabiles extus adhuc asperæ; teriæ accumbunt, quæ ei humectandæ inservire videntur; ut

1. *Thyroidea*: quæ insignis est, ut plur. infundibulæ cornutæ, medio suo superioribus tracheæ annulis, cornubus vero sursum erectis, utrinque laryngi, & œsophago adherentibus. De qua vid. plura in Adenologia N. 383. & seq.

2. *Bronchiales*; quæ sunt glandulæ nigræ inferiori tracheæ parti, bronchiorum divisionibus, & œsophago nexæ, majores & minores usus dubii. Vid. plura ibid. N. 388.

260 In CORDIS examine considerabimus primum PERICARDIUM, quod est saccus membranaceus, in parte media & infima thoracis inter duos pulmonis lobos situs, cor laxè includens. Hujus

Figura; conoides, cordi analoga, fere triangularis

Magnitudo, talis, ut cor commode continere queat.

Connexio; cum mediastino, diaphragmate, & vasis cordis magnis sive communibus; a quibus hoc, simul cum corde, ob rationes N. 261. dicendas, sustentatur. In bestiis vero plerisque cum diaphragmate non cohæret.

Substantia; ex membrana duplici, quarum

{ *exterior*, communis cum mediastino & pleura,

{ *interior*, propria, lubrica est, cum tunicis majorum vasorum continua, in qua quandoque innumera

Fora-

(a) Ibid. Tab. I.

aminula, sive *pori*, adverso sole sæpe apparent.
arteriosa & venosa, a mediastinis & diaphragmaticis.

vi quoque a diaphragmaticis.

aphatica ad ductum thoracicum abeunt.

1. sustentare cor, quasi pendulum, maxime quando dorso incumbimus; 2. defendere cor, ne aer frigidior, pulmones ingrediens, illud forte offendat; 3. ne pus, aqua, sanguis, a thorace hærens, cor lædere possit; 4. liorem pericardii, pro expeditiori cordis motu, continere.

pericardii est liquidum loturæ carnis simile, quod in pericardio, parva plerumque copia, reperitur; videturque pro cordis humectatione, motusque facilitate (qui liberrimus & continuus hic requiritur,) inservire; quod, si deficiat, in sacculo hoc colligitur. Multi enim ex *glandulis* deducunt, quas vel in pericardio, vel in corde ipso existere volunt; quia vero hæc demonstrari non possunt, illum potius, in systole cordis & auricularum, ex his exprimi suspicor, nixus observatione *Bartholinii*, de vulnere pericardii, (*a*), & experimento *Thebesii* (*b*) eumque potius a *poris* pericardii rursus absorberi, quam excerni, existimo; male vero a quibusdam *negatur*. (*c*)

cretio pericardii cum corde in hæticis aliquoties a me observata est. Illud vero *defecisse* norunt varii. (*d*)

COR est pars musculosa, robustissima, pericardio inclusa, in medio fere thoracis inter pulmones pendula, circulationis sanguinis & vitæ organum primarium. In hoc notanda

Fi-

) Anat. Reform. cap. de pericardio.

) Dissert. de Circ. Sangu. in corde.

) Conf. exper. *Littrii* Hist. Ac. Reg. A. 1711. p. 37.

) Ibid. A. 1712. p. 47. *Geney* Chirurgie p. 339. *Columbe* de Re anatomica.

Figura quodammodo conica; cujus pars amplior *basis*; tenuior, *apex* dicitur; *inferior* planior, *superior* convexa est.

Situs, fere transversus sive *horizontalis*; ita, *basis* in dextro, *apex* cum maxima cordis parte in sinistro latere, ubi pulsare percipitur hæreat. (a) *Plana* superficies *diaphragmatis* incumbit, convexa sursum spectat.

Connexio; 1. interventu *pericardii* cum *mediastino*, *sterno*, *vertebris*, & *diaphragmatis* quoque media parte; ne in motibus corporis variis sede sua disturbari, inverti, aut distorqueri possit; id quod sine præsentaneo vitæ periculo contingere non posset. 2. *basis* vasis communibus cohæret; *apex* vero liber est, & cavitatem quadam lobi sinistri pulmonis juxta sextam costam veram fovetur.

Longitudo, vi. circiter transversorum digitorum; *latitudo* *basis*, v. *circumferentia* ejusdem circiter xiii. digitorum.

Substantia: *carnea* sive *musculosa*, *Hippocrati* & *Celso* jam nota: (b) duabus magnis cavitatibus, quæ *ventriculi* dicuntur, instructa, extus & intus *membrana* cincta.

Pinguedo, *vasa cordis*, *basin*, & *apicem* obducit pro eo lubricando, ejusque motu perpetuo facilitando.

Vasa sanguifera; quæ sunt vel

Propria: ut *arteriæ* & *venæ*, *coronariæ* dictæ innumeris ramis per ipsum cor distributæ pulchre a *Ruyschio* delineatæ. (c)

Communia eaque maxima: *venæ* duæ, *cava* & *pulmonalis*; atque *arteriæ* duæ, *pulmonalis* & *aorta*.

Ner-

(a) Optime delineata ab *Vesalio* Lib. III. fig. ult. & lib. VI. fig. variis, atque *Eustachio* Tab. IX.

(b) *Cels.* lib. IV. cap. i.

(c) *Epist. problem.* III. & *Thes. anat.* IV. Tab. III.

vi: a pari vago & intercostali, non adeo insignes.

ci s. *sinus*, duo; alter ad auriculam dextram, alter ad sinistram.

iculae duae, (cordis in basi quasi appendices) dextra & sinistra vulgo dicta. Dextra, longe major sinistra; hæc, in posteriori; illa, in anteriori parte sita est. Sunt diverticula sanguinis, dum cor est in *systole*; & substantiam habent muscularem, ex columnis, quasi lacertosis, cum interjectis sulcis, pro constrictione & expulsiōe sanguinis in cor, quando hoc est in *diastole*; hinc horum motus, cum cordis motu, *achronos* est.

itates duae, *Ventriculi* dictæ, perquam insignes, quorum

Dexter, tenuior & debilior, sed ut plurimum capacior sinistro, sanguinem ex vena cava & auricula dextra recipit; atque in arteriam pulmonalem ac pulmones expellit.

sinister longe robustior & crassior, at angustior (43.*) dextro, sanguinem ex vena pulmonali, & auricula sinistra accipit, atque in aortam magna vi extrudit. Ille in anteriori thoracis parte, hic in posteriori situs est; quare ille *anterior*, hic *posterior* rectius dici posset. (a)

Septum, inter duos ventriculos, robustum, non perforatum.

Foramen magnum in auricula dextra, inter venæ cavæ superioris & inferioris concursum multi cum *Louvero* statuunt, eique magnos usus adscribunt. Verum hoc quidem in bestiis, sed non in homine inveni. (44)

Columnæ sive *columnæ carneæ*, cum sulcis interjectis, in utriusque ventriculi & auriculae parietibus quam plurimi, *totidem quasi parvuli*
L *mus-*

musculi, ex quorum tendinearum fibrarum concursu in corde sunt peculiare membrana *valvulae* dictae, ad officia auricularum compositae. Ejusmodi etiam columnae ex uno ventriculorum latere in oppositum transverse ieruntur; partim ut in systole contractione cordis juvent, partim ut in diastole nimia eorum dilatationem impendant. (a)

Valvulae cordis sunt triplices: 1. *tricuspidales* dictae, tres, ad ingressum venae cavae, in dextro ventriculo; 2. *mitrales*, duae, prioribus similes, ad ingressum venae pulmonalis, in sinistro ventriculo; sanguinis ex corde refluxum constringitur, in venas impediens; *semilunares*, tres, tam in principio arteriae magnae, quam pulmonalis, reditum sanguinis arteriis in cor prohibentes: quae roboris causa *fibris carneis & corpusculis certis sphaeroideis* instructae sunt. (b)

Oscula venarum Thebesii (c) & *Verheyeni* (d) in caveis cordis, quae male pro arteriis, fermentum cordis excernentibus, habita sunt a *Vieu* senio (e); revehunt enim sanguinem ex substantia cordis, tam ex arteriis, quam venis, a cava ejus.

Fibrae substantiae muscularis mirabilem obtinent fabricam, egregie primum a *Louvero* (f) explicatae. 1. enim occurrunt *rectae* in ventriculo sinistro. 2. (45*) aliquo modo *spirales*, utriusque ventriculo communes, & quidem duplicis ordinis; exteriores, a *basi & tendine cordis* sinistrorsum; interiores, dextrorsum excurrunt, & priores intersecant. 3. aliae *arcuatae obli-*

(a) Vid. de his, ut & de tota reliqua cordis fabrica elegantissimae *Couperii* novae figurae in *Myotom.* in fol. a Tab. 36. ad 40. (b) *Morgagn.* Advers. I. Tab. IV. fig. 3.

(c) *Dissert. de Circ. Sang. in corde.* (d) *Anat. cap. de Corde.* (e) *Nouvelles Decouvertes sur le coeur.*

(f) *Tract. de Corde.*

aliquæ, transversæ, vix satis extricandæ (a),
 gendoque cava cordis exacte constringunt, at-
 que sanguinem expellunt. Hanc vero fabricam
 duos distinctos musculos, quorum quilibet
 unum ventriculum efficit, resolvi docuit *VVins-*
us. (b)

: *circulatio sanguinis.* Sanguinem enim per
 nas ex omnibus partibus recipit, & per ar-
 terias ad omnes rursus partes suo motu pro-
 illit; unde vitæ corporisque conservatio, &
 omnium reliquarum partium functiones de-
 pendunt.

is hic cordis mirabilis est, dies noctesque,
ne intermissione, & sine delassatione, centum
andoque annos perdurans, unicoque die cen-
is millies fere pulsans, quo ipso autem ve-
um a Mechanicis adeo desideratum perpetuum
bile constituit, DEI quæ stupendam sapien-
am manifestat. (c)

ulatio sanguinis in fœtu, utero contento, ob
spirationis defectum & pulmonum quietem,
a ratione contingit, quam in natis; sanguis
im in illo non (excepta pauca quantitate)
per pulmones transagitur; verum partim per
amen ovale, inter dextram & sinistram au-
culam, partim per canalem arteriosum, inter
teriam pulmonalem sinistram & aortam, ad
sinistrum cordis ventriculum & aortam transit.

ŒSOPHAGUS sive **GULA**, Ciceroni *ſto-*
machus, est canalis membranaceus, a faucibus
 ventriculum extensus, cibum & potum ab
 e ad ventriculum transmittens. Hujus
ra, infundibuliformis; & pars suprema **PHA-**
RYNX audit.

L 2

Si-

Lancis. de corde Tab. IV.

Hist. Ac. Reg. A. 1711. ubi & valvularum cordis
preparatio. (c) Vid. Hamberger diss. de Deo ex de-
ratione cordis.

Situs; in collo, fere post tracheam, juxta longitudinem vertebrarum colli, in thorace tantum parum ob aortam ad dextram, sed mox rursus in sinistram inflectitur. Conf. Not. (46.)

Substantia, membranacea, ex quinque tunicis constans, quarum

1. *exterior membranacea*, in thorace cum pleura continua.
2. *musculosa*, robusta; in homine ex duplici strato, fibris scilicet longitudinalibus & annularibus sive circularibus (a); in bobus vero, ex duabus lamellis spiralibus, se decussantibus, constans; constrictioni & propellendis cibis inserviens.
3. *cellulosa*, fere ut in intestinis.
4. *nervea*, quoque satis crassa, in varias huc lamellas dividua; multis vasculis & glandulis instructa, (quæ propterea a Verberino (b) in *vasculosam* & *glandulosam* subdividitur) cum membrana oris & ventriculi interiori continua.
5. *villosa*, vulgo *crusta villosa*, humore lubrico obducta.

Musculi pharyngis œsophagi partem superiorem vel aperiunt, vel constringunt; de quibus vide in Myologia.

Glandulæ minores in suprema præsertim pharyngis parte copiosæ, quæ cum osculo excretorio haud raro apparent.

Arteriæ a carotidibus, aorta, intercostalibus, cœliaca.

Venæ, a jugularibus, azygos, & coronaria ventriculi.

Nervi, a pari vago. Forte & *vasa lymphatica*. Du-

(a) Vide Cowper. Myotom. in sol. Tab. XXIX. fig. Schelhammer. in Analect. anat. diss. VIII. N. 54. & Sæporin. p. 138. eas *spirales* esse contendunt.

(b) Anatom. cap. de œsophago.

us excretorii novi Vercelloni (a) liquidum sub-
lsum in œsophagum & ventriculum ducen-
s, orti ex glandulis
stricis, conglomeratis, sinistro ventriculi ori-
ficio vicinis;
rsalibus, circa quintam thoracis vertebram
sitis;
onchialibus, trachealibus ex thyroidea. Vid.
Notæ sub N. (47.)*
, deglutitio & commixtio liquidi, digestio-
inservientis.

DE COLLO.

TERTIA TRUNCIPARTE.

COLLUM est tertia pars trunci, tenuior
 licet illa, inter thoracem & caput sita; a
 erno & claviculis ad caput se extendens.
 onstat ex
gumentis communibus.
vertebris, ut plurimum septem.
sculis, multis, caput, collum, laryngem,
pharyngem, os hyoides, &c. moventibus.
tertis, carotidibus internis & externis, at-
que vertebralibus, valde insignibus.
is, jugularibus, internis & externis, venis-
que vertebralibus, admodum magnis.
rvis, magnis, parvis vagi, intercostalis, re-
currentibus, diaphragmaticis, & brachialibus.
dullæ spinalis parte.
pera arteria, sive Trachea, præcipue Laryn-
ge, in quo pōmum Adami hic eminet.
arynge & Oesophagi parte.
andula thyroidea aliisque minoribus glandulis.
 Actum vero jam est de *Vertebris* ejus N. 116.
 120. de *Aspera arteria* N. 259. & de *Oeso-*
 L 3 pha
 Dissert. Anat. de Gland. conglomeratis œsophagi.

phago N. 262. Sed de medulla in spina, *musculis*, *arteriis*, *venis*, & *nervis* infra speciatim dicturi sumus; non enim negligenda vel omittenda est colli consideratio, ut multianatomici consueverunt; quia partes continet huius minoris ad vitam momenti, scituque haud minus necessarias, quam abdomen; quæ propterea indicendæ a docentibus, & probe noscendæ a discentibus. Hinc etiam ab *Aristotele*, *Ruffo*, *Oribasio*, *Coitero*, *Riolano*, *Ruyfchio*, *Magnagnio*, aliisque in suis corporis divisionibus non omittitur, & a reliquis partibus distinguitur; quia neque recte, neque commode, a capite, aut ad thoracem referri potest.

DE CAPIT E, TRUNCI QUARTA PARTE.

265 **CAPUT**, quarta trunci pars, est omne illud quod supremæ colli vertebræ insistit. In hoc notanda

Figura; rotundo-oblonga, quodammodo ovata, eminens antè & posterius, ad latera vero complanata; sic tamen, ut anterior pars, præsertim circa frontem, minùs lata, quam posterior. Figura huic contrariæ vel ab hac recedens, deformitatem, atque sæpe iudicii læsionem, & infert, & indicat. **Magnitudo**; proportionata sit corpori; magnitudo enim vel parva nimis vitium non solum formæ, sed & iudicii plerumque producit. Præstat tamen caput paullo majus capite nimis parvo, quippe in quo plerumque etiam parum iudicii.

Situs; in suprema corporis parte, ob utilitatem organorum sensuum, quæ in eo continentur, & animæ quasi satellites sunt, in loco altiori positionem.

Divisio superficiei, in partem

{ *non capillatam*, quæ facies dicitur, organa sensuum, ut *visus*, *olfactus*, *gustus*, *auditus*, &c. *continens*, &c.

{ *capillatam*; cujus pars anterior, *sinciput*; posterior, *occiput*; *suprema*, *bregma* & *vertex*; laterales vero partes, *tempora* audiunt.

Partes constituentes; quæ sunt vel continentæ, vel contentæ.

CONTINENTES PARTES CAPILLATÆ sunt vel

{ *Communes*, ut in aliis partibus; nimirum

{ *Cuticula*, sive *epidermis*;

{ *Cutis*, quæ hic crassissima, & durissima;

{ *Pinguedo*: circa cranium pauca; in genis copiosa.

{ *Proprie*,

{ *PILI*, de quibus N. 199. actum est.

MUSCULI CRANII, quatuor: valde tenues, duo in fronte, *frontales*; & duo plerumque in occipite, *Occipitales* dicti; qui suis tendinibus superne cranium, tanquam *galea*, cingunt. Vid. *Myologia*.

PERICRANIUM, est membrana cranium proxime investiens; tenuis quidem, at satis valida.

{ *Cohæret* cum cranio, musculis vicinis, & dura matre, præsertim circa *futuras*.

{ *Dividi* potest in duas lamellas; hinc a quibusdam in *pericranium* & *periostrium*, sed præter necessitatem aut utilitatem distinguitur.

{ *Vasa sanguifera* habet copiosissima, cum reliquo capite communia;

Nervos vero e vertebrais colli, & p
ri VII. cerebri.

U^sus ejus est, 1. sustentare vasa pr
cranii nutritione, 2. pro sensu cran
nio conciliando; quod, utpote o
sine hac membrana non sentit.

CRANIUM; pro cerebri defensione
mere osseum, ex octo robustis constan
ossibus, ope suturarum junctis; de qu
bus jam in Osteologia. Hic vero solur
notandum, quod, ad interiora lustran
da, superior, dimidia circiter pars, sei
ra transverse sive *horizontaliter* dividen
da, & deinde caute auferenda, qua ab
lata, rubentia puncta, quæ vascula ru
pta demonstrant, quomodo subjectæ du
ræ matri, a qua intus nutritur, per
vascula adhæserit.

CONTENTÆ PARTES sunt Cere
brum, &c.

267 Circa CEREBRUM, animæ sedem prima
riam, primum

MEMBRANÆ tres notandæ, *meninges* & *ma
tres* dictæ; quarum

I. DURA MATER, mox sub cranio sita, ro
busta, crassa, & dividua membrana, ex fibris
tendineis constans (a): in qua

Punctula rubra, s. vascula rupta, avulso cranio
secto, apparens.

Figura & Magnitudo cum cerebro fere & cranio
conveniunt.

Connexio jungitur ubique cranio, superius tamen
laxius, inferius arctius: ita & cum subjectis
partibus laxè cohæret.

Arteriæ, a carotidibus & vertebralibus, ut ra
musculi distributæ. (b)

Venæ,

(a) *Pacchion.* de dura matre.

(b) *Ruyseb.* Thes. V. Tab. II. f. 4.

, duplicis generis; quædam ut alibi in corpore, arteriisque sociæ; quædam vero peculiari, triangularis figuræ, robustæ, & SINUS vocantur. In his notanda

numerus; quidam multos statuunt (*a*); alii tantum quatuor præcipuos numerant; ut primo *Sagittalem* vel *Longitudinalem*, qui a fronte & crista galli ad occiput per medium cerebri excurrrens, desinit in duos *Laterales*, (*48**) figuram *circumflexi* Græcorum repræsentantes, utrinque in *venæ jugularis* sinum sive diverticulum se exonerantes; qui cerebro exempto demum videri possunt. Denique *Quartus* a regione glandulæ pinealis provenit, (*b*) & inferitur fere, ubi illi tres concurrunt: quem locum *Torcular Herophili* appellant. (*c*) *Minores*, infra cerebrum adhuc varii, de quibus infra N. 274.

Insertio singularis in hos sinus. *Glandulæ* conglobatæ *Pacchioni* exiguæ in parte superiori. (*d*)

Arterie Villisi transversæ in sinibus, nimiam sinuum extensionem impedientes.

Uterus; sanguinem peculiari artificio e cerebro revehere.

Uterus, a quinto & septimo pari cerebri, profusus.

Uterus lymphaticus, nondum certe demonstrata.

Uterus; 1. *falciformis*, inter duo cerebri hemisphæria; 2. inter cerebrum & cerebellum; 3. inter cerebelli divisionem, magni usus.

Uterus; secundum *Baglivium* & *Pacchionum*, huic membranæ proprius, muscularis; qui vero a consensu arteriarum ejus oriri videtur. (*e*)

Uterus

Ortlob, in *Oecon. animal.* fig. 1. & *Vienssen.* in *Nevrogr.*

Ridley Anat. cerebr. fig. IV. C.

Ibid. lit. g. & f. 5. lit. P. & *Vieuss.* l. c. Tab. 1. E.

Tr. de gland. dur. matr. & *Ruyseb. Thef. anat.* VII.

I. f. 3. (*e*) *Ridley Trans. Angl.* 1703.

Usus duræ matris; 1. loco periostii cranio interservire; 2. cerebrum defendere; 3. processibus suis cerebrum & cerebellum firmare compressionemque præcavere; 4. ope sinuum caverem cerebro conciliare.

DE ARACHNOIDEA.

268 II. ARACHNOIDES, altera cerebri tunica, a *Varolio* primum descripta, (a) valde tenuis, ob similitudinem telæ araneæ dicitur; in qua notanda

Situs; sub dura matre, intra hanc & pia matrem.

Connexio, in superiori cerebri parte, cum pia matre adeo arcta, ut sine laceratione inde separari nequeat; in inferiori vero parte, præsertim circa cerebellum, medullam oblongam & totam spinalem, tam laxa, ut ibidem sine sectione facile & abunde conspici queat licet nonnulli adhuc hodie eam in dubium vocent, aut prorsus negent, aut solum, ut *Riccius* (b) aliique, pro exteriori piæ matris lamella habeant.

Extensio; eadem ac duræ matris, nimirum per totum cerebrum & spinalem medullam; hanc vero tantum laxissime ambit: ut optime videri potest, si in aqua, vel spiritu vini suspenditur.

Vasa sanguifera; nulla in ea, sicut in epidermide, certe observata sunt; quamvis a nonnullis delineantur. (c)

Glandulæ inter hanc & duram matrem circa truncos vasorum a *Santorino* hic describuntur (d) quæ

(a) Morgagn. Epist. anat. x. n. 91.

(b) Anatom. cerebri.

(c) Ut *Bidloo* Anat. corp. hum. Tab. 8. fig. 5.

(d) Observ. Anatom. p. 52.

quæ liquidum, quod inter has membranas, discernere videntur,

II. cerebri involucrum constituere. Quid vero tam tenuis membrana, in qua nulla vasa conpiciuntur, cerebro & medullæ spinali prodesse possit, haud adeo patet. Attamen, monente *Santorino* (a), cum pia mater inter cerebri anfractus alte se demittat, hæc super eam protenditur, ut & subeuntia vasa firmet, & frequentissimos eorum flexuum sulcos colligat, & ne quid illuc intro forte descendat, quod cerebrum lædere possit, omnino prohibet.

III. PIA MATER, (quæ vulgo una cum Arachnoidea pro secunda habetur) secundum recentiores est tertia cerebri membrana, sub Arachnoidea cerebrum proxime & firmiter ambiens. In hac notanda

1. *Extensio*, non solum per superficiem cerebri, sed etiam per omnes ejus sulcos, anfractus, & pliegas, se insinuat. Medullam in spina & nervos quoque investit; hinc superficies ejus longe major, quam reliquarum cerebri membranarum. 2. *Adhesio* cum

Cerebro sano, arcta & firma; in hydropicis laxa.

3. *Arachnoidea*, superius arcta, inferius laxa.

4. *Dura matre*, non nisi per venas, ad sinus abeuntes.

5. *Arteria sanguifera*, communia cum reliquo cerebro, opiosissima, sic ut ex talibus fere tota conflata videatur: prout injectiones mirabiles *Ruyschii* (b) docuerunt.

6. *Arteriæ*, a carotidibus internis & vertebralibus.

7. *Venæ*, singulari, obliqua ratione varios in sinus duræ matris; hi in sacco, sive diverticula;

a) Ibidem pag. 53.

b) Epistol. problem. VII. IX. XII. ut & Thes. anat. is in locis.

Vasa; hæc in venas jugulares & vertebrales exonerant.

Nervi, hujus substantiam intrantes, nulli observati sunt.

Vasa quoque *lymphatica*, nulla mihi in cerebro visa. *Glandulae*, a *Villifio* aliisque in ea statuuntur secretioni liquidi, meninges humectantis, destinatae: quæ vero ut plurimum tantum circum sinum longitudinalem observantur, vel eadem esse videntur, quæ N. 268. *Santorinus* tunicam arachnoideam adscripsit.

Ufus; involvere cerebrum, & sustentare ejus vasa sanguifera, ut hæc eo melius per omnes sulcos, plicas, & anfractus illius distribuiqueant, pro liquidi in cerebro fecernendi, sive spirituum sufficienti copia suppeditanda.

270 **CEREBRUM** stricte dictum: in quo notanda
(*Figura* superius globosa, sed paulo inæqualis, *anfractibus*, *sulcis*, seu *gyris* suis interstitiula quasi repræsentans.

Divisio; in duo quasi *hemisphæria*, interveniente processus falciformis, & hæc in *lobos*, anteriores, medios, & posteriores.

Magnitudo, seu moles integri cerebri, ad libras quatuor accedit; & sic fere triplo majus cerebro bubulo.

Substantia: si pars quædam refecatur, duplex apparet:

Exterior, *cinericia* sive *corticalis* dicta; cujus *crassities* duarum quasi linearum, & reptatus serpentinus, profunde sæpius cerebrum penetrans.

Structura: secundum

Malpighium, *Bidloum*, & plerisque hos sequentes recentiores, glandulosa;

Russ-

| *Ruyfchium* vero, *Bergerum*, *Vieuffenium*, & alios tota vasculosa (a); certe enim, si ubique in aliis visceribus, hic tamen glandulas non demonstrata esse puto.

◊ interior, alba, *medullaris* appellata, cujus *structura* videtur fibrosa, tubulosa, totum reliquum cerebri constituens.

| *origo*; ex arterioliis minimis substantiæ corticalis.

| *finis*; principium nervorum, qui inde omnes oriuntur.

◊ *durities* paulo major corticali.

Corpus callosum, in conspectum prodiens hemisphæriis diductis; quod album est, duriusculum, & hemisphæria cerebri fibris transversis conjungit; in quo *Lancisus* aliique sedem animæ cogitantis constituunt. (b)

Ventriculi sunt notabiles sive insignes cavitates in cerebro, figuræ irregularis, & quatuor vulgo numerantur.

Anteriores duo; primus scil. & secundus, qui maximi; apparent demum, quando cerebrum, horizontali sectione, ad corpus usque callosum, affertur. (c) In his notanda

◊ *Septum lucidum*, seu potius *pellucidum*, elevato corpore calloso, inter duos hosce ventriculos conspicuum; ex substantia quidem tenui medullari, duplici tamen pariete, caveam oblongam comprehendente, pia matre obducta, constans, dictos ventriculos, fere ut mediastinum pectus, distinguit. A *Galeno* appellatum est *diaphragma cerebri*.

For-

a) *Ruyfch. Epist. XII. & Thes. anat. variis in locis. Bergeri in Physiolog. Vieuffenius in novo systemate vasorum.*

b) *Dissert. de Sede animæ cogitantis. Camerarij in Elect. medicin. p. 18. (c) Hos glacie totos repletos reperi in avere senis A. 1726.*

Fornix; sub lepto lucido occurrit, ex medullari substantia compositus; cujus pars anterior duplici surgit radice, quæ me coeunt; posterior rursus bifida, *Crun fornicis*, item *Pedes hippocampi*, dicta *Plexus choroideus*, est membrana vascul repletissima; at glandulis destituta; pu chre delineatus a *Ruyschio*. (a)

Corpora striata; extus cineracea, intus pu chre striata, principia medullæ oblon gatæ constituunt.

Thalami nervorum opticoꝝ; extus albi intus cineracei; inter quos & cerebellum *Ventriculus tertius*; (b) in quo, præter plexu choroidei partem, notanda *Glandula pinealis* substantiæ cinericiæ, cum processibus & bat sæpe medullaribus, *Nates*, *Testes*, atque sul his *Valvula magna cerebri*, & *Aquæductus Syl vii*; (c) cujus orificium posterius *Anus*, ante rius *Rima ad infundibulum*, ac *Valva* multis vocatur, communicationem præbens duobus anterioribus ventriculis, & tertio cum quar to. Quæ vero pleraque ex emto cerebro melius videri possunt.

Ventriculus quartus, est cavitas inter cerebellum & subjectam medullam oblongatam, ex emto, & dissecto per medium cerebello, demum ri te conspicuus, de quo plura N. 272.

271 **CEREBELLUM**, quasi parvum cerebrum: quia hoc sexies fere minus est. In quo notanda *Situs*; sub posterioribus lobis cerebri, & po sterioribus duræ matris processibus, in in feriori cranii parte, quibus, ne a cerebro com primatur, impeditur.

Fi-

(a) In Epistolis Tab. 15.

(b) Multi de hoc ventriculo aliter sentiunt.

(c) A *Vesalio* & *Arantie* jam descriptus; *Morgagni*, Epist. anat. I. n. 91.

ura; ad globosam, aliquo modo compressam, accedit.

superficies; minus gyrata, quam cerebri, sed quasi *fulcata*, & in lamellas fere parallelas visa; quæ lamellæ in medio maximæ, at per gradus utrinque, tanquam diversa circuli segmenta, sensim minores, desinunt utrinque. *Processum*, *vermiformem* dictum, anteriorem posteriorem.

Quantitas; si in partem dexteram & sinistram vitro dividitur, corticalis quoque est & medullaris, sed corticalis longe hic copiosior medullari, atque arbusculas pulchre repræsentat, eorum trunci ita dictos *Pedunculos cerebelli* constituunt.

Qualitates; nullæ adsunt in cerebello, secus ac cerebro.

Forma *li cerebelli*, racematim quasi arbusculis medullaribus, foliorum instar, diviso cerebello, hærentes, apparent, (*a*) qui vero lobuli, & foliola, cerebro integro lamellæ illæ sunt cerebelli, pia matre cinctæ, & totum cerebellum constituentes.

Processus *pedunculi cerebelli*, ex tribus processibus medullaribus constant, quorum *primus* a cerebello versus testes ascendit, & *Valvulam magnam cerebri* format; *alter Prominentiam annularem Villisii*, sive *Pontem Varolii*; *tertius* vero ad *medullam spinalem* descendit.

MEDULLA OBLONGATA, est substantia inferior, cerebri & cerebelli, medullaris, caudam quasi coalita, ad foramen magnum occipitis extensa; spinali medullæ & nervi cerebri originem præbens. (*b*) In hujus parte inferiori,

Dum

Vid. Fig. nostra 16. Tab. IV.

Hanc sensorium commune esse existimat Schelham. anat. diff. XIII. N. XXV.

(C) *Dum cerebrum e cranio decenter eximitur spectanda*

(C) *Nervorum cerebri, vulgo x. rectius ix. tantum paria, commode sub his versiculis comprehensa;*

*Olfaciens, Cernens, Oculosque movens
Patiensque,
Gustans, Abducens, Audiensque, I-*
gansque, Loquensque.

Arteriarum carotidum internarum in c-
nium ingressus.

Infundibulum, ejusque in glandulam piti-
tariam insertio.

(C) *Nervus spinalis accessorius Villisi. (a)*

(C) *Postquam cerebrum e cranio exemptum e-*
consideranda

In parte inferiori.

(C) *Arteriarum carotidum & vertebrali-
um anastomoses (b), ac singularis per cere-*
brum distributio, (c)

*Crura medullæ oblongatæ
cerebri*

Crura, seu pedunculi ce-
rebri,

Ortus plerorumque nervorum cerebri p-
rium.

Protuberantiæ orbiculares, pone infundi-
bulum, duæ.

Protuberantia annularis Villisi, sive Pon-
Varolii, male a Villiso, aliisque, se-
recte a Ruyschio delineata. (d)

Finis medullæ oblongatæ, atque in ho-
minibus eminentiæ pyramidales & olivares Vie-
sssenii (e) ac Ruyschii (f).

Tuni-

(a) De Cerebro, Fig. 1. MM.

(b) Ridley l. c. fig. 1. d. (c.) Ruyschius Epist. probl.

Tab. XIII. & XV. (d) Ibidem.

(e) Tab. 4. R. S. (f) Epist. Tab. 14. f. 4. & 5.

Tunica arachnoides, maxime hic conspicua. parte superiori, postquam cerebrum rursus invertitur.

Ventriculus iv. & Calamus scriptorius, cum crena sua.

Omnia rursus, quæ in *Ventriculo tertio descripta sunt*.

Substantia medullæ oblongatæ: extus, medullaris est; intus, paucum corticalis, seu cinericiæ substantiæ, continet.

SA harum partium, & simul totius cerebri; *Arteriæ*, a carotidibus & vertebralibus; *carotides* per singulares canales ossis petrosi; *vertebrales* vero, per foramen magnum occipitis; miris flexibus cranium intrant.

Venæ, interiorem cerebri substantiam vix penetrant, sed e corticali prodeuntes, se in sinus duræ matris (S. 267.) inferunt.

vi, & *vasa lymphatica* haud certe perspecta.

US CEREBRI.

generalis est, functionibus animæ famulari, 2. *spiritus secernere*, eosque ad nervos, pro sensu & motu, transmittere. Cerebrum tamen *spirituum animalium*, cerebellum vero *vitalium & naturalium* secretioni magis destinatum est.

specialis vero uniuscujusque partis cerebri (quibusdam forte exceptis) incognitus, vel certe perquam dubius.

Restant, cerebro exempto, in cranio adhuc consideranda: *Egressus novem illorum* (S. 272.) *trium nervorum cerebri*. *Ingressus arteriarum cerebri & duræ matris*.

US DURÆ MATRIS majores, (S. 267.)

III. & IV. *sinus falcis inferior*; itemque *circularis* (a) circa glandulam pituitariam, *Retracula* veteribus dicta (b), atque alii mi-

M

nores

(a) Ridley Fig. II. 2. 2. (b) Morgagn. Adv. VI. p. 7.

nones varii, imo quamplurimi, in basi crani (a), una cum eorum exitu e cranio vario & partim in venas occipitales & vertebrales maxime vero in venas jugulares ingressus quos omnes prolixè describere, vix operæ pretium est.

RETE MIRABILE: quod est plexus vasorum & fibrarum membranacearum retiformis, utriusque juxta glandulam pituitariam, sub dura matre, ubi sinus circularis est, situs; major in vitulis, quam homine; sed usus incogniti.

GLANDULA PITUITARIA, est parva glandula, in sella equina, intra duplicaturam duriæ matris sita, in qua aliqua cavitas (c); cuius

Denominatio: ab attributo usu absorbendi pituitam cerebri.

Membranae duæ: 1. dura matre cingitur & suspensa tenetur. (d) 2. tenuis, piæ matris similis; quæ pro infundibulo perviæ.

Magnitudo, & *figura*, cum phaseolo parviter convenit, cum *appendice* in parte posteriore; major tamen comparate in bestiis quam homine, plerumque observari solet.

Substantia, glandulosa; ex albo rubens, ut plurimum duriuscula & firma; in appendice mollior & cinerea. (e)

Vasa; *Arteriæ*, a carotidibus: *venæ*, ad sinum proximos abeunt; *nervi*, a quinto pari: *ductus excretorius*, forte est *infundibulum* (S 272.), nam nullus alius notus.

Usus;

(a) Conf. *Vieussens* Neurograph. Tab. XVII. *Ortlob*. Hist. Part. p. 155. *Morgagn*. Adv. VI. p. 3. 7. 24. 25. *Santorini* p. 74. 75. in quibus vero naturam varie ludere observavit cum *Schelham*. Analect. anat. Diss. XIII. N. 9. cum quo ut & cum *Morgagn*. Adv. VI. p. 1. annotavi, inferiorem sinum non semper adesse. (b) *Varios exitus emissariorum* nomine describit *Santorini*. loc. cit.

(c) *Littre*. Hist. Acad. Reg. A. 1707. (d) *Ibid*.

(e) *Morgagn*. l. c. p. 31.

Ufus; Vulgo statuitur, quod imbibat pituitam ventriculorum cerebri, eamque postea foras mandet; (a) qui vero usus mihi haud verisimilis est; 1. quia glandularum officium non est aliquid fecernere: 2. quia ad illud simplex canalis suffecisset; 3. quia ejus substantia firma & dura illi usui inepta videtur. (b)

MEDULLA SPINALIS est medullæ oblongatæ continuatio, & quasi cauda cerebri; canali osseo vertebrarum inclusa, a capite ad nem ossis sacri se extendens. Hujus *figura* convenit cum longitudine spinæ dorsæ. *Gravitas* digitum circiter æquat, non tamen uque æqualis.

Membranae sive involucria ejus propria sunt sex. *Canalis osseus* 24. vertebrarum & ossis sacri. *Tunica ligamentosa*, robustissima, vertebrae intus colligans.

Tunica cellulosa, sive *adiposa*, in pinguibus pinguedinem continens, ad emolliendam priorem inserviens.

Dura mater; in parte superiori, robustior; in inferiori, tenuior, quæ medullam in spina laxè ambit, & antè cum corpore vertebrarum firmiter cohæret.

Arachnoidea: antè, arcte cum pia matre juncta, postè vero, libere quasi fluctuat.

Pia mater; ubique medullam spinalem ac nervos ejus ambit, & *divisionem ejus longitudinalem* ingreditur.

Fissura, ope fissuræ, in partem dexteram & sinistram, quasi in duas columnas, quæ tamen ad medium usque non penetrat.

Sanguifera; arteriæ & venæ, a vertebralibus illi, intercostalibus, & lumbaribus; quæ in

M 2

late-

) Conf. *Brunn.* de glandul. pituit. & *Littre* l. c.

) *Draskii* Anthropolog. p. 490.

latere vertebrarum, ubi nervi exeunt, ingiuntur, & miras anastomoses conficiunt.

Nervi spinales 31. vel 32. paria; quorum quilibet pluribus fibris ex anteriori & posteriori medullæ parte oritur, quæ dein coeunt, menbranis colligantur, & *nervos* constituunt.

Substantia; partis *superioris*, usque ad ultimam thoracis vertebra, eadem ac medullæ oblongatæ cerebri, sed paulo tenacior; *extus medullaris*; ut nervi commode inde egredi queant. *Intus cineracea*, ejusdem usus ac cineracea cerebri. Partis *inferioris* vero substantia, ab ultimis thoracis vertebra, usque ad finem ossis sacri, *fibrosa*, tenacissima, *cauda equina* dicta.

Usus; 1. prædictis partibus nervorum originem dare; qui præcipue per artus, partesque externas distribuuntur. 2. spiritus, sive liquidum nervæum, in usum horum nervorum præparare.

275 In *FACIE*, sive *parte capitis non capillata*, considerandæ partes

Continentes

Communes; ut 1. *epidermis*, 2. *cutis*; quorum colore & teneritate magnæ formositatis pars dependet; *pinguea* multa, quam sæpe hic tegit species *panniculi carnos*i, quoque pro pulchritudine.

Propriæ; ut *musculi*, frontales, nasi, labiorum, maxillæ inferioris, &c. de quibus in myologia: deinde *ossa*, quæ vid. in Osteologia.

Contentæ; ut organa quinque sensuum;

Visus.

Gustus.

Olfactus.

Auditus.

Tactus, qui vero rectius ad totam cutem pertinet.

VISUS ORGANA sunt duo OCULI. In quibus notanda

s, in elatiori faciei parte, ut remotius vivere queamus.

ura, demtis partibus externis, fere globosa. r, in homine, niger, fuscus, griseus, glaucus, ceruleus.

RTES, visui inservientes, oculum vero non constituentes;

I. SUPERCILIA: quæ sunt duo arcus pilosi, supra orbitas positi *ex pilis*, peculiaris magnitudinis & posituræ, tempora respicientis, *cute crassa*, & *pinguedine* subjecta, constructi; quo bene emineant. Pars naso vicina *caput*, opposita vero *cauda* dicitur; quæ *inserviunt* ad sudorem, a fronte defluentem, ab oculis arcendum, & ad lucem moderandam.

PALPEBRÆ, tegumenta sunt oculorum, in quovis oculo *duæ*, superior & inferior: ad quarum concursum conspiciuntur *anguli* sive *canthi* duo: interior, *major*; exterior, *minor*. Præterea circa has notanda

structura: ex epidermide, cute tenera, & cartilagine arciformi, *tarsus* dicta, quæ intus investiuntur membrana valde lubrica, sensili, periosteo & albugineæ oculi continua. (a)

ilia sunt pili rigidi in oris palpebrarum, singulariter inflexi, ad avertenda extraneæ & radios fortiores moderandos.

musculi, pro motu earum; de quibus videatur Myologia.

landulæ sebaceæ Meibomii, in palpebrarum interiori facie sitæ (b), liquidum pingue

M 3

sive

sive oleosum lecernentes, pro attritu pebrarum impediendo.

Caruncula lacrymalis, rubicunda, in angulo majori, in qua subinde glandulæ & conspiciuntur (a); itemque

Membrana semilunaris rubicunda, ibidem pro lacrymis in puncta lacrymalia dirigenda

Puncta duo lacrymalia, in angulo majori, fines tarforum, desinentia in ductus, cuncta dictos, *saccum lacrymalem*, *canalem lacrymalem*, & *nasum ipsam* (c), *Galeno* jam nota

Glandula lacrymalis, in orbita, supra angulum minorem sita, cum ductulis suis cretoreis sub palpebra superiori (d) emergentibus, facilius in bobus, quam hominibus demonstrandis.

Ufus: ad oculum tegendum, defendendum, corneam abstergendam, humorem ex glandulis crebro suo motu proliciendum, lucem fortiorem moderandam.

3. **MUSCULI** oculorum; pro motu eorum, in homine, quatuor recti: attollens, depressens, adductor, abductor.

duo obliqui: superior & inferior: de quibus vid. *Myologia*.

4. *Pinguedo*, inter hos multa pro usu vario. **PARTES PROPRIÆ**, ipsum oculi bulbum constituentes, sunt *tunicæ*, *humores*, *vasa*.

TUNICÆ oculorum sunt variae.

Albuginea, *adnata*, sive *conjunctiva*, in anteriore solum parte hæret, oculum orbitæ jungit, & vasis est repletissima.

Cornea, quæ pellucida, convexa, & in variis lamellas dividua.

Scler-

(a) Morgagn. Adv. I. §. 22. (b) Ibid.

(c) Steno de gland. oculor.

(d) Morgagn. Ibid. Tab. IV. fig. 1. Verheyen. Tab. fig. 9 a Bianchi ductus lacrym. & diff. nostra de fistula lacryma

sclerotica, dura, opaca, a cornea ad nervum opticum extensa: in qua posterius ita dicti *Aquæductus Nuckii* conspicui; qui vero ipsa vasa sanguifera sunt oculorum. (a)

choroidea, mox sub *sclerotica* sita; nigra in homine; cujus lamella interior *Ruyfchiana* vocatur; utraque vasculis distinctis repletissima, (b) & visus gratia nigrore imbuta est.

uvea, quæ pars anterior est *choroideæ*, perforata, colorata per corneam conspicienda, convexa; in qua notanda

facies anterior colorata, *Iris* dicta; tota vasculosa (c) varii coloris; unde varii illi oculorum colores in homine.

pupilla, sive foramen in homine rotundum, in medio fere *iridis* (d), quod ob varios usus dilatari & constringi potest.

facies posterior nigra; ubi, absterfo nigrore, videnda

Sphincter pupillæ ex fibris orbicularibus, pro contractione.

processus sive fibræ ciliares rectæ pro dilatatione pupillæ.

Ligamentum ciliare, annulare, pro motu vitrei & crystallini.

circulus arteriosus & venosus sub hoc, ex quibus vascula per *uveam*, *choroideam*, *ligamentum ciliare*, *humorem vitreum* & *crystallinum*, mirabiliter distribuuntur. (e).

Ductus nigri; recti, inter *processus* & *ligamentum*, spatium inter *uveam* & *corneam*, *camera oculi anterior* dictum; illud vero inter *uveam* & *crystallinum*, *camera po-*

M 4

ste-

-) Vid. Diss. nostra de Tunica choroid.
-) Ibid. & *Ruyfch.* Ep. XII. Tab. XVI. Thes. anat. II. I. fig. 6. *Hovius* de circul. humor. in oculo.
-) Ibid. (d) *Winslow.* in Hist. Acad. Reg. An. 1721.
-) *Ruyfch.* & *Hovius* locis cit.

| *terior*; quod minus est (*a*) aut fere m-
lum. (*b*)

| *Glandulæ* a variis in uvea statuuntur, qu-
vero dubiæ.

Retina, tunica tenerrima, albicans quasi muc-
sa, nervi optici per oculi fundum expansi-
oculi & visus pars primaria, cujus causa or-
nes reliquæ. (50*)

HUMORES in oculo vulgo tres numerantur
qui pellucidi, expansioni tunicarum & refra-
ctioni radiorum inservientes.

| *Aqueus* sive *albugineus* utramque oculi camerat-
quem locum oculi *vacuum* dixere veteres (*c*)
replens, in quo uvea libere quasi fluctuat
movetur, qui continuo, imo & vulnere
missus sponte reparatur. Vid. Nota (51*)

| *Vitreus*, vitro fuso vel gelatinæ pellucidissim-
similis, probabiliter ex *vesculis* sive *cellul-*
subtilissimis, humorem limpidissimum aqueum
continentibus, constans (*d*), partem poste-
riorem oculi replens, tunicæ retinæ parte poste-
riore ubique contiguus, eamque expandens

| *Crystallinus*, fere *lentiformis*, reliquis solidior
hinc rectius *corpus* vel *lens crystallina* dictus
foveæ vitrei ope tunicæ tenuissimæ inclusus
a ligamento ciliari, inter aqueum & vitreum
humorem, mox post pupillam, libere quasi
suspensus, ejusque ope mobilis, ex multis
lamellis pellucidis, vasculosis ad cæparum si-
militudinem constructus (*e*), sub cujus tamen
membrana sæpe aliquid humoris aquei con-
tinetur. (*f*)

Tu-

(*a*) Vid. scripta mea de Cataracta & Nor. (51*)

(*b*) Winslow. loc. cit.

(*c*) Celsus lib. VII. cap. VII.

(*d*) Hanc fabricam nos per conjecturam tantum nosse, re-
cte monet Morgagn. Adv. VI. p. 106. & Riolanum eam pri-
mum indicasse: postea vero Hovius l. c. pro certa descripsit.

(*e*) Hovius ibid. (*f*) Morgagn. ibid. p. 90. 91.

tunica subtilissima, arachnoides dicta, vasculo-
sa, crystallinum & vitreum corpus cingit
(a), ejusque auxilio lens crystallina sinui
 vitreo includitur, quia vero rupta, vel in-
 cisa, lens hæc facile excidit. *(b)*

SA SANGUIFERA, mirabili modo per in-
 ternas oculi partes distributa *(c)*; *Arteriæ* a
 carotidibus internis & externis, multis in lo-
 cis oculum adeuntes *(d)*, ultimo minutissimæ,
 lympham tenuissimam vehentes, *(52*)* qui-
 bus tunica & humores nutriuntur. *Venæ* vero
 partim ad sinus duræ matris, partim ad jugu-
 rem venam sanguinem revehunt.

lymphatica in oculo bubulo observavit *Val-*
lva.

vi, quamplurimi; I. *opticus*, retinam, or-
 ganum visus primum, conficiens, e latere
 nasi oculum ingrediens. *(53*)* Deinde per
 cerebri III. IV. ramus V. & VI. par muscu-
 lis, membranas, palpebras, glandulam, & sac-
 cum lacrymalem distribuuntur; de quibus vid.
ophthalmologia (§. 299.)

Primarium GUSTUS & LOQUELÆ OR-
ANUM est **LINGUA**: circa quod tamen
 multæ reliquæ oris partes, linguæ functioni fa-
 ulantes, considerandæ, nimirum *Glandulæ*
salivales, *Os hyoides*, *Gingivæ*, *Palatum*, *La-*
nga, *Uvula*, & *Tonsillæ*.

GLANDULÆ, SALIVAM SECERNEN-
tes, sunt

CAROTIDES, insignes glandulæ, utrinque
 una, inter aurem & maxillæ inferioris an-
 gulum sita, sæpe super magnam masseteris
 partem se extendens: ex qua notabilis du-
 ctus,

) *Ruyfch. Thes. II. Tab. I. fig. 8.*

) Nonnulli hancunicam negant: sed facile demonstrari.

t. (c) Ostenderunt hæc *Ruyfch. & Hovius l. c.*

) Vid. Diss. nostra de *tunica choroidæ*.

ctus, tres quasi transversos digitos longi calami straminei crassitie, multis radicibus prodit, qui a *Stenone* An. 1660. inventus (a) *Ductus salivalis Stenonianus*, sive superior, appellatur: transit inde transversim per musculum masseterem, per medium nae, ibidemque musculum buccinatorem membranam oris, juxta secundum vel tertium dentem molarem, perforat, & ostio suo salivam ibidem larga copia (54*) in os deponit.

MAXILLARES, quoque satis notabiles, trinque una, in interiori latere anguli maxillae inferioris sita: quarum quaelibet singularem ductum, ex variis radicibus coalitum priori paullo tenuiorem, sed saepe longiorem ab inventore, ut putant, *Varthonianum* (b) sive *salivalem inferiorem*, dictum, emittit qui sub lingua, juxta radicem frenuli, plerumque simplici, nunc etiam duplici, in quandoque triplici ostio (c) in os hiat.

SUBLINGUALES, duae oblongae, utrinque una, sub lingua positae: quas salivam in homine in *Varthonianos* ductus exonerare hucusque vulgo crediderunt. In vitulis peculiarem ductum, ex quavis prodeuntem, primo *Rivinus* (d), A. 1679. & deinde etiam *Bartholinus* in leone A. 1682. invenit (e) qui propterea *Ductus Rivinianus* vel *Bartholinianus* vocatus est. At in homine has glandulas parvis ductulis sive osculis, inter linguarum latera & gingivas utrinque in os hiat re, primus me docuit *Morgagnius* (f) quo etiam

(a) *Steno* Observ. anat.

(b) *Adenograph.* cap. XXI.

(c) *Ruysh.* Theat. anat. I. p. 25.

(d) *Dissert. de Dyspepsia* A. 1679. habita: & *Welfch* Tab. anat. 30. (e) *De ductu salivali novo*.

(f) *Advers.* VI. p. 130.

etiam inveni eosque, sicut a me reperti sunt, delineari curavi Tab. VII. fig. 33. conf. Not. (55*).

men linguae, cæcum alias appellatum, a *Colo* (a), *Morgagnio* (b) & me olim Tab. IV. fig. 20. delineatum, primus pro *ductu salivali* habuit *Vaterus* (c), multisque experimentis, quod cum glandulosa substantia circa basin linguae communicet, confirmavit: sed qua ratione hoc fiat, perspicue non demonstravit. *Cossvitzius* (d) vero hoc, & quomodo plures ductus per glandulas maxillares, & sublinguales excurrant, atque in linguae superficie loca excretionis varia habeant, ostendere voluit; hos autem, mea forte culpa, aut quia nature sæpe hic ludit, ita reperire non potui. At *men* nuper in cadavere virili, duos egregios ductus aliter se habentes, & in foramen illud effinentes, inveni, quos ut fuerunt, delineari curavi. Conf. Not. (56*) & Tab. VIII.

Fig. 34. 35.

glandulae duæ, utrinque una, in eodem cadavere, in genis, circa dentes molares posteriores maxillæ superioris, aliquot osculis excretoriis, & os hiantibus, a me observatæ sunt. Vid. Not. (57*) & Tab. VIII. fig. 36. 37.

glandula etiam, alias non observatus, in eodem cadavere, sub ossis occipitis apophysi anteriori, in suprema faucium parte occurrebat, satis amplius, qui pressus in fauces *liquidum mucosum* dabat. Vid. Not. (58*) & Tab. VIII.

Fig. 38.

glandulae præterea, *miliares & lenticulares* plures deprehenduntur per membranam oris, præcipue

(a) Anatom. sua Tab. 2.

(b) Advers. I. Tab. I. (c) Peculiari dissert. de *novo ductu salivali in lingua*, bis jam edita.

(d) Dissert. de *ductu salivali novo*.

cipue per labra, palatum, buccas, & linguam dispersæ; quæ pro situs diversitate, *linguales labiales, buccales, palatinæ, uvulares* &c. dici possunt.

Glandulæ Nuckianæ; in canibus utrinque iuxta oculum sitæ, *ductus* demittunt in os, procurrentem molarem penultimum maxillæ superioris (a); quæ vero in homine deficiunt.

279 OS HYOIDES, *Linguale* sive *Bicornæ* dictum respectu ossium in Osteologia (§. 106.) descriptum, ob nexum cum lingua, & usum, quem hic præstat, uberiores paullo hic requirit considerationem.

Cohæret linguae basi sive radici, ita ut inter haec & laryngem situm sit, & una cum lingua moveatur.

Connectitur ope ligamentorum cum lingua, larynge, & processibus capitis styloideis; interventu vero musculorum, tam cum partibus prædictis, quam cum maxilla, scapulis, clavicularibus, & sterno.

Musculorum habet quinque paria, quorum opus una cum lingua, cui maxime servit, variè movetur, qui vero videndi in Myologia.

Usus; 1. linguae firmam basin præbere, ejusque motui & deglutitioni inservire; 2. variis musculis punctum fixum dare.

280 LABRA, duo sunt, ex musculis potissimum constantia; extus, tegumenris universalibus; intus, membrana oris tecta; sub qua *glandulæ miliares, & lenticulares* tam in inferiori (b), quam in superiori (c) sitæ sunt.

Prolabia, epidermide denudata, & aqua aliquamdiu macerata, ostendunt papillas nerveas copio-

(a) Nuck Sialograph. p. 15. Tab. III. fig. 1. & 2.

(b) Cowper. Myotom. reform. fig. 4.

(c) Vid. Tab. nostr. VIII. fig. 36. dd.

copiosissimas (a): hinc adeo sensilia. Superius
brum sub septo nasi (b), inferius vero ad
dices dentium incisorum (c), quodvis pecu-
re ligamentum, quod *frenulum* dicitur, ha-
t, atque in loquela, bibendo, & manducan-
magnam nobis operam præstant.

GINGIVÆ, ex membrana oris communi,
perioftio maxillarum constant, quibus fir-
issime adhærent. Vasis instructæ sunt copio-
simis; hinc adeo rubent. Interveniunt tegeren-
s maxillis, firmandisque dentibus.

PALATUM, similem fere habet fabricam;
i vero adhuc copiosæ glandulæ, Fallopio jam
tæ, maxime in parte posteriori, prope uvu-
m, ubi veli instar pendulum est, & *velum*
e *claustrum palati* vocatur, accedunt, liqui-
m mucosum, pro faucibus lubricandis, &
glutitione facilitanda, per oscula quamplu-
ma (d) excernentes.

terum etiam hæc membrana ossa palati
corruptione defendit, & *claustro* suo, ne de-
ntienda in nares facile irruant, præcavet.

UVULA, Celso *uva*, aliis *columella*, est
rs teres, aut fere *conica*, inversa, in parte
steriori palati, supra linguæ radicem, inter
os quasi *arcus* palati, & utramque tonsillam,
velo sive *claustro palatino* pendula; (e) in
a notanda

Figura; cum extremo articulo digiti infan-
tis fere conveniens.

Substantia; musculosa; membrana oris glan-
dulosa cincta.

Mus-

0 Ruysch. Thes. anat. III. pag. 26. Tab. IV. fig. 1.

0 & Thes. VII. Tab. 2. fig. 5.

0 Bidloo Tab. XII.

0 Morgagn. Adv. I. Num. 5.

0 Vid. Tab. nostra VIII. fig. 36. bb.

0 Ephem. Nat. Cur. cen. III. & IV. obs. 190 fig. 1.

0 Hist. Acad. Reg. A. 1718. p. 390. fig. 1. & 2.

Musculi, a quibus varie movetur. Vid. Myologia.

Ligamenta membranacea duo, quibus *uvula* palati ossibus cohæret.

Uſus; nondum adeo perspicuus; *loquelæ* men elegantius formandæ inservire videtur & ne potus in deglutitione in nares irruat aliquo modo præcavet. In bestiis autem conficit. (a)

284 **TONSILLÆ**, vulgo *Amygdalæ*, sunt duæ notabiles glandulæ, amygdalas sæpe representantes, utrinque ad fauces juxta uvulam sitæ, humorem lubricum, pro faucibus lubricandis, secernentes, & per varia confusua, irregularia foraminula, excernentes. (b)

Harum vero omnium partium, tonsillarum uvulæ, gingivarum, labrorum, palati, glandularum salivalium omnium arteriæ, carotidibus externis, venæ, a jugularibus nervi, potissimum a pari quinto.

286 **LINGUA** ipsa, nobilissimum illud organum animæ nostræ optimus interpret, jam examinanda; cujus situs, numerus, & magnitudo omnibus nota sunt; sed notanda

Figura: quæ aliquo modo pyramidalis, se plana; ejusque anterior, mobilior, & activa pars *apex*; posterior vero & crassior *basis* sive *radix* dicitur.

Connexio: cum osse hyoide, maxilla inferiori, processu styloide, pharynge & larynge, aliisque partibus vicinis, per musculos aut membranas.

Ligamenta: 1. *frænulum* habet sub apice, in cuius radice utrinque ductus salivales Wartho-

(a) Ab uvula lue venerea ablata, in aliquibus vocem raucam, in aliis nihil vitii aut impedimenti illatum vidi.

(b) De *Tonsillis* legi meretur diss. *Vidmanni*, & *Ephem. Nat. Cur.* loco antea citato.

thoniani os ingrediuntur; 2. *membranaceum* ligamentum, quibus maxillæ inferiori, ossi hyoidi, & laryngi, speciatim epiglottidi jungitur.

Linea longitudinalis, in medio *mediana* dicta, linguam æqualiter quasi in duas partes dividens.

Substantia; potissimum ex musculis teneris, nerveisque involucris sive membranis, pinguedine, ut & ex glandulis, ac vasis notabilibus componitur.

Glandulæ: præter sublinguales, (§. 278.) in superiori, & posteriori parte, quam plurimæ miliares: quas in nonnullis ad lentis magnitudinem, osculis in medio perforatis, aliquoties vidi. (a)

Foramen alias *cæcum* dictum in superiori, & posteriori parte linguæ, inter has glandulas sæpe conspicuum, usus alias incogniti (b); jam vero, si adest, *productu salivæ* habetur, (§. 278.)

Arteriæ: magnæ & multæ, a carotidibus externis. (c)

Venæ: sunt rami jugularium externarum: quarum ex, quæ sub apice conspiciuntur, *venæ raninæ* audiunt, & quandoque, præsertim in faucium malis, incidi solent.

Nervi, valde insignes, duo rami a pari quinto, qui vulgo gusti: duo a pari novo, qui motui inservire creduntur. *Boerhaavius* contra, hos gustui; illos motui famulari sentit. (d) Forte simul & motui & gustui famulantur.

Lim-

Vid. etiam *Morgagn.* Advers. I. Tab. I.

Vid. ejus delineatio in *Collins* Anatom. Tab. 2. *Mor-*

loc. cit. Fig. nost. Tab. 4. fig. 20.

Ruyfch. Thes. anat. I. Tab. 3. fig. 4. pag. 45.

Instit. Med. cap. de *Gustu*.

Lymphatica vasa & Coschvitz (a) & Ductus salivarii (b) delineant.

Involucra tunicæ sive membranæ tres, linguam substantiam musculosam cingentes.

1. & extrema, continua cum membrana communi, vaginulas efformat, quasi pyramidales, & globosas, porosas, pro papillis nerveis tertiæ membranæ insculptis. (c)

2. sive media, reticularis Malpighii dicitur, ex eleganti rete constans, papillas nervorum per foraminula sua transmittens, & in superiori tantum parte conspicitur. Vid. fig. nostra 20. Difficilius tamen in homine, quam bestiis videnda.

3. papillaris nervosa, in eodem quoque tantum loco, continens papillas nervorum diversæ figuræ, maxime tamen

fungosas, sive capitatas, cornubus lingularum, vel fungis similes, quæ foraminibus præditæ emitti & retrahi possunt.

pyramidales, majores & minores, quæ utroque arcuatas. (d) Utræque vero papillæ oriuntur ex hac intima tunica & nervis linguæ, transeunt foraminibus tunicæ reticularis, & terminantur in vaginulis exterioris, constituuntque primum organum gustus.

Musculi: quorum præter eos, quos os hyoides habet, quatuor sunt paria, de quibus in Myologia: super quos vero multæ alie huc aliæ musculosæ inextricabiles occurrunt fibræ: (e) quibus lingua contrahitur, expanditur, protrahitur, retrahitur, ceterisque

(a) Diff. de Ductu salivari novis.

(b) Diff. de Ductu salivari. novo.

(c) Ruysch. Thes. anat. I. Tab. IV. fig. 6. Morgagni Adv. I. Tab. I. (d) Ruysch. l. c.

(e) Vid. Malpighius, Fracassatus, & Steno de Lingua.

rique omnes mirabiles linguæ motus perficiuntur.

Ufus: *Gustus & sermonis instrumentum est præcipuum: manducationi tamen quoque, suctioni, deglutitioni, expuitioni &c. mirabiliter etiam inservit. (a)*

6 ORGANUM ODORATUS NASUS est, cujus *situs & numerus* nota sunt omnibus; notanda vero

gnitudo: vel mediocris, maxima, vel minima. gura; elegans, vel turpis; aquilinus, simus, vel depressus.

visio; in partes

externas; ad quas referuntur

Dorsum, radix, spina, orbiculus, alæ vel pinnæ.

Septum, nasum in duas cavitates dividens nares dictas.

Pili, vibrissæ a nonnullis dicti, muci efflu- vium involuntarium, illapsumque infe- storum in fauces impediennes.

Tegumenta communia, epidermis, cutis, pin- guedo.

Pars superior rigida est, & ex ossibus constat.

Pars inferior, flexilis; ex variis cartilaginibus, musculis, & membranis componitur. De musculis vid. Myologia.

internas, ut sunt

Ossa: quorum multa ad nasi fabricam con- currunt, ut ossa nasi, maxillaria, cri- briforme, spongiosa, frontale, lacryma- lia, palati, vomer, sphenoides.

Cartilagines; partem inferiorem nasi consti- tuentes, membranis colligatæ, ut nasus

N

flexi-

(a) Observatio notabilis de puella sine lingua nata, o- s tamen linguæ functiones perficiente, refertur a *Fuossien* Acad. Reg. A. 1718.

flexilis sit. Earum prima anteriorem septi-
narium partem constituit; deinde in qua
vis ala duæ satis magnæ existunt, quibus
nunc duæ, nunc tres, nunc plures minores
interponuntur. (a)

Septi narium structura; in parte anteriori &
inferiori cartilagineum est; in posteriori
vero & superiori osseum; quæ partes mem-
branis robustis conjunguntur.

Nares f. Meatus, duo ad fauces, pro aeris
& muci transitu.

Sinus; ossum maxillarium, frontales, sphenoi-
noidei, cellulæque ossis ethmoidis; cavum
nasi, atque sic simul expansione membra-
næ pituitariæ & odoratum augentes. (b)

Inæqualitates, sive eminentiæ ossium turbi-
natorum sive spongiosorum in cavo narium
partim eidem usui inservientes, partim il-
lapsum insectorum & aeris frigidioris in
fauces impediennes.

Membrana mollis rubra valde, vasculosa, na-
res, sinus, & inæqualitates earum inve-
stiens, *mucosa* sive *pituitaria Schneideri* di-
cta (c), odoratus & secretionis muci or-
ganum.

Oscula ductuum excretoriorum in hac mem-
brana, præcipue in capite bubulo, optime
sunt conspicua. (d)

Glandulæ, sub hac membrana exiguæ (e)
præsertim in medio septi (f) observan-
tur, muci quoque secretioni destinatæ.

Arte-

(a) *Ruyfch. Ep. VIII. fig. 4. DraK. Anthropol. Tab. XVII. Santorin. V. 1.*

(b) *Delineati in Palfni Osteol. Tab. I. & II. DraK. Tab. XVIII.*

(c) *De Catharris.*

(d) *Ruyfch. epist. VIII. Tab. 9. f. 7. (e) Ibid.*

(f) *Morgagn. Adv. VI. Santorin. p. 91.*

Arteriæ, a carotidibus copiosissimæ per illam membranam sunt dispersæ (a), quæ & secretioni muci inserviunt.

Venæ, a jugularibus, pro supervacuo sanguine reducendo.

Nervi, per pituitariam dispersi, sunt 1. *olfactorii*, satis insignes, minores tamen, quam in bestiis: qui olfactus organum constituere (b); 2. *rami paris quinti*, qui in *villes* desinentes hunc usum præstare ab aliis creduntur. (c)

Membrana tenuis sub pituitaria (d), ossa & cartilagine investiens: in his *perichondrium*, in illis *periostium* dicta.

Foramina in naribus notanda.

1. *ad sinus*, frontales, maxillares, sphenoides, & cellulas ossis ethmoidis, pro communicatione eorum cum naribus.
2. *oscula ductuum lacrymalium*, utrinque in nares hiantia, optime delineata a Morgagno. (e)
3. *ductus ex nare utraque ad os*, mox post dentes incisores maxillæ superioris, in scheleto quidem aperti; sed neque in vivis, neque in cadaveribus in os hiant; at membrana palati exacte clausi sunt: ideoque & usus vulgo adscriptus, ac si mucum ex naribus ad os transmitterent, nullus esse videtur. (59*)

nasi: organum esse odoratus; respirationi voci inservire; mucum secernere; diverticulum esse humoris oculorum; ad gravitatem, pulchritudinem multum conferre. Sed neque aerem, neque pulveres naribus attractos

N 2

ad

) *Ruyseb.* l. c. fig. 6.

) *Schlevoigt.* id negat, eosque tantum pro cerebri emiss. haberi vult diff. de Process. cerebri mamill. &c.

) *Santorin.* obs. an. p. 92.

) *Ruyseb.* l. c. fig. 8. (e) *Advers.* VI.

ad cerebrum transmittit. An vero pituita vel sanguinem e cerebro emittat, ut veteres & Schlevogtius volunt, adhuc dubium est.

287 ORGANUM AUDITUS AURES sunt quarum *situs*, *numerus*. & *figura* externa, omnibus nota sunt. Dividi solet in tres partes, *extimam*, *mediam*, & *intimam*. Extima constituit

AURICULA, quæ rectius *auris externa* vocatur in qua variæ eminentiæ, excavationes, aliaque notanda: ut

[*Pinna* & *Lobulus*; *Helix* & *Anthelix*; *Tragus* & *Antitragus*.

Scapula: quæ est cavitas inter helicem & anthelicem posterior.

Concha: quæ major excavatio ante meatum auditorium, ubi

Glandulæ sebaceæ Valsalvæ (a), quæ folliculi cutanei.

Substantia ex tegumentis communibus & cartilagine constat.

Musculi; in homine valde exigui, & sæpe vix conspicui; nunc duo, nunc tres, nunc plures; *superior*, *posterior*, & *anterior*, a situ dicendi, quorum usus in movenda aure aut nullus, aut certe valde exiguus. Tensioni tamen auris, quando accuratius audire volumus, inservire forte possunt.

[*Ligamentum*, quo ejus pars posterior ossi petroso jungitur. (b)

Meatus auditorius; in quo notanda

Progressus tortuosus & obliquus, versus anteriora. (c)

[*Substantia*; partim ossea, partim cartilaginea, ex car-

(a) Tr de Aure hum.

(b) Duvernoy de Org. Aud. Tab. III. f. 12.

(c) Valsalva Tab. III. f. 1. & 3.

ex cartilaginibus quasi fractis, tunica elastica obductis, composita.

Membrana, internam partem investiens, cuti continua.

Glandulae flavae, exiguae, ceruminosae dictae *Duvernei* (a) inconvexa hujus membranae parte, ad medietatem hujus meatus sitae, *cerumen*, quod flavum & amarum est, secernentes, & in meatum auditorium, pro usu vario, deponentes.

Corpus reticulare Valsalvae, in cujus arcolis *glandulae ceruminosae* contentae conspiciuntur. (b)

Pili in meatu auditorio, eorumque utilitas. *us auris externae*; ad sonum, quasi per tubam acusticam melius suscipiendum, atque sic ad accuratius audiendum. (c)

media pars, **TYMPANUM** dicitur: in quo notanda,

Membrana tympani, in fine meatus auditorii posita; cujus

Situs; non perpendicularis, sed valde obliquus introrsum.

Figura; elliptica; non plana, sed concava.

Connexio; in circumferentia, cum annulo osseo in infantibus, qui postea in meatum auditorium osseum mutatur; in medio, cum officulo *malleolus* dicto.

Substantia; membranacea, tenuis, duplici vel triplici lamella constans: vasis sanguiferis, a *Ruyschio* detectis, repleta. (d)

Foramen exiguum, obliquum, nonnulli post

N 3

Ri-

a) L. C. Tab. III. f. 1. & 3.

b) L. c. Tab. III. f. 1. & 2.

c) *Schelhamm.* affirmat, se primum docuisse, (Tr. de *ditu*) auditum fieri per radios sonoros, ut visio per radios visorios, l. c. N. 59.

d) *Ruysch.* Epist. VIII. pag. 12. fig. 9.

Rivinum (a) in hac membrana naturaliter statuunt (b); per quod quidam fumum tabaci, ore attractum, transmittunt. Conf. (60*)
Cavitas tympani, ossea, minor in homine quam vitulis; ubi

Periosteum subtilissimum, vasis sanguiferis repletissimum. (c)

Corda tympani; quæ nervulus est, ex ramuli paris quinti & septimi anastomosi conflatus, membranæ tympani instar chordæ subtentus, usus non satis perspecti.

Officula auditus, tria, periosteio obducta (d), *malleus*, *incus*, & *stapes*, de quibus jam in Osteologia §. 68. Conf. N. (61.*)

Officulorum horum cohæsiō; *Mallei manubrium* membranæ tympani adhæret; capitulum vero ejus per *ginglymum corpori incudis* articulatur; atque hujus crus longius cum capite *stapedis* per *arthrodiam*; sed *stapes* basi sua fenestræ ovali ope tenuis membranulæ innæret.

Musculi mallei, duo; *internus* & *externus*; *stapedis* unus. (e)

Fenestræ duæ { *ovalis*, ad vestibulum ducit;
 cui *stapes* insistit.
rotunda, ad cochleam, membrana clausa.

Foramina, præter modo dictas fenestras, adhuc duo;

Alterum, per *tubam* sive *ductum Eustachii*, (Aristoteli jam notum, (f) mox post tonsillas in os desinit; qui ductus partim osseus, partim membranaceus, partim

(a) *WVelsch*. Tab. anat. LIX.

(b) *Valsalva* l. c. Cap. II. *Drax*. Anthropol. p. 567.

(c) *Ruyseh*. Epist. VIII. T. 9. f. 10. (d) *Ibid.* f. 1.

(e) De quibus plura in *Myologia*.

(f) *Morgagn*. epist. anat. 1. n. 93.

tim cartilagineus, auri cum ore communicationem præbet. (a)

alterum tendit ad *cellulas processus mastoidei*.

ma, sive *tertia auris pars*, LABYRINTHUS dicitur, in qua

vestibulum: quod cavitas est mediam labyrinthi partem constituens: cujus introitum fenestra ovalis constituit.

canales tres semicirculares: maximus, medius, & minimus, *Celso* non incogniti; quinque orificiis in vestibulum hiantes; bene delineati post varios a *Du-Verneo* & *Valsalva*, loc. citatis.

cochlea est pars, canalibus his opposita, cochleæ similis; spiras duas cum dimidia perficiens: in qua *nucleus*, & *canalis*, a *lamina spirali Eustachii* in duos divisus, quorum alter, in vestibulum hians, *scala vestibuli* vocatur;

alter, per fenestram rotundam in cavum tympani desinens, *scala tympani* dicitur. (b)
membrana subtilissima, per omnia labyrinthica distributa, ab expansione nervi auditorii orta, *primaria auditus organi pars*, sicuti retina in oculo; quæ expansiones membranaceæ, in ove & aquila melius, quam homine conspiciendæ, a *Valsalva* *zonæ sonoræ* dicuntur. (c)

canalis nervi auditorii

1. *communis*, amplior, in quo foraminula ad labyrinthum.
2. *proprius*, angustior, at longior, *Aquæductus Fallopii* dictus, desinens partim in cranii cavum, partim inter apophysem

N 4

sty.

) Vid. Tab. nostr. VIII. fig. 38. c. d. cc.

) *Valsalva* Tract. de Aure humana.

) Ibid. Tab. VIII. f. 8. 9.

styloideam & mastoideam infra cranium. (a)
Nervi; 1. a pari auditorio: quod duplici consistit
 ramo, molli & duro. Mollis per labyrinthum
 distribuitur (b): durus vero impertit ramulo
 duræ matri, tympano, & auri externæ. 2.
 tertio pari vertebraliū colli, pro aure ex-
 terna.

Arteriæ, a carotidibus externis & internis.

Venæ, partim ad jugulares, partim ad sinus du-
 ræ matris abeunt.

288 **TACTUS ORGANUM** constituunt *papillæ cutaneæ*; quæ sunt extremitates nervorum
 cutis villosæ in superficie ejus ubique, maximè
 tamen in *volis manuum, plantis pedum*, ac po-
 tissimum in *apicibus digitorum*, ubi sensus tactus
 est accuratissimus, elevatæ, & cuticula tectæ
 sicuti jam supra, ubi de cute egimus, indicatum
 est. Harum ab objectis commotione, sensus ta-
 ctus in nobis excitatur, & qualitates tactiles
 asperum, leve, humidum, siccum, calidum, fri-
 gidum, durum, & molle &c. nobis manifestantur.

289 Cum hoc sensu quam maxime convenit
sensus gustus; in quo *papillæ nerveæ in lingua*,
 a corporibus sapidis affectæ, varias *saporum* dif-
 ferentias excitant. Ita, eodem fere modo, *ner-
 vi, in membrana narium pituitaria*, ut *papillæ*
dispersi odores varios percipiunt; &c. sic, ut sen-
 sus tactus communissimus sit, & reliqui sensus
 ejus quasi diversæ tantum species.

DE ANGIOLOGIA.

290 **ANGIOLOGIA** proprie vocari solet
 doctrina de vasis sanguiferis, *arteriis* scilicet
 & *venis*.

291 AR-

(a) Ibid. Tab. VII. f. 3. 4.

(b) Ibid. Tab. VIII. fig. 8. 9. Singularis admodum re-
 pra-

1. **ARTERIA** est canalis pulsans, elasticus, fusus, sanguinem a corde ad omnes corporis partes deferens; ubi notanda

numerus: *duæ* in toto corpore, *pulmonalis*, & *aorta* sive *arteria magna*: ex quibus omnes reliquæ, tanquam rami.

Figura, *conoides*: ab ampliori diametro in angustiore pergens. Circa extrema tamen ramuli tandem fiunt *canales cylindrici*, & mutantur modo in *plexus reticulares*, modo in *penicillos*, *spirulas*, *glomos* &c. & tandem in *vasa serosa*, *venas*, *vasa lymphatica*, aut *ductus excretorios* desinunt.

Constructura *membranacea*: ex membranis quinque composita,

1. *vasculosa*, 2. *cellulosa*, 3. *tendinea*, 4. *musciculosa*, (ex fibris annularibus quam plurimis constans) 5. *nervæa*. Conf. Not. (63*)

2. **ARTERIA PULMONALIS**, e dextro ventriculo oriunda primo in ramum dextrum & sinistrum, deinde infinitis ramis per *foramen pulmonem* distribuitur.

3. **AORTA**, unico trunco e sinistro cordis ventriculo egressa, *supra valvulas suas semilunares*, mox ad cor, ejusque auriculas reflectit duas *arcuatas*, *coronariæ cordis* dictas; dein vero *truncus* ad similitudinem *arcus inflexus*, emittit.

4. **ARTERIE ASCENDENTES**, tres in homine, (64*) unde proveniunt

Carotides duæ, *dextra* & *sinistra*: quarum quælibet circa laryngem mire sæpius hinc inde flexitur (65*), & dividitur in

Carotidem externam: quæ ramos dat laryngi, pharyngi, musculis ossis hyoidis, maxillis,

hujus nervi per cochleam, vestibulum, & canales semicirculares, in forma filamenti, a *Simoncellio* & *Mistichel* dicitur, in *Epistol. Des Nerves* p. 208. qui vero, an veritate conveniat, oculatioribus me dijudicandum relictum. Vid. Not. Num. (62.)*

lis, linguæ, labris, ori, naso, oculis, auribus, temporibus, omnibusque partibus externis capitis.

Carotidem internam: quæ cranium intrat, multis flexibus & anastomosibus cerebri ejusque membranas, oculos, nares, & aures internas adit.

Subclaviæ duæ: ex quibus utrinque procedit arteria

Vertebralis, quæ ad cerebrum, intra foramina, apophysibus transversis vertebrarum insculpta, (96*) ascendentes, miris praefectis ambagibus cranium subeunt, junguntur carotidibus, constituunt *cervicalem* etiam (a), reflectunt *spinalem* (b), & ceteris illis toti cerebro prospiciunt.

Musculares colli, variae, incerti numeri, sunt musculos colli.

Scapularis externa, per partes scapulæ et sternas.

Intercostales superiores, per costas duas, tres, & quatuor superiores. (c)

Mediastina, per mediastinum, thymum, pericardium.

Diaphragmatica superior, inter mediastinum ad diaphragma descendit, & dictis modis partibus sæpe ramulos largitur: praesertim si peculiaris mediastina, ut sæpe fit, deest.

Mammaria; sub sterno ad abdomen usque descendens, mammis, musculis variis thoracis, & abdominis, imo & subinde mediastino & diaphragmati prospicit.

Axillaris; ex qua progerminat

Scapularis interna, per partes ossi scapulae subjectas.

The-

(a) Ridley Anat. cerebr. fig. 1. g.

(b) Ibidem.

(c) Walthers, de Vasc. vertebral.

Thoracica, s. *mammaria externa*, per externas thoracis partes.

Brachialis, ad flexuram cubiti plerumque uno trunco descendit, ramulos solum impertiens brachio. Deinde in *radicem* ac *cubitæam* dividitur, hæque per manum ac digitos distribuuntur. Quandoque etiam brachialis in suprema brachii parte, quandoque in media jam in ramos dividitur; variusque naturæ lusus, respectu hujus divisionis, in diversis hic observatur. N. (66 **)

NCUS vero **DESCENDENS** aortæ nominis per thoracem & abdomen, usque ad os hominis, descendit amplior ut plurimum in femine, quam viris; & ex eo oriuntur *brachialis Ruyschii*, quæ tamen sæpius ex intercostalibus. (a)

intercostales inferiores ad omnes costas, duabus vel tribus superioribus haud raro exceptis, medullam in spina, musculosque dorsi & dominis.

phagææ ad oesophagum, a paucis olim notæ. (67 *)

phragmaticæ inferiores; quæ quandoque ex *iliaca*.

iliaca, mox sub diaphragmate prodit, (b) huius ramus

exter emittit *gastricas* & *epiploicas dexteras*, *pancreaticam*, *duodenam*, *hepaticas*, & *cysticas gemellas*;

inter edit *gastricas* & *epiploicas sinistras*, *gastroepiploicas*, *magnam splenicam*, & hæc *pancreati* quandoque colo ramos dat. (c)

Me-

Ruysch. dilucid. Valvul. lymphat. p. 61. & Epist. VI. Valcherus novam hujus arteriæ descriptionem dedit (c) Ibid.

Mesenterica superior, per mesenterium & itina tenuia.

Renales sive *emulgentes*, utrinque modo plex, modo duplex.

Atrabiliaræ, ad capsulas atrabiliarias abeunt.

Adiposæ, ad membranam renum adipsam.

Spermaticæ, in viris, ad testes; in femina præcipue ad uterum.

Mesenterica inferior, ad intestina crassa: cuius ramus ad intestinum rectum abiens, *hæmorrhoidalis interna* audit.

Lumbares, variæ, ad musculos lumborum dominis, & vicina.

Sacra, si adest, per medium ossis sacri descendit ad pelvim; quandoque vero una quavis iliaca prodit.

Iliacæ, duæ: quarum quælibet rursus in duos dividitur ramos.

Internum, vulgo *hypogastricum*: qui prociat vesicæ, intestino recto, (ubi *hæmorrhoidalis externa* audit) partibus genitibus, natibus, partibusque vicinis.

Externus emittit *umbilicalem* (a), *epigastricam*, per musculum rectum abdominis que ad mammariam excurrentem; *pudendam*, ad cutem pudendorum; & denique *Cruralem*, venæ incumbentem (b); quæ dividitur in *externam* minorem, per anteriorem femoris partem; & *internam* majorem, unde *poplitææ*, *furales*, ac *tibiales*, & quæ per extremum pedem quæ plurimæ, sine nominibus, dividuntur.

294 VENA est vas, sanguinem a partibus a cor

(a) Cujus vero ortus variat.

(b) Quod chirurgis observandum. Morgagn. Adv. II. 8

revehens. Venarum tres sunt primariæ:
monalis, cava, & vena portæ.

VENA PULMONALIS a sinistra cordis
 cula prodit; ubi primo sinum format, de-
 e mox in quatuor, postea in innumeros ra-
 s, per pulmones distributos dividitur. (a)

VENA CAVA ampliori sinu a dextra au-
 la provenit, ibique *venam coronariam cor-*
mittit; dein dividitur in

TRUNCUM SUPERIOREM, latere dextro
 m; ex quo

vena azygos (b), & ex hac intercostales at-
que œsophagæ.

vena bronchialis, quæ & quandoque ex ipsa
azygos provenit, quandoque ex intercosta-
 li; sæpe vero deficit.

mediastina, comes arteriæ mediastinæ.

diaphragmatica superior, comes suæ arteriæ.
subclaviæ; (quarum sinistra longior dextra)
 & quibus utrinque

jugularis externa, pro externis capitis par-
 tibus; a quibus varia nomina recipit, ut
frontalis, temporalis, occipitalis, angula-
ris &c.

jugularis externa, laryngi, pharyngi, mus-
 culis ossis hyoidis, linguæ (quæ sub api-
 ce *Raninæ* vocantur) partibusque vicinis
 ramos dat. Truncus vero terminatur in
diverticulum sive *sacculum jugularem*; & san-
 guinem e duræ matris sinubus & cerebro
 reducit.

vertebralis, in apophysibus transversis verte-
 brarum colli ascendit ad cranium. (68*)

& adit sinum lateralem, si foramen post
 processum condyloid. apertum.

Inter-

Figura vid. ap. *DraK.* Tab. XIII.

De hac doctissime egit *Lancifus*. Vid. *Morgagn*, Ad.
 &c. seq.

Intercostales superiores, per duas, tresve costas supremas.

Mammaria, arteriæ mammariæ sociæ.

Musculares, superiores & inferiores.

Scapulares, externæ, & internæ, ac thoracicæ externæ.

Axillaris, cujus ramus exterior, *Cephalica* dictus, in exteriori brachii latere, versus pollicem, extenditur; interior, *Basilica* nuncupatus, in brachio dextro *Hepatica* in sinistro *Splenica* vocatur. *Mediana* ex præcedentium concursu in flexura cubiti. *Salvatella* vero ea dicitur vena, quæ per dorsum manus versus digitum auricularem excurrit.

TRUNCUM INFERIOREM, cum *valvula Eustachii*: (69*) qui in thorace brevissimus vix transversum digitum longus, prope hepaticas singulares inflexiones patitur, a recentioribus neglectus, a *Vesalio* vero, & adhuc melius a *Eustachio* Tab. XXV. ut *Morgagnius* docet, (a) delineatus; ex quo venæ

Diaphragmaticæ, sive *phrenicæ inferiores*.

Hepaticæ, magni & multi rami, per hepar distributi.

Renales, ex quarum sinistra, *spermatica sinistra* & *Atrabiliarie* & *adiposæ*, quoque sæpe ex renalibus.

Spermatica deinde *dextra* & *lumbares* variæ.

Sacra, quæ quandoque duplex reperitur.

Iliacæ, ex quibus utrinque

Hypogastrica: a qua rami abeunt ad intestinum rectum & anum, *Hæmorrhoidales externæ* dictæ; alii ad vesicam, partes genitales, nares, musculosque vicinos.

Epigastricæ, *Pudendæ*, & *Musculares*; arteriarum ejusdem nominis sociæ.

Cruralis, per pedem excurrent; cujus ramus inter-

(a) Epist. anatom. I. pag. 15.

internus juxta malleolum internum, *Saphæna*; *externus*, circa genu, *Poplitæa*; in suris, *Suralis*; & circa pollices pedis, *Cephalica*, chirurgis nostris dici solet.

VENA PORTÆ, arbori similis est (a);

jus

edices (seu rami inferiores) dividuntur in dextrum, a quo omnes venæ *Mesaraicæ intestinorum*, *Hæmorrhoidalis interna*, & *Epiploicæ dextræ*.

sinistrum, quæ *Vena Splenica* dicitur, a qua *Gastricæ* varix, *Coronariam* ventriculi constituentes.

Vasa brevia, *Epiploicæ*, & *Gastro-epiploicæ*. *Pancreaticæ*, & quandoque *Hæmorrhoidalis interna*.

Truncus, hepar adiens, dat *Cysticas*, *Gastricam dextram*, *Duodenam*, & hæc sæpe *Pancreaticam*.

Rami; ubi truncus explicari incipit, in hepate *Sinum portæ* constituit, deinde innumeris ramis per solum hepar distribuitur.

Truncus; qui idem esse videtur, ac venæ azygos, nimirum pondus sanguinis in vena cava ascendens sic imminuatur, & reditus ejus sive refluxus ad cor facilitetur.

Structura; constant venæ maxime ex tunicis *membranacea*, *vasculosa*, & *musculosa*, sed longitudo tenuioribus, quam arteriæ. *Valvulæ semilunares* in ramis quibusdam venæ cavæ, nullæ in vena portæ aut pulmonali, existunt, circumfluunt sanguinis succurrentes.

NERVI, sunt partes teretes, albicantes, tumque fibrosæ, sive ex filamentis compositæ, ortæ vel e *cerebro*, aut potius *medulla oblongata* in cranio; vel e *medulla* in spina,

na, atque ab his ad omnes corporis partes extendens. (70*)

Dividi solent in Nervos cerebri, & in Nervos medullæ spinalis.

Nervorum cerebri novem tantum numeramus; (S. 272.)

I. OLFACTORIUM, per os cribrosum membranam narium adiens. Conf. quæ in fine (S. 287.) de hoc pari dicta sunt.

II. OPTICUM, tunicam retinam oculi efformat.

III. OCULORUM MOTORIUM, prope orbitam in sex ramos divisum est, quorum 1. homine abigit ad elevatorem palpebræ, 2. elevatorem oculi, 3. ad depressorem, 4. adducentem, 5. ad obliquum inferiorem, in oculi tunicas. In bestiis vero alio modo distribuitur.

IV. PATHETICUM, *Villifio* dictum, *Euphorbio* jam notum, valde tenue, musculum oculi trochlearem adit.

V. GUSTATORIUM, perquam magnum, in cranio, mox sub dura matre, in tres insignes ramos dividitur; quorum

1. & superior, *Ophthalmicus* dicitur; variis oculi partibus, palpebris, musculis frontis & nasi, tegumentisque faciei prospicit.
2. *Maxillaris superior* dici potest, quia (potius quam per foramen rotundum cranio egreditur) per omnes maxillæ superioris partes, labra, nasum, palatum, uvulam, gingivam & dentes distribuitur. Attamen ramulus quoque ad aurem reflectit; qui ramulo primi paris junctus, *chordam tympani* constituit. Præterea surculum unum aut duos adhuc in cranio emittit; qui cum ramulo primi paris sexti principium quandoque Nervorum *intercostalis* constituunt.

3. *Maxillaris inferior* vocari potest, quia (egres-

(egressus per foramen ovale cranii) maxillæ inferioris partibus, dentibus, & in primis etiam linguæ prospicit; unde totum par *Gustatorii* nomen accepit.

I. **ABDUCENS** ramulum emittit, pro *Nervi intercostalis* (V. 2.) constitutione; tota vero reliqua pars potissimum ad musculum oculi *abducentem* abit.

Intercostales autem ex ramulis duorum præcedentium, vel ex solo sexto, ortum, per canalem carotidis internæ cranio exit, & juxta par VIII. per collum, hinc juxta spinam dorsi per thoracem & abdomen, usque ad pelvim descendit, ubique ex spina ramulos accipiens, variofque *plexus*, situ variantes, & *ganglia* (a) constituens, ramos dat fere omnibus in collo, thorace, & abdomine contentis partibus.

II. **AUDITORIUM**; duobus oritur truncis, quorum alter *portio dura*, alter *portio mollis* audit. Hæc foramen ossis petrosi intrat, ac per varia foraminula labyrinthum adit, (S. 69.) per omnes ejus partes expanditur, & *primariam organi auditus partem* constituit. *Portio* vero *dura*, *Aquæductum Fallopii* transiens reflectit sæpe ramulum, aut plures, ex anteriori facie processus petrosi in cranii caveam, qui sub durâ meninge ad receptacula &c. abeunt (b); alium vero intus pro *chorda tympani* cum ramo quinti paris constituenda, aliosque minores ad musculos, reliquasque tympani partes. Reliqua pars ad aurem externam, pericranium, musculos ossis hyoidis, labrorum, palpebras, & parotides abit.

III. **VAGUM**, (una cum *spinali accessorio Willisii*) juxta sinus laterales duræ matris egrediens,

a) De horum fabrica & usu musculari *Morgagn.* Adv. 71. & V. 101.

b) Idem *Advers.* VI. p. 34.

diens, descendendo per collum & thoracem (œsophago adhærens) ad abdomen, ramos impendit laryngi, pharyngi, linguæ, (a) cordis pulmoni, & præcipue ventriculo. Nervos quoque e suprema thoracis parte reflectit ad laryngem, qui inde *Recurrentes* dicuntur. Ceterum tam in collo, thorace, quam abdomine, variis plexibus implicatur *linguali*, *cervicalibus*, & *intercostali* (VI.)

IX. LINGUALE ad linguam abit, & *lingua motorium* vulgo, a quibusdam vero potius *Gustatorium* habetur. (§. 285.)

Illud vero par, quod cum *Villisio* vulgo pro *decimo cerebri* numeratur, varias ob rationes rectius pro primo colli habendum esse putato. (71*)

300 NERVISPINALIS MEDULLÆ dicuntur qui ex medulla, quæ in spina est, oriuntur (Conf. §. 273.) Horum *triginta duo* numeramus paria; nimirum

CCERVICIS vel COLLI, paria octo: a quibus innumeris ramuli per musculos capitis, colli, scapulæ, & humeri distribuuntur. Speciatim vero a pari tertio ramus quidam *ad aurem* ascendit. Insimul a pari tertio, quarto, & quinto ut plurimum oritur *Nervus diaphragmaticus*, per collum & thoracem (ubi pericardio adhæret) ad diaphragma descendens; ex quo ramulos ad venæ cavæ inferiorem truncum emittit. (b) Par sextum, septimum, octavum, & primum par *dorsalium*, anastomosibus juncta, *nervos brachiales* sex robustos component, prospiciens scapulis, brachiis, manibus, & digitis.

Huc, tamquam nonum nervorum colli par, re-

(a) *Lancisus* de corde Tab. VI. fig. 1.

(b) Vid. *Lancis.* de cord. Tab. 1.

referendus *Nervus spinalis* vel *accessorius Villisi*; qui circa par tertium vel quartum colli e *spinalis medullæ* parte posteriori (a) ortus per foramen magnum occipitis in cranium ascendit; deinde *pari vago* junctus, & per idem foramen cranio egressus, recedit rursus a *pari vago*, & reflectitur ad *musculum scapulæ cucullarem* sive *trapezium* (b)

DORSI, duodecim sunt paria; hæc, præter ramum, quem nervis brachialibus dant, juxta tractum costarum, in earum sulco excurrunt, ac pleuræ, musculis intercostalibus, pectoralibus, & abdominis, mamminis, aliisque thoracem ambientibus partibus ramos largiuntur.

LUMBORUM, quinque paria; non solum per lumbos, peritonæum, tegumenta, & musculos abdominis distribuuntur: sed præterea etiam eorum

par primum utrinque sæpe furculum *diaphragmati* largitur.

par secundum vero, cum ramis *paris primi, tertii, & quarti* inosculatum, *Nervum Cruralem* constituit, per anteriorem femoris partem distributum. Sic & ex *pari secundo, tertio, & quarto* ramus componitur, qui per foramen magnum ossis pubis transit ad *scrotum, testes, partesque vicinas*.

par quartum & quintum, cum primo, secundo, tertio, & quarto ossis sacri componunt *Nervum ischiaticum*, sive *cruralem posteriorem*, totius corporis

O 2

ma-

z) Hoc par non a prioribus, sed a posterioribus, ne infra quintam conjugationem oriri noravit *Santorinus* & *Ridley*, observ. anat. p. 68.

y) Optime a *Duverneo* delineatur, tract. de Auditus no Tab. XI. fig. 1. T.

maximum. Hic inter musculos glutæo pelvi egreditur, atque in posteriori femoris parte, inter duo capitula inferiora femoris, descendens, per tibiam & totum pedem, ad digitos usque distribuitur. Antequam vero pelvi exit, ramulos impertit *vesicæ intestino recto, partibus genitalibus, musculisque vicinis.*

COSSIS SACRI, quinque ut plurimum paria per foramina hujus ossis anteriora, egrediuntur; quorum superiora, ut dictum modo est, *Nervum ischiaticum* constituunt, quod vero reliquum est, partibus in pelvis sitis, intestino recto, vesicæ, partibus genitalibus, aliisque vicinis impenditur. Per foramina vero posteriora hujus ossis, et latis magna, nullus notabilis nervus, et multi male perhibent, transire observatur. Ceterum de nervorum subtiliori distributione evolvi meretur *Willisus* de Cerebro & Nervis, atque *Vieussenii* *Nevrographia*, figuris maximis & splendidis illustrata.

301 **STRUCTURA** sive **FABRICA NERVORUM**, in nervis majoribus, multisque minoribus, præter vasa sanguifera, & membranas quibus cinguntur, conspicitur *fibrosa*; ex quam plurimis *fibris*, & quasi *fasciculo filamentorum cylindricorum*, albicantiumque, composita: quæ quidem filamenta solida apparent, & nulla in i cavitas facile conspicitur, (a) multo minus liquidum in eis observatur. Interea tamen *filamenta nervorum esse cava*, & liquidum, quod **SPIRITUS** vulgo vel *liquidum nerveum* vocant Medici, in eis contineri, eaque propterea non fibras solidas, sed vera esse *vascula*, inter alia sequen-

(a) *Leewenhuëck* tamen se eas sæpius observasse affirmat Epist. phys. XXXII.

quentibus persuademur rationibus.

1. Quia e cerebro & spinali medulla, uti *du-
ctus excretorii* alii ex aliis visceribus & glandulis, ad extrema scilicet arteriolarum corticalis cerebri substantiæ, oriuntur.
2. Quia ingens copia sanguinis subtilissimi, quæ per quatuor insignes arterias ad cerebrum continuo deferitur, comparatione facta cum hepate, ab exigua arteria nutrito, pro sola cerebri nutritione non requireretur, nisi *secretio*, & quidem larga, ex hoc sanguine hic fieret.
3. Quia a primo ortu in utero, ad perfectam usque corporis magnitudinem, crescunt, elongantur, & ad extremum usque vitæ nutriuntur: quod vix recte explicari posse puto, nisi liquidum subtilissimum in nervis admittatur, quod eos extendat.
4. Quia *nervo resecto*, SENSUS, MOTUS, imo & NUTRITIO illius, cui inferabatur, cessant: certo indicio influxum alicujus liquidi, quod alias ad hæc præstanda affluebat, jam sublatum esse.
5. *Ligatis nervis*, idem contingit, & speciatim *ligatis phrenicis*, motus diaphragmatis cessat. Pressis vero deinde his nervis infra ligaturam versus diaphragma, motus aliquis in diaphragmate redit: quod perspicue indicat, motum diaphragmatis a fluido, in his nervis contento, oriri & instaurari.
6. *Somni & vigiliarum natura* sine spiritus aut fluido nerveo intelligi recte nequit, & nemo eam adhuc sine his clare exposuit.
7. *Cur a nimia venere*, præsertim in debilibus, aut minus robustis, tanta sæpe sequatur *debilitas*, sine spiritibus explicari aut concipi non potest.
8. Neque *debilitas a studiis nimis*, vel in mul-

tis morbis, & præsertim subitanea illa *virium prostratio in febribus malignis*, ab ullo sin-
spiritibus hucusque bene exposita est.

9. *Ex incremento & accretione fructuum*, ver-
gratia, cerasorum &c. in quorum peduncu-
lis fibræ sine cavitatibus conspiciuntur, &
tamen succum sive fluidum longe crassius
quam nerveum esse ponitur, quod non so-
lum fructum, sed durissimum nucleum effi-
cit, per cava inconspicua pedunculorum tran-
sire, incrementum & perfectio fructuum
tanquam manifestus & non denegandus ef-
fectus, quam evidentissime docent. Quar-
igitur tenuissimum fluidum in nervis no-
concedant multi, rationem idoneam non vi-
di. Præterea

10. *Spiritus qui negant, nullum, vel saltem*
nullum perspicuum usum nervis dare possunt.
Si enim dicunt, animam contractione ner-
vorum agere, motusque producere: primi
contractio neque percipitur in nervo, neque
demonstrari potest. Deinde phænomenon li-
gati nervi (N. 5.) explicare nequeunt; quam-
vis enim nervus filo stringatur, ligatura hæc
actionem ejus impedire non valeret, eodem
prorsus modo, quo vis trahendi funi non
adimitur, licet filo constrictus sit. (a)

302

(a) Conferri hic meretur totum caput de Cerebro ex Boer-
haav. Instit. Med. Morgagni Advers. anat. II. p. 70. 72. &
VI. p. 26. 30. itemque Burgravv. de Spirit. Existent. &c.
quia hodie tam multi sunt, qui hos, quoniam eos & cava
nervorum videre non possunt, aliasque leves ob causas, ne-
gant; imo sunt, quos nominare hic nolo, qui in illos, qui
spiritus admittunt, scommatibus & conviciis invehuntur.
Haud enim subtiliter satis de subtilissimo hoc fluido judi-
care videntur, qui illud tam crassum aut spissum fingunt
quasi in oculos incurrere debeat; cum potius tam subtilis
concipiendum; sicut haud inepte Schelhamerus noster ju-
dicat, (Anal. anat. diss. XIII. 46.) ut instar lucis velo-

cilli-

302 USUS igitur NERVORUM mea sententia est, *spiritus*, sive *liquidum subtilissimum* in cerebro & spinali medulla secretum, fovere; ac pro sensu, motu, & *nutritione*, ad omnes corporis partes, imo subtilissimis suis fibrillis, ad omnia artium puncta deferre.

DE M Y O L O G I A.

303 MYOLOGIA est doctrina de *musculis*, Myologia
agens eorum fabricam, originem, insertionem
et finem, situm, actionem, & usum. quid,

304 MUSCULUS est instrumentum motus; musculus
sive pars corporis, motui præsertim voluntario
efficiendo dicata, constans potissimum ex fibris
serneis & tendineis: quibus omnis generis vasa,
arteriæ, venæ, nervi & lymphatica accedunt;
et partes omnes communi membrana involvuntur. quid?

305 Dividitur in corpus, & duas extremitates: Ejus
corpus etiam *venter*, & *extremitates*, præci- divisio.
ue albicantes, quoque *tendines* vocantur. Ex-
tremitas, ubi oritur, *caput*, principium, origo,
sive etiam *punctum fixum* appellatur; finis vero
cauda, *punctum mobile*, & sæpissime *tendo* dici-
tur; qui, si membranaceus & latus, *aponeuro-*
sis audit,

306 Actio musculi consistit proprie in contra-
ctione ventris, quocumque modo hoc fiat, qua
mus extrema ad se invicem accedunt, & sic par-
tem

O 4

tem se diffundat, quod profecto non oculis, sed ex effectibus & phænomenis, qualia nonnulla adduximus, ope iudicii sive mentis oculis cognoscendum: quemadmodum cavas & liquidum tenuissimum in insectis minimis, aris, aliisque centies millies his minoribus, (conf. Hist. cad. Reg. A. 1718.) non nisi mentis oculis cognoscuntur. & aerem, animam, & multa alia non videmus, quæ tamen effectibus, quemadmodum spiritus animales, esse & existere intelligimus.

tem, cui finis musculi inferitur, quasi chorda traheretur, movent. *Schelhamerus* (a) contractionem hanc fieri existimat corrugatione fibrarum, sicut lumbricos se corrugare sive contrahere videmus. *Morgagnius* (b) ad actionem musculi intelligendam multum facere judicat *experimentum Villisi*; quo probatur, minimam vim aeris per tenuem cylindrum in vesicam impulsu, lateribus ejus distentis, ac longitudine contracta, pondus plerumque librarum 60. vel 70. attollere & sustinere posse. Alii hydrostaticis experimentis demonstrant, quomodo paucum liquidum per tenuem cylindrum, qui vasi amplioris basis, jam pleno, insistit, immissum, ingens pondus movere & elevare possit. Ex quo sequitur, *ventrem musculi* in contractione sive actione sua *intumescere*. Verum sunt multi ex recentioribus, qui intumescentiam musculi in actione negant. Sed his suadeo, ut, dum maxillam inferiorem fortiter adducunt ad superiorem, digitos duos vel tres musculo masseteri, vel temporali, imponent, tunc manifestissimam intumescentiam & indurationem percipient. Vel solum, manu pronā, pollicem fortiter adducant ad indicem, & videbunt, tactuque percipient, quomodo musculus inter pollicem & indicem valde intumescat, atque durescat, sic ut, licet plura hic exempla non adducamus, nemo de intumescentia musculi, quando se contrahit, jure amplius dubitare possit. (c) In multis musculis *utraq; extremitas mobilis est*; & tales proprie nullum habent punctum fixum; quo vero in casu illa pars, quæ

alte-

(a) *Analest. anatom. Dissert. VIII.*

(b) *Advers. V. p. 112.*

(c) De actione musculorum præ ceteris prolixius videantur *Borellus*, de motu animalium; *Bernovillius*, de Motu musculorum; *Bergerus* in *Physiolog. c. XXII.* *Boerhaavius* *Instit. med. articulo de Musculorum actione*; & *Mead. Introductio in Myotomiam novam ac splendidam Couvperi.*

tera immobilior, pro puncto fixo, five origi-
 mobilior, pro fine, seu puncto mobili, ut-
 rumque est reputanda. Nam dantur casus va-
 talibus in musculis, ut id, quod modo fuit
 actum mobile, jam fiat punctum fixum; & con-
 , quod fixum fuit, jam fiat mobile; exemplo
 lenorum, serratorum anticorum, musculorum
 brundam abdominis, aliorumque.

07 Quidam musculi in unam conspirant actio-
 , five socii unius actionis; ut flexores five
 ensores brachii &c. & hinc musculi, in unam
 onem conspirantes, congeneres, five socii vo-
 i possunt. Quando vero respectum habent ad

Muscu-
 li socii
 & an-
 tagoni-
 stæ.

onem contrariam musculorum, dum scilicet
 ensores alicujus partis contrariam flexoribus
 onem perficiunt, tunc tales musculi Antago-
 æ appellantur. Ambo vero simul agentes
 mbrum rigidum efficiunt, ac immotum fer-
 at; quæ musculorum actio, *Motus tonicus* di-

De mo-
 ribus
 quorum-
 dam
 muscu-
 lorum.

ar. Præterea notandum hic esse existimamus,
 ltos musculos, seorsim consideratos, alios adhuc
 s perficere, quam qui toti pari adscribuntur,
 a toto pari simul agente perficiuntur. Sic

sculus mastoideus, rectus major capitis, &c.
 ando utrinque simul agunt, caput recta antror-
 n flectunt; quando vero in uno tantum late-
 caput oblique deorsum, & ad latus alteru-
 m ducunt. Hinc a diversitate musculorum,

vel soli agunt, vel conjunctim cum suo so-
 , vel cum aliis, multi adhuc medii motus,
 a primariis motibus diversi, hucusque vero

n satis observati, oriuntur. Id quod non so-
 n in capitis musculis, tam flexoribus, quam
 ensores, verum etiam in multis aliis, præ-
 tim vero in oculorum, labrorum, maxillæ in-
 oris, linguæ, colli, abdominis, brachii, &
 pi musculis, &c. observandum, alias tam va-

& mirabiles partium motus intelligere non
 posse.

possemus. Conferri hic merentur elegantissimæ observationes *VVinslovvii* de actione musculorum (*a*), ubi in primis etiam demonstrat, plurimum motus non fieri contractione, sed relaxatione eorundem in latere opposito.

Fibrarum diversitas.

308. *Fibræ musculosæ*, pro actionis, cui dicuntur, diversitate, vel *rectæ* sunt, vel *obliquæ*, *transversæ*, *annulares*, vel *spirales*, &c.

Musculi simplices & compositi.

309 Nonnulli musculorum ex simplici sive unius formi fibrarum tractu constant; & hi *simplices* dicuntur. Alii vero ex vario fibrarum, eoque sæpe contrario tractu, imo ex diversis quasi partibus vis musculis componuntur, & *compositi* vocari possunt; prout *STENO*, *BORELLUS*, & *LOVERUS* egregie demonstrarunt. Quo plures autem tales in unum musculus coeunt, eo musculus fit crassior & robustior.

Quid motus animalis, naturalis & mixtus.

310 *Motus* plerorumque musculorum est *voluntarius* sive *animalis*; aliorum *involuntarius* sive *naturalis* dictus; & quorundam motus *mixtus* est ex naturali & animali, sive ex voluntario & involuntario: & hinc *motus mixtus* appellari solet. Hi muscoli, qui motum obtinent voluntarium, a cerebro aut spinali medulla nervo accipiunt; qui naturalem sive involuntarium cerebello; qui utrumque, a cerebro & cerebello simul. Sicuti vero musculus, *nervo ejus vel dissecto vel ligato*, agere amplius nequit: ita eundem quoque agere non posse, *ligata vel dissecta ipsius arteria*, *STENONIS*, aliorumque in canibus experimentis & industria compertum est.

Unde nomina.

311 *Nomina* recipiunt muscoli, ut plurimum vel a puncto fixo & mobili ejus simul, vel a puncto fixo, aut puncto mobili solum: vel a usu, quem præcipue præstant; vel a figura aut similitudine: vel a loco aut situ; vel a magnitudine, aliisque eorum qualitatibus; sicut ex speciali

li musculorum consideratione uberius patebit: primum optimæ delineationes reperiuntur apud *Galium, Eustachium, Casserium, Drakium, & primis Covvperum* in splendida sua *Myotomia* folio.

12 Incipiemus vero specialem eorum historiam capite, progrediendo usque ad calcem: sic pota apparebit, de eorum numero, in quo *Austro- & Cadavera* tantopere variant, & qui facile p. superat, nihil certum aut perpetuum hic cui posse.

Ordo
myolo-
gia.

DE MUSCULIS SPECIATIM.

3 MUSCULI CUTIS CRANII sunt quatuor.

Musculi
cutis
cranii.

(*Frontales duo*, valde tenues, siti sub cute frontis, & utrumque extremum habent mobile, paucis fibris exceptis, quæ ex inferiori margine ossis frontis proveniunt. Extenduntur utrinque sub superciliis ab orbiculari palpebrarum prope canthum oculi majorem, ultra dimidium orbitæ versus canthum minorem, & ascendunt paululum oblique extrorsum, super os frontis; deinde tendines suos super cranii partem superiorem expandunt, & cum aponevrosi occipitalium, qui fixi, conjungi videntur: sic iis cutis cranii, præsertim frontis, moveri, & simul supercilia attolli possunt. Horum antagonistæ sunt orbiculares palpebrarum, quibus innascuntur.

(*Occipitales duo*, plerumque etiam valde tenues, oriuntur utrinque ex osse occipitis, ubi ossibus temporalibus adhæret: ascendunt sursum, supra ossa bregmatis, aponevrosin cum frontalibus (quorum quasi punctum fixum sunt) adunant, cranium velu-

veluti *galea* tegunt, eorumque actioni succurrunt. (a) Hos occipitales quandoque deficere notavit *Morgagnius*, & quandoque adeo tenues sunt, ut difficillime conspiciantur; quandoque vero solito ampliores & quasi in duo divisi; hinc utrinque *duplices occipitales* statuit *Santorinus*. (b)

Superciliorum.

314

SUPERCILIORUM *Corrugator*, sive *Depressor* unus; oritur utrinque a radice nasi & in utrumque supercilium oblique inferitur, quæ ad se invicem adducit, & simul deorsum movet; frontales contra ea attollunt. Videtur mihi pars quasi frontalis *Santorino* vero pars orbicularis (c).

Palpebrarum.

315

PALPEBRARUM tres;
Orbicularis seu *constrictor*, unus; oritur ex apophysi superiori ossis maxillaris, juxta oculi canthum majorem; fibris orbicularibus utramque palpebram ambit, easque claudit; atque eo ipso supercilia deprimi & adducit (d), & palpebram inferiorem elevat. (e)

Elevator proprius palpebræ superioris; oritur in fundo orbitæ, & inferitur palpebræ superioris margini, prope cartilaginem tarsi.

Depressor palpebræ inferioris; est series fibrarum carnearum, modo tenuior, modo crassior, ex cute genarum, quandoque ex osse jugali proveniens, & in orbicularis oram inferiorem oblique introrsum se inferens;

(a) *Covvperus* hos & frontales musculos pro uno quasi digastrico haberi posse censet *Myotom.* in fol. pag. 19.

(b) Pag. 8. & 9.

(c) *Observat. anatom.* pag. 8. & 9. De horum aliorumque musculorum faciei varietate legi meretur *Waltheri* *Tenerior. muscul. Anatomie* 1731. Lipsiæ edita.

(d) *Morgagn.* *Advers.* II. 28.

(e) *Idem* *Advers.* VI. 44.

ferens; quibus palpebra inferior, si rite attendamus, manifesto deorsum trahitur, quando oculum aperimus.

MUSCULI OCULI sunt septem in bestiis, *Musculi oculi.* sed sex tantum in homine (a), nimirum *li oculorum.* *Recti*, quatuor: oriundi circa foraminis nervi optici, in fundo orbitæ; ambitum, inferuntur in scleroticam, non procul ab ambitu corneæ (b); ut

<i>Superior</i> , attollens, sive superbus.] a quibus quoque, si duo conjun. tim agunt, motus obliqui
<i>Inferior</i> , deprimens, sive humilis.	
<i>Exterior</i> , abducens, s. indignatorius.	
<i>Interior</i> , adducens, sive bibitorius.	

Obliqui, sive *rotatores* duo: ut

] fiunt.

Obliquus major, superior, sive trochlearis: oritur juxta præcedentes; sed transit per singularem trochleam (c) fere cartilagineam, supra canthum oculi majorem; inde rursus reflectitur; & superiori oculi parti circa medium inferitur: hinc oculi pupillam oblique deprimat, & quodammodo educit.

Obliquus minor, sive inferior: oritur ab anteriori & interiori orbitæ parte fere prope canalem nasalem; oblique inferiorem bulbi partem ambit, & exteriori ejus parti circa medium inferitur. Hinc oculi pupillam oblique sursum movet: aliter ac vulgo

a) Ab *Eustachio* optime delineati Tab. 39.

b) Ad palpebras eos quoque esse extensos, præsertim anteriorem, ut motui horum succurrant, notat *Morgagn.* v. VI. 98.

c) De hujus constitutione ib. De his musculis etiam meretur *Winslow* in *Hist. A. R.* an. 1721.

go putarunt. Ambo vero simul agentes oculum antrorsum ducunt, atque sic rectorum (qui retrorsum ducunt) antagonistæ sunt: oculumque simul quasi in æquilibrio suspensum retinent, ut in omnino punctum sit mobilissimus.

Musculus septimus brutorum, in fundo orbitæ, circumferentia nervi optici undique oritur scleroticæ partem posteriorem totam amplectitur; & bulbo oculi protrudendo inservit videtur.

317 **MUSCULI AURIS EXTERNÆ** sæpe tam exigui sunt, ut vix appareant; aut revera subinde defunt: hinc *Schelhamerus* noster, præsertim, quia eorum actio raro percipitur, ipso ex numero partium consuetarum rejicit. (a) Veteres etiam ob hanc causam eos neglexisse videntur, & *Galenus* pro *lineamentis* potius *musculorum*, quam *musculis* habuit (b). *Columbus* (c) & cum primis *Fallopianus* (d) primi ipsos descripserunt; quos tamen non semper adesse, simul monent. *Fallopianus* speciatim tres aliquando se reperisse ait: quorum *primus*, ut refert, in anteriori parte collocatus, oritur a fine musculi frontis, unde valde tenuis descendit versus aurem, & in ejus anteriorem & superiorem partem inseritur. *Secundus* supra processum mammillarem, tenui principio oritur, per transversum fertur descendendo, & parum latior factus, veluti si in tres digitos divideretur, posteriori auriculæ implantatur. *Tertius* est pars illius, qui *platysma myodes* dicitur: a quo aliquando pars ad partem inferiorem auriculæ ascendit, eique infe-

(a) Tract. de Auditu P. I. C. I. n. 7. & Analect. Anat. disp. XIII. N. 3.

(b) De usu part. L. XVI. C. 6.

(c) De re anatom.

(d) Observ. anatom.

eritur. *Casseri* (a) & *Bidloo* (b) recensent
 inque; *DuVerney* (c) tantum duo, superiorem
 posteriorem, atque hos cum suis inquisitioni-
 maxime convenire asseverat *Covvperus*. (d)
 cum *Valsalva* (e) tres delineat, & antero-
 a his addit. Sed postea *Vieussenius* quatuor
 sus describit, affirmando, se aurem non de-
 pisse, antequam millies eam examinaret,
 que figuras tam accuratas esse, ut nunquam
 etiores visæ sint. (f) *Santorinus* vero, (qui
Vieussenii tractatum haud vidisse videtur, fere-
 nes erroris inculcat, (g) atque aliam rursus
 ibet delineationem. Verum ego hanc aucto-
 ritatem diversitatem non erroribus, si *Bidloo*ianas
 e excipias, sed potius varietati subjectorum
 tribere malo; nam in quovis fere cadavere
 quam varietatem, sæpissime tamen etiam tan-
 tiorem superiorem & posteriorem, varie in variis
 titutum, deprehendere soleo; eosque, si ad-
 , potissimum tendendæ & relaxandæ auricu-
 pro soni diversitate, inservire existimo. (h)
Musculi, quos *Valsalva* trago & antitrago, &
Santorinus cum *Douglassio* (i) helici, con-
 næ, atque meatui auditorio adscribit, mea
 sententia quoque pro lineamentis magis mus-
 alorum aut membranis tantum muscularibus,
 nam pro veris musculis habendi: quia raro
 tis manifestæ fibræ cerneæ eis in locis depre-
 enduntur, neque motus ibi observatur.

-) Tract. de auditu.
-) Anatom. Tab. 12. fig. 1.
-) Tract. de auditu.
-) In Myotom. nov. p. 29.
-) De aure hum.
-) *Traité de l'oreille*, in quo Censor Parisiensis præte-
 statur, figuras *Vieussenii* cum archetypo convenire.
-) Observ. anatom.
-) Conf. *Waltberi* teneriorum musculorum Anatome re-
 (i) Myograph. p. 29.

318 MUSCULI AURIS INTERNÆ sunt, vel mallei, vel stapedis, omnes valde exigui.

◊ MALLEI, cum *Covvpero*, *Douglas*. & *Valsalva* tres numeramus (a).

◊ *Externus* oritur ventre brevi a superiori margine meatus auditorii, & tendine tenet pergit supra membranæ tympani partem superiorem in tympani cavum, & in crassiores mallei processum inferitur, cujus manubrium foris trahendo tympani membranam laxat.

obliquus sive *semicircularis*, situs est in externa & ossea parte ductus *Eustachii*: unde per canalem paulo sursum & retrosum progrediendo, inferitur mallei processui longissimo, tympanique membranam tendere varieque laxare potest.

◊ *internus*, ex parte cartilaginea, ubi pars ossea ductus *Eustachii* terminatur, oritur, & pergit in canali osseo partis superioris hujus ductus fere ad fenestram ovalem in tympanum, ubi tendo ejus, quasi super trochleam, ad malleum reflectitur, & parti posteriori manubrii mox sub capitulo inferitur, tympanumque tendit.

◊ STAPEDIS, oritur in canali ossis petrosi fere in fundo tympani, corpore satis crasso, quo mox tendinem emittit tenuem, qui in capite stape-

(a) Myotom. nov. in fol. p. 33. & Tab. XXVI. *DuRoi* & *Vieussens* duos numerat, aliisque nominibus eos describit, sed *Vieussens* *Traité de l'oreille*, unicum tantum esse musculum mallei contendit, quem *monogastricum* appellat, duplici principio, duplicique fine instructum, p. 40. eumque delineat Tab. 2. fig. 3. *Valsalva* Tr. de aure, his musculis non solum alia nomina tribuit, verum etiam aliter describit: non quod in usibus cum *Covvpero* convenit: *Boerhaavius* in *Institu* rursus differt ab his; ex quibus difficultatibus propter partium subtilitatem & cadaverum forte etiam in his varietatem, me adhuc, ut verum fatear, extricare satis non potui.

Lapidis, & os, orbiculare dictum, inferitur, lapidemque elevat.

MUSCULI LABRORUM mihi sunt quatuordecim (*a*), vario labrorum motui, animique affectibus servientes.

Constrictor, unus, *orbicularis* dictus, ipsa labra constituens: cujus fibræ tamen sæpe quasi arciformes. (*b*)

Abductores, qui *Risores* dici possunt, duo paria.

Zygomaticus; cujus origo, os zygomatis; finis, angulus labrorum. Hic quandoque duplex, quandoque caput habet duplex, quandoque finem tantum bifidum, vicinis variis implexum.

Buccinator; cujus origo, partim a parte anteriori & infima processus coronoidis maxillæ inferioris (*c*), partim ad radices postremorum dentium molarium utriusque maxillæ; *progressus*, capite erecto fere horizontalis; & *finis*, ut prioris. Cibos dentibus submittit, buccinatores juvat, & ductus salivalis Stenonianus ejus medium perforat.

Elevatores sunt vel

communes, duo, sive unum par, *caninus* dictus, qui oritur ex cavea sub osse jugali, in osse maxillari: & inferitur in angulum labrorum.

proprii, duo paria,

labro superiori, *Incisorius* dictus: cujus origo, os maxillare, mox sub orbita, transit proxime alam nasi, cui fibras im-

P

per-

a) Santorinus longe plures numerat, qua de re vid. p.

(*b*) V. Cant. Tab. I. & Santorin. Tab. I.

c) Negat hoc Santorin. sed non solum nuperrime hoc observavi; verum & Cowperus, Douglas, Cantius me consentiunt.

pertit, & interitur orbiculari ad dentes incisores.

Labro inferiori. *Elevator* labri inferioris *Covuperi* oritur infra incisores maxillæ inferioris sub gingivis, & descendit in cutem menti. Hic, *incisorius inferior*; ille, *incisorius superior* dici posset.

Depressores, tres, variis præcedentium mire sæpe innexi.

Triangulares, duo: quorum quilibet oritur ex parte laterali & infima maxillæ inferioris circa medium, unde ascendit oblique ad angulum orbicularis.

Quadratus, unicus, fibris reticulatis constans, oritur ex parte anteriori ejusdem maxillæ lato principio, & definit in totam partem inferiorem orbicularis.

320 **MUSCULI NASI**, tria paria numerari possunt. (a)

Dila-

(a) *Santorinus* naso, labris, aliisque faciei partibus, longe plures, eosque novos, a se primum descriptos musculos, ac speciatim *naso octo paria* tribuit: eaque omnia Tab. sua I. delineat. Horum vero & labrorum plerosque, si non omnes, quos præter hos, a nobis descriptos, indicat, vel prorsus non observare potui, vel quandoque & raro tantum unum alterumve adesse vidi: vel vix membranulas aut fibras musculares referunt: musculi enim faciei tantopere variant, testibus *Covupero*, *Morgagnio*, *Cantio*, & quotidiana experientia, ut, si centum secabis facies, semper aliquam differentiam inveneris: idque in causa esse puto, quod optimorum auctorum de his musculis figuræ, ut *Covuperi* in utraque *Myotomiæ* editione, *Eustachii*, *Cheseldenii*, *Cantii*, *Santorini* &c. valde discrepent; quam vero discrepantiam non tam errori, quam diversitati objectorum adscribo: quæ fit, ut, de iis, a me non descriptis, nihil certi aut perpetui affirmari possit; atque ab hac varietate ingenti musculorum faciei *Morgagnius* Adv. II. 28. *Covuperus* facierum quoque varietatem rectissime deducunt. In primis vero nonnullos aures, nasi, & faciei novos musculos tam tenues & exiguos esse ipse fatetur *Santorinus*, ut vix nisi in robustissimis videri possint, fateorque, me plerosque, summo licet studio indagatos, ut veros musculos deprehendere non potuisse.

Dilatatores, (qui & simul elevant) magnopere variant, ut plurimum tamen utrinque duo sunt, quamvis sæpe valde sint tenues; ut

Pyramidalis, qui oritur a radice nasi, & continuus plerumque est frontali; in latere nasi paululum sensim in tenuem membranam expansus descendit, & inseritur alæ nasi, fibrasque subinde usque in labrum superius demittit. (a)

Myrtiformis, sive *Dilatator* stricte sic dictus, oritur prope incisuram labii superioris, cujus sæpissime pars est, & inseritur partim alæ nasi, partim labro superiori.

Constrictor orbicularis, ut in bestiis variis, in homine non adest; sed exiguus a *Covvpero* primum descriptus (b), & ab *Eustachio* quoque delineatus (c), oritur supra dentes incisores maxillæ superioris, & desinit in alas nasi. Hunc duplicem esse vult *Santorinus* (d), quod quandoque etiam observavi, ejusque actioni multum succurrit orbicularis labiorum. Confer. hic laudata *Waltheri* tene-rior. musculor. Anatome.

MUSCULI MAXILLÆ INFERIORIS
sunt sex paria.

Depressorum, duo paria, ut

Platysma myoides: quod oritur circa claviculam, a musculo pectorali ac deltoide, imo etiam, ut *Galenus* & *Covvperus* notarunt, a vertebriis colli; & inseritur maxillæ inferiori; ita tamen, ut fibras plerumque ad labra & genas, imo ad aures sæpius emittat, & sic horum motui succurrat.

P. 2

Bi-

a) Vid. *DraK.* Tab. XVII. & *Covvperi* Myotom. in Tab. XXV.

b) In Myotomia in 8.

c) Tab. XLI. fig. 1.

d) Observ. anat. p. 21.

| *Biventer* live *Digastricus*; origo, incisura sub processu mastoideo; tendo vero sæpe transit musculus stylo-hyoidum, & anulum membranaceum nisi hyoidi junctum, tanquam trochileam, atque inseritur internæ synchondrosi menti; hujus vero trochleæ beneficio mirabili artificio os aperitur. (a)

Elevatorum quatuor paria;

| *Crotaphites*, live *Temporalis*; origo, tota regio temporum; ac speciatim ossis frontis, sincipitis, temporum, & sphenoides; transit sub jugo, & inseritur processui acuto maxillæ.

| *Masseter*: origo, pars inferior & interior jugi, finis anguli maxillæ superficie externa. Super hunc musculum transit ductus Stenonianus.

| *Pterygoides internus*; origo, cavitas processus pterygoidei: finis, superficie interior & inferior anguli maxillæ.

| *Pterygoides externus*; origo, lamina exterior dicti processus & pars vicina ossis sphenoidis, finis mox supra prioris insertionem. (b)

322 OSSIS HYOIDIS quinque sunt musculorum paria;

| *Mylo-hyoides*: oritur amplo, sed tenui principio a basi maxillæ inferioris; finis basis ossis hyoidis.

| *Coraco-hyoides*: oritur juxta processum coraco-

(a) Vid. Dissert. nostra de Masticatione.

(b) A pterygoideis & masseteribus musculis maxilla etiam ad latera, itemque antrorsum & retrorsum movetur: eisque stridor dentium excitatur; qui motus in manducando valde utiles sunt. Conf. *Cœwyper*. *Myoc.* nov. Tab. 31.

coideum, e costa superiori scapulæ (a);
atque inseritur basi & cornu ossis hyoidis.

Genio-hyoides: oritur in medio menti, supra
mylohyoideum, juxta synchondrosin ma-
xillæ; finis, in basi hyoidis.

Sterno-hyoides: oritur modo a sterno & cla-
vicula, modo a solo sterno, modo a sola
clavicula (b); & inseritur basi hyoidis:
estque præcedentis antagonista.

Stylo-hyoides: origo processus styloides; finis,
cornu & basis: perforaturque sæpe a di-
gastrico maxillæ.

Horum usus, ex situs consideratione, faci-
le patent. Conf. figuræ *Couperi* Tab. XXVII.

3. MUSCULI LINGUÆ quatuor sunt paria
(c); quorum

1. *Genio-glossus*; oritur supra genio-hyoideum
a mento, ingreditur medium linguæ, eam-
dem movet antrosum.

2. *Stylo-glossus*; a processus styloidei apice
proveniens, descendit oblique in radicem
& latus linguæ, eamque ad latera & re-
trosum, ac sursum movet.

3. *Cerato-glossus*; oritur a cornu ossis hyoi-
dis, & inseritur radici linguæ.

4. *Basio-glossus*; a basi ossis hyoidis, per me-
dium linguæ versus apicem excurrit, &
una cum præcedenti linguam retrahit, ac
breviorem facit.

Mylo-glossus quorundam, est pars *Mylo-hyoides*;
hinc non opus est peculiarem inde forma-
re muscolum. Sæpius, ut observavi, quo-

P 3

que

(a) *Couper*. *Myotom.* & *Morgagn.* *Advers.* I. Tab. I. T.

(b) *Couperus* e sola clavicula eum oriri contendit; *San-
crinus* vero e solo sterno. Ego triplicem illam diversita-
tem vidi.

(c) Optima eorum delineatio ap. *Couper*. *Myotom.* No-
Tab. XXVIII. fig. 1.

que non linguæ, sed tantum musculo genio-hyoideo inferebatur.

324 **LARYNGIS** Musculi, septem vulgo numerantur paria, ab origine & fine nomina recipientia; qui omnes glottidis & vocis variationi maxime inserviunt. (a)

Communia II. extra laryngem ortum habentia,

1. *Sterno-thyroides*, deorsum trahit laryngem, & glottidem simul dilatat. (b)

2. *Hyo-thyroides*, elevat laryngem, & glottidem arctat. (c)

Propria, V. in larynge originem & finem habentia;

3. *Cricò-thyroides*, & dilatare & constringere videtur. (d)

4. *Crico-arytænoides posticum*, } glottidem di-

Crico-arytænoides laterale, } latant.

5. *Thyro-arytænoides*, una cum sequenti constringit.

6. *Ary-arytænoides*; oritur sæpe ab una arytenoide cartilagine, & inferitur in alteram, se invicem intersecant & glottidem stringunt (e): sæpe unicus tantum est musculus (f); sæpe alio modo se habet. (g)

EPIGLOTTIDI hucusque tantum in brutis concedebantur musculi (h), licet a *Jac. Sylvio* duo attollentes totidemque deprimentes indicati erant

(a) *Santorinus* plures adhuc describit Cap. VI. & Tab. III. fig. 1. & 2. delineat: eos vero non nisi in aptis observari scribit cadaveribus. Sed hos invenire non potui.

(b) *Cowper*. Myot. nov. p. 45.

(c) *Santorin*. p. 103.

(d) *Ibid*. 102.

(e) Vid. delineat. in *Morgagn*. Advers. I. Tab. II. fig. 1. k.

(f) *Ibid*. p. 38. & *Cowper*. p. 46.

(g) *Morgagn*. *ibid*. & *Santorin*. p. 104.

(h) Vid. *Fabric*. ab *Aquap*. & *Cassérinus* de vocis organ.

De epiglottidis & pharyngis musculis. 201
erant (a). Jam vero ab aliquo tempore ho-
mini restituantur, & primum, quantum me-
mini, a I. G. Pauli (b), qui eos se vidisse
testatur, rursus describuntur.

attollentes, duo: satis longi, a basi ossis hyoi-
dis ad posticam epiglottidis radicem proten-
si, quos *hyoepiglottes* vocat.

deprimentes, duo, minores, ab arytænoidea-
rum cartilaginum apicibus oblique & ante-
rius ad epiglottidis latera delati, *aryepiglot-
tei* dicendi. (c)

5 PHARYNGIS musculi (d) eum vel

Dilatant, quorum sex numeramus paria: ut
C *Stylo-pharyngæum*, quod a principio processus
styloïdis oritur, & in ejus thyroidisque
latus utrinque inseritur. (Hoc & sequens
par etiam attollunt.)

Cephalo-pharyngæum, prodit ab apophysi an-
teriori ossis occipitis, & desinit in partem
illius posteriorem. (e)

P 4

Pte-

(a) In Isag. anat. cap. VII. de musc.

(b) In Præf. ad Horn. opusc.

(c) Littrius in Hist. Acad. Reg. A. 1718. epiglottidi-
es musculos adscribit, duos deprimentes, & unum attol-
lentem; sed eos non describit. Santorinus vero non solum
unum attollentem, (cujus haud leve vestigium nuper quo-
te observavi, & Tab. VIII. fig. 34. k. adumbravi) ve-
rum quatuor quoque depressores, ut duos *ary-epiglottideos*
duos *thyro-epiglottideos majores*; duosque *thyro-epiglotti-
eos minores*; pro media, ut existimat, epiglottidis parte
clinanda, describit: qui vero, ut ipse affirmat, tam te-
nes sunt, præsertim ultimæ, ut vix, nisi in robustissimis
cadaveribus, videri queant: & propterea etiam eorum loco
nullusque nil, nisi membranulas, observare potui; eos ta-
men interea pro ulteriori inquisitione hic indicare volui.
Conf. ejus Cap. VI. & figuræ antea citatæ, itemque quæ
Borgagnius de his habet Advers. I. N. 28.

(d) Vid. figuras in Cantii Tab. 3. & Couper. Myotom.
ova Tab. 28. & 29.

(e) Ibid. & Douglas Myograph. 41. Hoc par *azygos* ap-
pellat Santorin. p. 121. Negat hanc originem Valsalva; ve-
rum hi omnes, & ego eam observavimus.

Pterygo pharyngæum, a processibus pterygoideis (a)

Salpingo pharyngæum, tuba *Eustachii*. (b)

Mylo pharyngæum, a maxilla inferiori, pone ultimum dentem molarem, tonsillas maxime complectens. (c)

Glosso pharyngæum, a lingua; qui omnes in partem posteriorem, ubi linea tendinea sæpe conspicitur, (d) terminantur.

Constringunt; unum, *œsophagus*, sive *sphincter gulæ*, vulgo dictum: quod utrinque oritur ab osse hyoide, cartilagine thyroidea & cricoidea laryngis, atque gulæ partem posteriorem ambit. Ob multiplicem vero hanc originem illud in tria paria dividit *Valsalva* (e); *Douglas* vero, *Cantius*, & *Santorinus* (g) adhuc in plura; quibus ab origine & fine nomina imponunt; ut *Hyopharyngæum*, *Thyro pharyngæum*, *Crico-pharyngæum* &c. Quoniam vero fibræ earum partium intime ut plurimum connexæ sunt, ut sine difficultate dividi nequeant, & raro tales divisiones, quales *Valsalva* pingit, quæ eas distinguerent, clare perspiciuntur, entia præter necessitatem, ut etiam *Couperus* hic sentit (g), multiplicare nolui, sed has partes sub unius *sphincteris* sive *œsophagi* nomine comprehendere malui.

Vagi-

(a) *Morgagn.* Adv. I. p. 4. II. p. 43. & modo citati.

(b) *Douglas*, p. 42. *Cant.* p. 12. & *Santorin.* p. 122.

(c) *Douglas* & *Cant.* ibid. *Santorinus* putat, præcedens & hoc a nullo nunquam indicatum esse; delineatum tamen etiam reperitur in *Couperi* figuris laudatis.

(d) Hanc lineam negat *Santorinus* p. 128. verum *Morgagnius* Adv. II. 44. & *Cant.* p. 12. eam modo adesse, modo abesse recte observant; ipseque pharyngem assero, in quo adest.

(e) De aure hum.

(f) Locis cit.

(g) L. c. p. 145.

Palmaris gulæ Cooperi (a) jam nomine tunice musculosæ œsophagi (S. 260.) descriptus est.

MUSCULI UVÆ sive **UVULÆ**, (quæ cum velo palatino pars est pharyngis) sex sunt varia & unum sine pari.

Glosso-staphilinum (b) sive *glosso-palatinum*, oritur utrinque e radice linguae, ascendit versus palatum, & definit in velum.

Pharyngo-staphilinum, utrinque e lateribus pharyngis provenit, & finitur in eodem palati velo. (c)

Thyro-staphilinum emergit ex laterali parte cartilaginis thyroididis, ascendendo versus uvam citius fit, & lateri veli palatini, arcus in modum, inseritur.

Spheno-staphilinum vulgo *Cooperi*, *Cantio*, aliisque, sed rectius *Salpingo-staphilinum* (d): quia ultimis inquisitionibus inveni, illud non ut vix ab osse sphenoide, sed potissimum a tabæ parte posteriori, & quidem partim ex arte ejus membranacea, partim ex ossea oriri (e), oblique inde ad uvam descendit, ejusque parti posteriori inseritur, hinc eam, si imbo agunt, retrahunt.

Pterygo-staphilinum (f), oritur a parte superiora processus pterygoidei & anteriori tubæ, hic vicina: descendit inter utramque illius mellam, tendinemque super apophysi tenui mellæ interioris, quasi per trochleam, ad anteriorem membranæ palatinæ, cui inseritur

a) Tab. 28. 29.

b) *Valsalv.* de aure Cap. II.

c) *Ibid.*

d) Cum *Valsalva* *ibid.*

e) Forte tamen hoc principium, ut in multis aliis, alioque variat.

f) *Vid. Cooper.* Tab. 28. fig. 4. & Tab. nostra VIII. 8.

tur (a), partem reflectit; unde ab hoc parte deorsum & antrosum movetur. A *Valsalva* musculus *novus tubæ* (quamvis diu jam fuerit cognitus) vocatur, qui tubam ab eo dilatam existimat. (b) Vid. plura de hoc infra in explicatione figuræ 38.

6. *Palato-staphilinum*, oritur utrinque ad juncturam ossium palati, principio latiori, & conjunctum cum socio sensim fit angustius, a triangulum repræsentat, qui descendendo uvulæ parti superiori inseritur: eamque sursum & antrosum trahere videtur. (c)

7. *Azygos Morgagni* (d) a tergo paris præcedentis collocatus, oriri videtur tendineus ex junctura ossium palati, & carneus, sed tenuis & teres per medium uvulæ extenditur (e), quod cum glandulis & membrana oris ipsam uvulam constituit. (f)

327 CAPITIS musculi sunt decem paria.

○ *Flexorum*, tria paria, utrinque unus. (g)

○ *Mastoideus*; oritur a sternone atque clavícula: & finitur in processus mastoidei facie externa.

Rectus major anticus; oritur ab 5. inferiorum colli vertebrarum apophysibus transversis, & inseritur ossi occipitis ante ejus processum condyloideum.

Rectus minor anticus, s. *annuens* *Cornu* *ri* (a)

(a) Ibid.

(b) *Cant.* Tab. 3. fig. 2. & Tab. nostra VIII. fig. 38.

(c) *Tr. de aure*

(d) Hujus & *thyro-staphilini* inventionem *Douglas* *Myogr.* pag. xxxv. sibi adscribit: cum tamen jam antea publicatæ erant a *Morgagn.* *Adv.* l. n. 8. nomina tamen *Douglasii* primus ipsis imposuit.

(e) Ibid.

(f) *Cant.* l. c. & Tab. nostr. VIII. fig. 38.

(g) *Conf. de his & pharyngis* *Santerini* Cap. VII. 8.

Nota (73*)

ri (a); origo, facies anterior primæ vertebræ s. atlantis, latet sub præcedenti, & mox post eum inseritur ossi occipitis.

Intenforum, præter communes colli, quinque paria,

Splenius; oritur a vertebra tribus inferioribus colli, & quinque superioribus dorsi apophysibus inprimis spinosis, inseriturque supra processum mastoideum.

Complexus; origo, apophyses transversæ trium vertebrarum superiorum dorsi, & 6. inferiorum colli; priori subjectus, inseritur ossi occipitis juxta præcedentem.

Rectus major posticus; origo, apophysis spinosa epistrophæi, finis, os occipitis.

Rectus minor posticus; origo pars posterior atlantis: finis, sub præcedenti.

Obliquus minor; origo, apophysis transversæ atlantis; finis, supra rectum majorem.

Rotatorum, *Obliquus major*; origo, apophysis spinosa epistrophæi, sive vertebræ secundæ; oblique ascendens inseritur apophysi transversæ atlantis. (b)

ad latus flectentium, *Rectus lateralis (c)*; origo, facies superior apophysis transversæ atlantis; ascendit recta, corpore brevi, sed crasso, & inseritur partim ossi occipitis, partim ossi temporum, juxta incisuram processus mastoidei.

COLLI musculorum sunt

Fle-

2.) Flexionem capitis multum juvat, imo sæpe solum est pondus capitis, hujusque singularis cum prima vertebra articulatio, quando erecti sumus, musculis fere quiescentibus. Winslow. Hist. A. R. 1720.

3.) Cooper. Myotom. fig. III. lit. 1. & Myot. nov.

24.

4.) Hic musculus proprie non est musculus capitis, quia non attingit, sed musculus atlantis; oritur enim ex 2da, & inseritur primæ vertebræ.

Flexorum, duo paria; ut

*C*Scalenus; qui oritur a prima, secunda & quandoque tertia costa, & inseritur in apophyses transversas vertebrarum colli. A *Fallopio*, aliisque, thoracis quoque elevatores refertur nec sine ratione; nam utrique usui servire potest. Angli ex hoc tres scalenos conficiunt, sub nomine *Scaleni primi, secundi, & tertii*; quia sæpe in tres partes dividi potest.

*C*Longus; oritur a corpore superiorum quinque vertebrarum dorsi, & inseritur omnibus vertebris colli.

Extensorum, duo quoque paria vulgo numerantur,

*C*Transversale & Spinale dictum (a), quod vero immerito ab extensore communis dorsi & lumborum, *Longissimo dorsi* dicto, cujus revera pars sunt, distinguitur; de quo vero mox infra. His autem addit *Covuperus* (b)

*C*Interspinales colli, inter apophyses spinosas siti, paria quinque; qui oriuntur a parte superiori apophysis spinosæ vertebrarum quinque inferiorum colli, & quodlibet inseritur in inferiorem partem apophysis spinosæ vertebræ vicinæ superioris.

*C*Ad latus flectentium

*C*Intertransversales, qui inter apophyses transversas siti, oriuntur ex inferiori, & inseruntur vicinæ superiori vertebræ. (c).

In-

(a) *Covuper. Myot. fig. VIII. 1. & k.*

(b) *Ibid. LL. & Myot. nova Tab. 44.*

(c) *Transact. Anglic vol. 23. p. 132. & Covuper. Myotom. Tab. 44.*

Intervertebrales Douglassii (a), valde exigui, & incerti numeri, oriuntur ex corporis vertebræ parte laterali, & oblique ascendunt ad partem posteriorem vicinæ superioris.

SCAPULÆ musculi, nobis sunt quinque paria.

Elevator sive musculus patientiæ: oritur ab apophysibus transversis 1. 2. 3. & 4. vertebræ colli, & finitur in angulo superiori scapulæ.

Trapezius, sive cucullaris: origo, os occipitis, apophyses spinosæ colli, & 7. vel 8. dorsi (*b*); finis, spina scapulæ, acromion & clavicula. Ob diversum vero fibrarum cursum, pro diversa earum actione, scapulam attollere, deprimere, & retrorsum movere potest. (*c*)

Rhomboides: origo, apophyses spinosæ inferiores 5. colli, & superiores 3. dorsi, sub musculo præcedenti; sub quo deinde oblique pergit, & inseritur toti basi scapulæ; quam retrorsum & sursum movet.

Serratus, sive dentatus minor anticus, sive pectoralis minor: oritur sub pectorali majore, principiis dentatis, a 2. 3. & 4. costâ vera; ascendit sub eodem oblique versus scapulam, & inseritur processui coracoideo scapulæ.

Serratus, sive dentatus major anticus; oritur quo-

a) Myograph. p. 85.

b) Douglas originem ad vertebra[m] usque decimam exiit, Myograph. p. 69.

c) Cheselden. negat diversas has actiones, nullamque musc[ul]am in una parte, quiescente reliqua, agere posse concedit, eumque tantum scapulis retrahendis, sive ad se in-tem adducendis, inservire judicat; contra Winslous eum nullam scapulam elevare censet, Hist. Acad. Reg. A. p. ubi & serratum majorem curatius exponit.

quoque dentatis principiis, ab inferioribus sex costis veris, & una vel quandoque duabus superioribus spuris (*a*); oblique ascendit, ac desinit in basi scapulæ. Et duo scapulam movent antrorsum & deorsum; & quia a multis ad elevatores quoque costarum referuntur, hi principium vocant, quod nos finem. (*b*) Hunc vel usum præstare possunt, quando scapula a elevatore, trapezio, & rhomboide musculo firmatur, & immobilis retinetur.

330 RESPIRATIONIS musculi thoracem vel dilatant, vel constringunt.

CDilatatores conjunctim agunt, suntque

CDiaphragma, de quo jam actum S. 257.

Intercostales, quadraginta quatuor, in quorum interstitio costarum duplex, externus & internus; quorum origo est margo inferior costæ superioris; finis vero, margo superior costæ sequentis. Fibrae externorum antrorsum; internorum, oblique retrosum excurrunt, costasque elevant. Con-
Not. 73. *)

Levator costarum Stenonis, Supercostales Verheyeno, (*c*)

CBreves, utrinque duodecim; origo, processus transversi vertebrarum undecim dorsi, & unius, inferioris scilicet, colli: inferuntur oblique in partem posteriorem costarum.

CLongi, tres, vel quatuor; origo eadem a vertebra 7. 8. 9. & 10. finis in costis 9. 10. 11. & 12. (*d*)

Sub-

(*a*) Principia dentata inferiora duo vel tria cum musculis obliquis externis abdominalis coeunt.

(*b*) Douglas Myographia p. 73. & 74.

(*c*) Anatom. Tab. XXXV. fig. 1. ee. ff. Hos musculos jam Cassero & Stenoni notos fuisse ostendit Morgagn. Adv. II. 36.

(*d*) Verheyen. Ibid. fig. 1. ff.

Subclavius; oritur ab inferiori parte claviculæ, juxta acromion, & finitur in costæ superioris parte anteriori & sterni.

Serratus posticus superior; oritur tenui, a lato tendine, a vertebra duabus inferioribus colli, & duabus superioribus dorsi; finitur in costâ 2. 3. & 4. (a)

Serratus major anticus, (pag. 209.) a ple-
risque etiam huc refertur: sed quia sca-
pula costis mobilior, me judice rectius ad
scapulam pertinet. Interea tamen, elevan-
do costas, præsertim in difficili respira-
tione, eum quoque inservire posse, non
negamus.

Scalenus colli, de quo jam supra p. 173.

Constrictores, sive depressores, præter mus-
culos abdominis, huic scopo inservien-
tes, sunt

Serratus posticus inferior; oritur lato tendine
a vertebra tribus inferioribus dorsi, &
duabus superioribus lumborum; finitur in
costis quatuor inferioribus spuris: ambit-
que extensores dorsi, ut vagina, ne fibræ
earum in magnis motibus a se invicem fa-
cile recedant.

Triangularis sterni: oritur ab inferiore & in-
teriore sterni parte, & inseritur utrinque
in cartilagine costæ 4. 5. 6. & 7. veræ.
Verheyenus hunc in plures dividit, eosque
Sterno-costales appellat. (b) A quibusdam
immerito negatur; quia plerumque facile
reperitur.

Intracostales Verheyeni, pleura detracta con-
spicui, 6. 7. 8. vel 9. utrinque: oriuntur
haud procul a capitulis costarum, ascen-
dunt

) Forte hic musculus etiam collum extendit, musculis
colli & dorsi loco ligamenti inservit.

) L. c. fig. 2. a b c d e.

dunt oblique, ac desinunt in costâ superiorî, nunc proxima, nunc altera. (a) Hos musculos ab *Eustachio* jam delineatos fuisse, *Morgagnius* indicat. (b)

¶ *Extensor lumborum & dorsi communis*. §. 33. quoque concurrît ad costas depressandas quia ab osse sacro originem trahit, & multiplici tendine posteriori costarum parti inseritur. (c) *Morgagnius* etiam tendines huius musculi indicat, quibus munus costas elevandi adscribit. (d)

331 DORSI & LUMBORUM musculi maximam partem sunt communes: iique vel

¶ *Extensores*, quorum vulgo tres utrinque numerantur; ut

¶ *Sacrolumbaris*: cujus origo, os sacrum & spina posterior ilei; finis, in costarum parte posteriore.

¶ *Longissimus dorsi*; origo, ibidem; finis, partim in omnibus vertebris spinæ dorsi & nominatim in apophysibus earum transversis; partim in costis. (e)

¶ *Semispinosus*; origo, os sacrum & lumborum vertebræ, finis, in superioribus vertebris thoracis, apophysibus præsertim spinosis. Sed quia hi tres ita inter se cohærent, ut sine laceratione toti separari aut dividi raro vel nunquam possint, atque in eandem actionem conspirant, rectius pro uno *Extensore communi lumborum, dorsi, & colli* habentur. (f) Si i

uno

(a) Ibid. fig. 3. dd. ee.

(b) Advers. Anat. II. p. 36. vid. *Mangetti* Theatr. anat. Tab. *Eustach.* XVI. fig. 2.

(c) *Verheyen*. fig. 1. bb.

(d) Adv. II. p. 38. (e) *Morgagn.* Adv. II. p. 38.

(f) Hos musculos alternatim quoque agere, dum incedimus, elevando ossa innominata, percipi posse applicatione manuum ad lumbos, indicat *Chefelden.* Anat. p. 73.

uno latere tantum agunt, dorsum oblique ad latus trahunt.

(Flexores, præter musculos abdominis, flexioni tam antrosum, quam ad latus inservientes.

(*Quadratus lumborum*, cujus origo in anteriori & superiori parte posterioris ossis ilei processus; finis in apophysibus transversis vertebrarum lumborum, ultima thoracis vertebra, & costa ultima.

(*Psoas parvus*, qui oritur tendine tenui ex osse pubis, ubi ileo jungitur, & inferitur lateri vertebræ supremæ lumborum. (a)

Intertransversales lumborum exigui a *Douglas* describuntur, qui inter transversas lumborum apophyses siti, oriuntur ex ora unius, & inferuntur in vicinam, moventque ad latus. (b)

BRACHII vel HUMERI musculi sunt novem.

(Elevatores, tres, (c)

(*Deltoides*: oritur a clavicula, acromio, & spina scapulæ; finitur ad latitudinem quatuor digitorum sub collo humeri.

(*Supraspinatus*; origo, cavitas supra spinam scapulæ; finis, collum humeri.

(*Coraco-brachialis*; origo, processus coracoides scapulæ; finis, pars media brachii.

Q

De-

a) Hic musculus sæpe deficit; quando vero adest, cum strato etiam ad elevanda ossa innominata, præsertim, quando decumbimus, inservit, ejusque inventionem *Riolano* tribuit *Douglas* Myograph. p. 90.

b) Ibid. p. 91.

c) His succurrunt adductores, & abductores, ut demonstrat *Winslow* Hist. Acad. Reg. A. 1720.

Depressores, tres; (quos pondus brachii juvat.)

Infrascapularis; origo, tota facies interna scapulæ; finis, pars inferior capitis humeri.

Rotundus, sive *Teres major*; origo angulus inferior scapulæ; finis tres digitos infra caput humeri.

Latissimus dorsi, *Aniscliptor* quoque dictus; origo, pars posterior spinæ ilei, spinæ superiores ossis sacri, omnes apophyses spinosæ lumborum, & septem inferiores dorsi; jungit tendinem cum priori, & eidem loco inseritur.

Adductor; unus, *Pectoralis major*; origo, clavicula, sternum, & omnes costæ veræ finis ad latitudinem 4. digitorum infra caput humeri. Hujus actionem a coraco brachiali musculo, & deltoidis actionem a parte suprema hujus pectoralis, (quæ plerumque distinctus quasi musculus est) juvari existimamus.

Abductores, duo;

Infraspinatus; origo, cavitas infra spinam scapulæ.

Rotundus, sive *Teres minor*: origo, costa inferior scapulæ. Hi duo proprie unicum constituunt musculum: atque etiam tantum unum conficiunt tendinem, qui inseritur pari posteriori.

333 CUBITI muscoli sunt VI.

Flexores, duo:

Biceps: qui oritur tendineus, altero capite, eoque latiori, a processu coracoideo; altero, tereti & longo, parte superiori acetabuli scapulæ. Hoc in sulco humeri sub ligamento articuli descendit, fit carneum, jungitur cum priori, pergit juxta insertionem

nem deltoidis in anteriori brachii parte, & definit partim tendine tereti in radii tuberculo, mox infra capitulum ejus superius; partim, tendine lato, in membranam communem, musculos in cubito sitos cingentem: qui tendo in venæ sectione læsus gravia sæpe symptomata inducit. (a)

Brachialis internus; oritur, mox infra finem deltoidis, & inseritur ulnæ tuberculo, mox infra capitulum ejus superius.

Extensores, quatuor.

Longus: oritur a costa inferiore scapulæ.

Brevis: oritur a spina externa humeri.

Brachialis externus: oritur juxta præcedentem a spina interiori humeri. Hi tres musculi tendines adunant, & quasi unum tricipitem conficiunt, qui parti posteriori olecrani inseritur, & *Triceps brachialis* commode vocari posset.

Anconæus; parvus est musculus; cujus origo exterior est condylus humeri, finis mox infra præcedentes.

34 RADII sunt quatuor;

Pronatores, duo; *Rotundus*: qui oritur a condylo interno humeri: & finitur in parte fere media radii.

Quadratus: origo, pars inferior ulnæ; finis, e regione, in radii parte inferiori.

Supinatores, duo; *Longus*; principium, spina exterior humeri; finis, capitulum inferius radii (b)

Brevis: oritur partim a

Q 2

con-

) Delineantur hæc eleganter a Cowpero Myotom. nov. I. & ab eodem describuntur p. 74. Conf. & Winslow A. R. 1720. qui hunc musculum etiam *supinatorem* & *elevatorem brachii* esse ostendit.

Hic musculus etiam ad cubitum flectendum facere potest.

condylo externo brachii, partim a parte superiori & exteriori ulnæ, & inferitur in partem superiorem radii, quam totam amplectitur.

335 MANUS sive CARPI musculi sunt sex.

Flexores, tres; oriundi a condylo humeri interno; ut

Radiceus internus, qui juxta radium pergit versus pollicem; ubi sub abductore ejus transit, & abit in capitulum superius ossis metatarsi indicis.

Ulnaris internus; finitur in officulo carpi interno ordinis 1.

Palmaris; tendine lato, expanso, inferitur palmæ manus, quam quoque aliquo modo constringere videtur.

Extensores, quoque tres; qui omnes oriuntur a condylo humeri externo, suntque

Radiceus externus, *Longus*, & *Brevis*, alia quoque *Bicornis* dictus (a); quorum alter parti exteriori ossis metacarpi primi; alter, ossis metacarpi secundi inferitur.

Ulnaris vel Cubitalis externus desinit in osse metacarpi, digitum auricularem sustinente.

Si musculi radiæ omnes simul agunt, quiescentibus ulnaribus, manus extrorsum movetur; & contra, quando duo ulnares, quiescentibus radiæis, simul agunt, trahitur manus introrsum. Coercentur quoque hi musculi prope carpum a ligamento, vulgo *annulari* dicto, quod vero ligamentum non *annulare* in sectionibus reperitur, sicut vulgo pingi solet; sed est potius membranæ communis, omnes musculos, in cubito & carpo collocatos, ob meliorem ipsorum actionem includentis pars, cui in præparationibus figura annuli datur. (b) I

der-

(a) Quandoque *tricornium* reperi.

(b) Vid. *Vesalii Musculor. Tab. 1. & 2.*

dorso carpi robustius est, & fibræ annulares in eo deprehenduntur.

36 PALMÆ manui alias duo constrictiores adscribuntur, quorum primus est *Palmaris*, jam inter flexores manus, cui magis, quam palmæ, inservit, descriptus. Alter *caro quadrata*, sive *palmaris brevis*, vulgo appellatur: qui, ut parva massa carnea, variis sæpe tendinibus distincta, aponevrosi palmaris longi, super musculo abductore auricularis, inhæret, volamque eo constringi volunt. Utrumque hunc palmarem & ego & alii sæpius deficere observavimus.

37 DIGITORUM MANUS musculi sunt vel *communes*, vel *proprii*:

Communes sunt ut plurimum tredecim: ut
Flexores phalangæ

(*primæ*, *Lumbricales* IV. qui oriuntur a tendinibus profundi, unico plerumque principio, & inseruntur lateribus, pollicem respicientibus, phalangæ primæ, IV. digitorum. N. (74^{*})

(*secundæ*, *sublimis* seu *Perforatus*: provenit a condylo humeri interno, & radio; dividitur in IV. tendines, qui inseruntur phalangæ secundæ quatuor digitorum. (74^{*})

(*tertiæ*, *Profundus* sive *Perforans*; cuius origo, pars superior & media ulnæ, in quatuor quoque tendines divisus, perforat tendines præcedentis, & desinit in initium phalangæ tertię, quatuor digitorum. (a)

Extensor omnium trium phalangerum, *Extensor communis* dicitur: cuius origo est condylus

Q 3 ex.

(a) Hi duo musculi sub ligamento transverso carpi transeunt, eorumque tendines, vagina forti membranacea inclusi, firmiter junguntur ossibus digitorum, ne flexionis tempore recedant.

externus humeri, ac pars posterior radii & ulnæ; dividitur deinde in quatuor tendines sub ligamento annulari & transverso carpi transeuntes; quorum finis est facies posterior sive gibba omnium trium phalangarum.

Interossei sex sunt, tres externi, tres interni
C Conf. Tab. IX.

C *Externi* tria interstitia inter ossa metacarpi in dorso manus occupant; (attamen & in vola videndi) & quilibet utrinque a vicinis ossibus metacarpi oritur; quorum vero primus inseritur in externum latus digiti medii, alter in ejusdem latus internum tertius in latus externum auricularis.

C *Interni*, in vola manus solum conspicui, ossibus metacarpi non interponuntur, ut externi, sed superponuntur; omnes vero oriuntur a parte ossis metacarpi, cui incumbunt, carpo vicina, & primus lateri interno indicis, alter alteri externo annularis, tertius lateri externo auricularis committitur. (a)

338 POLLICIS proprii V.

Flexor; origo, pars media radii; progreditur sub ligamento carpi, & desinit in tertia phalanga.

Extensor, *Bicornis* vel *Tricornis* dictus; oritur in parte posteriore & media ulnæ ac radii, & desinit, duobus vel tribus tendinibus, in 1. 2. & 3. phalanga.

Thenar sive *Abductor*; cujus origo est ligamentum transversum, ossa carpi conjungens & os carpi pollicem sustinens; finis vero, phalanga 1. & 2. In tendine hujus & sequentium duorum musculorum hærere solent due ossa sesamoidea pollicis, & speciatim in hujus externum. (b)

Hypo-

(a) Plura de his vid. N. (75).

(b) Quandoque tendinem dat extensori pollicis.

Hypothenar; oritur juxta præcedentem ab eodem ligamento & osse, magis volam versus, & desinit in os sesamoideum externum & capitulum inferius phalangæ primæ, quam flectit. A multis omittitur, quia pars præcedentis haberi solet.

Antithenar, sive *Abductor*; oritur ab osse metacarpi digiti indicis ac medii, & inseritur phalangæ 1. & 2. continetque os sesamoideum internum (a).

39. INDICIS tres sunt proprii.

1. *Extensor*, seu *Indicator*: cujus principium est media ulna, & finis idem cum extensore communi.

2. *Abductor*: origo, phalanga prima pollicis, & os primum metacarpi; finis, phalangæ primæ indicis latus externum (b).

3. *Abductor* proprius, revera est interosseus internus primus; Tab. IX. fig. 11. D. qui, ut §. 337. dictum est, oritur ab osse metacarpi indicem sustentante, & desinit in externum indicis latus.

40. DIGITI MEDII proprii, duo sunt, adductor & abductor:

1. *Adductor*: est interosseus externus primus A.

2. *Abductor*, interosseus externus secundus B, fig. 1. & 11. quorum descriptio vid. §. 337.

DIGITI ANNULARIS proprii itidem duo:

1. *Adductor*, qui est interosseus internus E, fig. 11.

2. *Abductor*; interosseus externus C. fig. 1. & 11.

Q 4

quo-

(a) Notandum, quod in musculis pollicis æque ac aliorum digitorum sæpe variationes occurrant, ita ut nulla eorum descriptio dari possit, quæ cum omnibus subjectis conveniat: *Extensor* enim pollicis modo *bicornis*, modo *tricornis* est: subinde *Flexores* duo reperiuntur, ut *Couperus* in *Myotom.* notavit pag. 216. atque sic etiam variationes in aliis digitis observantur. Conf. *Morgagn.* Adv. II. 40.

(b) In tendine hujus Musculi, ubi transit capitulum ossis metacarpi, digitum hunc sustentantis, aliquandiu osseculum sesamoideum observavi.

C quorum origo & insertio quoque vid. S. 337.
DIGITI AURICULARIS proprii tres sunt;

1. *Extensor* proprius, videtur pars extensori communis, cum quo etiam origine & fine convenit.

2. *Abductor*; cujus origo, os interius metacarpi & carpi; finis, latus internum phalangæ primæ. (a)

3. *Adductor*; oritur a ligamento carpi transverso, & ossiculi interioris carpi acuto processu, atque toti interiori ac concavæ parti ossis metacarpi digiti auricularis se inserit. hocque adducendo simul digitum auriculari

rem adducit; adeoque huc referri potest. (b)

341 Revertimur jam a brachiis ad abdomen, ut musculos ad hoc pertinentes adhuc describamus, & deinde ab his ad pedes progrediemur.

342 De ABDOMINIS MUSCULIS jam S. 205. & de Clitoridis, S. 234. actum est; sed restant adhuc musculi testiculorum, penis, urethræ, ani, vesicæ, & vaginæ uteri describendi.

343 **MUSCULUS TESTICULI**, *Cremaster*, sive *Elevator* dictus, est tenuis series fibrarum muscularium, quæ oriuntur modo a musculo oblique ascendente abdominis, juxta locum illum, ubi a vasis spermaticis perforatur; modo a transverso (c), modo ex ipsa spina ilei. (d) Inde cum processu peritonæi, cui firmiter junguntur, in scrotum descendunt, atque superunicam vaginalem, quæ testem includit, expanduntur. Quando hæ constringuntur, testem elevant. In emaciatis corporibus sæpe adeo tennes sunt, ut difficulter in conspectum prodeant.

344 **PENIS MUSCULI** proprie tantum sunt duo, **ERE-**

(a) In hoc musculo frequenter reperitur ossiculum testimoideum, Tab. I. fig. 5. lit. c. a nobis delineatum.

(b) Confer. Winslow Hist. Acad. Rég. A. 1720.

(c) Santorini. obs. cap. IX. 1. (d) Vid. hujus delineatio in Cowperi Myotomia nova Tab. XVII.

ERECTORES scilicet, qui utrinque oriuntur ab ossibus ischii, inter hujus tuberculum, ac initium corporis cavernosi, & quilibet lato tendine in corpus cavernosum suilateris inseritur. (a) Qui, dum simul agunt, premunt venas dorsi penis contra ossa pubis, refluxum sanguinis ex pene impediunt, atque sic, quando sanguis fervidus, & quasi ebulliens, in affectu venereo per arterias copiose influit, ejus erectionem efficiunt. (b) *Acceleratores* vero musculi atque *Transversales* dicti, quia proprie non ad penem, sed ad urethram pertinent: eos jam sub urethræ musculis describemus.

URETHRÆ VIRILIS MUSCULI sunt vel Dilatatores, ut

(*Transversi*, sive *Transversales* (c); oriuntur plerumque (si ad sunt) utrinque ex ossium ischii tuberculo, & inseruntur ut plurimum in bulbi urethræ partem posteriorem: quam, dum agunt, distendunt. (d)

(*Dilatator posticus* sive *triangularis*, sæpe perquam exiguus, quandoque duplex, (e) oritur e parte antica sphincteris ani, & inseritur in partem posticam & inferiorem acceleratorum, aut bulbi urethræ. Hic musculus alias pro sphincteris ani parte a *Riolano* (f) fuit habitus, ad bulbum ure-

a) Ibidem Tab. XVII. & XIX.

b) *Schelhamerus* negat hunc effectum, in *Analect. at. diss. XII. Cheselden.* vero de eo solum dubitat in *atom. edit. tertia & Waltherus* quoque aliter sentit *ner. musculor. Anatom. p. 17.*

c) *Bartholin.* Anat. l. I. Cap. 24. *Bidloo* Anat. Tab. fig. 5. l. *Cowper.* Myot. reform fig. X. & XII. lit. *Drak.* Anthropol. Tab. VI. & VII. EE.

d) Hos musculos quandoque deesse, eorumque ortum, tum, numerum, & insertionem sæpe variare observavi, & notarunt *Morgagn.* Adv. IV. Anim. 20. *Cowper.* ot. nov. Tab. XVII. & XIX. *Santorin.* p. 182.

e) *Morgagn.* ibid. (f) Cap. de musc. ani.

urethræ extensa ; sed *Littrius* eum peculiari musculo primus agnovit atque descripsit . (*a*) Videtur hic musculus *antagonista* cum *acceleratorum* , tum *erectorum penis* , dum penem ab osse pubis , post ejectionem seminis , retrahit , sic sanguini liberum refluxum restituit .

Constrictores , sunt illi , ita dicti ,

ACCELERATORES urinæ : qui oriuntur partim a musculo præcedente ; partim & præcipue utrinque a corporibus pen-
nervolis ; oblique pergentes ambiunt tum bulbum & inferiorem spongiosam partem urethræ ; atque in lineam , quæ ex horum concursu sæpe efficitur , bulboque adhæret , inseruntur . Hinc agendo , constringunt urethræ partem posteriorem , quo urinam ex urethra , at præcipue in coitu , semen expellunt .

Santorinus adhuc novos urethræ projectores & elevatores , ut & prostatarum musculos describit (*b*) ; ubi vero præter ani levatores nil nisi membranas vidi .

346 **MUSCULORUM ANI** tres vulgo numerantur , unus *sphincter* , & duo *levatores* . (*c*)

Sphincter ani , extremum intestini recti claudens ,

(*a*) *Hist. A. R.* 1700. Hunc tamen cum *Vesalio* rursus sphincteris ani partem esse contendit *Santorin.* p. 179.

(*b*) *Ib.* p. 181. & seq. conf. *Walther.* *Tener. musc. anat.* p. 1.

(*c*) In nullis fere musculis auctores magis dissentiunt quam in musculorum ani descriptione ; quemadmodum & præstantissimis & accuratissimis anatomicis , nominatim *Riolano* , *Anthropogr.* lib. 5. cap. 40. *Covvpero* *Myotom.* seu *novæ* pag. 13 *Douglas* *Myographia* pag. 66. *Morgagn.* *Anat. vers. anat.* III. p. 89 & seq. *Santorin.* *observ.* p. 164. sepe videri potest : nam non solum in numero , sed quam maxime in origine , progressu , cursu , figura , & insertione describenda tantopere variant , ut inter se conciliari vix possint : quod subjectorum diversitati , an aliis causis sit ascribendum , uberius inquirendum erit . Ego nunc eam descriptionem dabo , sicut in ultimis sectionibus eos observavi .

dens, ortum trahit ex ima parte ossis coccygis & cute huic subiecta; ejusque fibræ, a se invicem discedentes, & anum utrinque ambientes, ascendunt, atque in viris in partem infimam bulbi urethræ, sive in musculos acceleratos, bulbum hunc investientes; in feminis vero in imam vaginæ uteri partem inferuntur. Multæ tamen etiam fibræ ab ossis pubis parte interiori, & inferiori, prope synchondrosin utrinque descendunt, & figura quasi ovata, latitudine circiter pollicis, extremum intestini recti ambiunt, illudque constringunt sive claudunt. Meræ vero circulares aut annulares fibræ, ut vulgo sphincteri adscribuntur, vix aut paucae observantur.

Levatores utriusque oriuntur amplo principio, ab interna parte ossis pubis, tunica obturatoris interni, interna parte ossis ilei, & acuto processu ischii, unde fibræ instar radiorum a circumferentia ad centrum quasi pergunt versus sphincterem, atque in parte intestini posteriori, quod cingunt, coeunt, includendo simul collum vesicæ, prostates, & vesiculas seminales in viris; in feminis vero vaginam uteri; & inferuntur partim in supremam & posteriorem sphincteris partem, partim confundunt fibras cum sphincteris ovatis & annularibus, atque sic non tantum sustentando levandoque ano, verum etiam exprimendis vesiculis seminalibus & prostaticis in coitu inservire possunt.

præter hos *levatores*, quos majores appellat Douglas (a), *levatores minores* quoque cum Riolo describit: qui oriuntur partim tendinei, partim carnei, a protuberantia ischii; transversim inde feruntur versus anum, atque inferuntur.

a) Myograph. p. 68.

runtur in sphincterem ejus, haud procul bulbo urethrae. (a)

OSSIS COCCYGIS muscoli duo quoque observati sunt, (b) utrinque unus, *coccygeus* dictus, qui ano inservire videntur; ortum ducunt ab apophysi acuta & posteriori ischii, & utrinque lateribus ossis coccygis implantantur. Hi attrahendo os coccygis levatoribus ani succurrunt, illudque nimis retrorsum pressum in statum naturalem ad anteriora reducunt, impediuntque, ne facile luxari, aut nimis retrorsum cedere queat.

347 MUSCULI VESICÆ duo numerari solent
 { *Sphincter vesicæ*, 222. descriptum, &
 { *Detrusor urinæ*, ibidem jam descriptus (c)
 nihil aliud est, quam tunica muscularis vesicæ, sphincteris antagonista, qua urina e vesica expellitur. (d)

348 VAGINÆ UTERI SPHINCTER sive *constrictor* est series fibrarum muscularium, quæ oriuntur a sphinctere ani, orificium vaginae utrinque complectuntur, & in crura clitoridis infe-

(a) Quomodo in muliere hic se habeat, *Douglassius* tacet. Ego tamen etiam aliquando in mulieres tales vidi; superiori parte protuberantiæ ischii, prope exortum erectorum clitoridis, oriebantur, & in sphincteris partem superiorem, ubi vaginae jungitur, inferebantur. *Santorinus* p. 206. mulieribus musculos transversales tribuit, quos cum transversis penis virilis comparat, eosque tab. 2. lit. gg. delineat, cum quibus mei valde conveniebant, vel iidem erant. An hi muscoli semper adsint, ignoro, itemque, utrum cum *Douglassio* ad ani, an cum *Santorino* ad vaginae siniferendi, hæreo, aliisque dijudicandum relinquo.

(b) *Douglas* Myograph. p. 143. *Cheselden*. Anat. Morgagn. Adv. III. pag. 94.

(c) Vid. figur. in *Cheselden*. Tr. de Lithot. & *Couper* Myot. nova.

(d) *Bianchus* in *Manger*. Theatr. anatom. p. 414. novos vesicæ musculos elevatores & depressores describit, eosque duabus tabulis delineat. Verum a *Morgagn*. Adv. III. p. 75 seq. itemque a *Santorino* obs. cap. X. N. 10. impugnantur.

inferuntur , quibus os vaginæ angustatur , & penis in coitu blande afficitur .

atorinus plures musculos vaginæ & urethræ muliebris describit , quos vero invenire adhuc non sicut . (a)

FEMORIS musculi sunt XIV.

Flexores sive *Elevatores* proprii , tres ; (b) ut

↳ *Psoas magnus* ; qui oritur a prima , secunda , tertia , & quarta lumborum vertebra .

↳ *Iliacus* ; cujus origo , tota cavitas interna ilei ; finis vero utriusque , trochanter minor femoris .

↳ *Pectineus* s. *Lividus* ; cujus origo , pars superior ossis pubis ; finis vero , 4. digitos infra priores .

Extensores , sunt *Glutai* tres ; *maximus* , *medius* , & *minimus* ; qui omnes oriuntur in superficie externa ilei & ischii ; maximus vero etiam ex ossis sacri & coccygis ; sed maximi , est ad 4. digitorum distantiam infra trochanterem majorem , medii & minimi vero , in ipso hoc trochantere .

Abductores , quinque ;

↳ *Fascia lata* , sive *Membranofus* , vid. pag. seq.

↳ *Quadratus* : origo , tuberculum ischii ; finis , eminentia inter utrumque trochanterem .

↳ *Pyriformis* ; prodit crassus ab illa parte ossis sacri , ubi ossi ileo jungitur .

↳ *Gemini duo* ; { *superior* , a spina posteriore & inferiore ilei .

{ *inferior* ; a tuberculo ischii ; (c) atque tres inferuntur sinui trochanteri majoris .

Addu-

a) L. c. p. 207. seq.

b) His vero varii succurrunt : ut *adductor triceps glutæ* , *fascia lata* , & , ut *Voinslous* notat , *rectus* quoque . Hist. Acad. Reg. A. 1720.

c) Duo *Gemini* firmiter concreti plerumque reperiuntur .

Adductor, Triceps; cujus caput primum & secundum oritur juxta synchondrosin pubis tertium a tuberculo ischii, & inseritur to spinæ femoris.

Rotatores, qui & Obturatores dicuntur, duo *Cinternus*; oritur a circumferentia interna margini foraminis ossis pubis, transit ischii incisuram posteriorem, & inseritur foveæ juxta trochanterem majorem.

Cexternus; a circumferentia externa prædicti foraminis oritur, & eidem fere loco, ut præcedens, inseritur.

Hi muscoli etiam abductoribus succurrere possunt.

350 **TIBIÆ**, undecim muscoli numerantur;

Abductor, Fascia lata, sive Membranosus dictus, oritur carneus a spina anteriori & superiori ilei exterius, mox vero infra trochanterem majorem totus fit membranaceus, includit arte musculos in femore locatos, partique superiori tibiæ juxta capitulum fibulæ inseritur, unde & per totam tibiæ aponevrosin suam emittere videtur. (a)

Adductor & Elevator, Sartorius, intus a spina ilei anteriori & superiori prodit, atque oblique descendens interiori ac superiori tibiæ parti implantatur: quam una cum femore, super alterum femur, ut sartores sedere solent, movet.

Extensores, quatuor, in anteriori femoris parte siti:

Re-

tur cum obturatore interno: hinc a quibusdam non ut distincti describuntur, sed ad hunc musculum obturatorem referuntur.

(a) Intervit simul ad femur, cui valido tendine neſtitur, adducendum, itemque ad hoc & tibiæ elevandam: hinc musculus hic, alique horum nonnulli ossi utrique communes sunt.

Rectus : ortum habet a spina anteriori & inferiori ilei. (a)

Cruralis, sub priori situs : a tota anteriori parte femoris.

Vastus internus ; a tota parte postica & interna femoris.

Vastus externus ; a tota parte postica & externa ejusdem.

Hi quatuor robustum tendinem communem mox supra genu conficiunt, cui posterius patella inhæret ; qui deinde infra genu tuberculo tibiæ infigitur.

Flexores, quinque ut

Gracilis : prope synchondrosin pubis oriundus.

Semimembranosus : a tuberculo ischii, superius.

Seminervosus ; ab eodem tuberculo, posterius.

Hi tres inferuntur parti interiori & superiori tibiæ. (b)

Biceps : origo capitis primi, tuber ischii ; secundi, pars femoris media : finis pars fibule superior.

Popliteus : parvus est, & oritur tendine tereti a condylo exteriori femoris, tendineusque transit sub poplite introrsum ; ubi carneus fit, atque in superiori & interiori tibiæ parte finitur.

PEDIS EXTREMI, sive TARSI, sunt octo muscoli ; (c)

Flexores, tres ; ut

Ti-

) Elevatoribus femoris ac sartorio quoque succurrit, nemque una cum pectinaeo, psoa, iliaco, & glutæis, ante *Winslow* loc. cit. perficit.

) Omnes fere tibiæ muscoli vario modo se invicem & his quoque musculos adjuvant, atque vix ullus est eorum, qui præter usum primarium ad alias actiones non currat.

) Hi tarsi & nonnulli digitorum muscoli robustis, in his circa malleolos, coercentur ligamentis, specie actionis tempore importune exsiliant, & ut actionum musculorum dirigant. Vid. *Vesalii* musculor. T. I. & atque illa, quæ cap. de ligamentis addidit.

Tibialis anticus ; cujus principium , facie tibiæ superior & exterior ; finis , cuneiforme internum , & metatarsi internum .

Peroneus anticus minor ; origo , pars quasi media & anterior fibulæ , finis os metatarsi exterius .

Peroneus anticus major ; origine & fine cur præcedenti fere convenit . Vid. (76 *)

Extensores , tres ;

Gastrocnemius ; cujus origo sunt duo condyli femoris . (a)

Plantaris : principium , pars interior condyli externi . (b)

Solaris ; provenit a parte superiore & posteriore tibiæ ac fibulæ . Horum trium musculorum corpora conjuncta *suram* : sed tendines juncti robustissimum *tendinem* , *chordam Achillis* dictum constituunt , qui inseritur calcanei parti posteriori . (c)

Adductor , *Tibialis posticus* , cujus origo superior pars ligamenti interossei & tibiæ ; finis os naviculare . (d)

Abductor , *Peroneus posticus* ; initium , pars superior fibulæ ; sed tendo ejus reflectitur sub

(a) In duobus his principiis cum *Vesalio* , *Riolano* , & *Drakio* duo illa ossa sesamoidea , Tab. nostra I. fig. 2. delineata , observavi , & quandoque cum *Fallopio* & *Covvper* tantum unum , in externo horum musculorum . Conf. *Morgagn.* Advers. II. p. 64.

(b) In origine hujus musculi se os sesamoideum reperisse affirmat *Cheselden.* Anat. p. 34. eum vero musculum quandoque deficere notavit *Covvperus* & *Morgagn.* Adv. II. 4.

(c) De tendinis hujus ruptura controversia cum *Petio* vid. *Andry* Examen p. 34. seq.

(d) Hic musculus sæpe duplicem tendinem habet ; unde *bicornis* est , & quandoque omnino in duos musculos dividi potest ; hinc quidam duos *tibiales posticos* numeravit *longum* & *brevem* .

sub osse cuboide, infra tarsum pedis, & inferitur ossi metatarsi, quod pollicem sustentat. Hujus tendini in annosioribus, ubi sub osse cuboide transit, os *sesamoideum* inhæret.

2 DIGITORUM PEDIS musculi sunt vel communes, vel proprii;

Communes, si interossei huc referuntur, sunt V. ut Extensores duo; nimirum

Longus; origo, pars superior tibiæ & ligamenti inter tibiā & fibulam pars anterior; divisus in quinque tendines; quorum quatuor superius in quatuor digitorum phalangas, quintus in os metatarsi extimum inferitur. (a)

Brevis; ortus, calcanei pars superior & anterior; dividitur nunc in quatuor, nunc in tres tantum (b) tendines, qui tribus, vel quatuor pollicis proximis, digitis inferuntur.

Flexores, robusta aponevrosi obducti (e) phalangerum

Primarum, Lumbricales IV. quorum origo, tendo *musculi perforantis*, & pars calcanei interior; finis, in digitorum facie interiori.

secundarum, Perforatus; prodit a facie calcanei inferiori & interiori; dividitur in quatuor tendines perforatos, finitur in ossium phalangæ secundæ capitulis posterioribus.

Tertiarum, Perforans; origo, pars tibiæ posterior, superior, & media; divisus quo-

R que

a) Hæc pars quinta proprie flexorem tarsi constituit, sæpe distinctum musculum efficit, hinc eum nu. præcæti ad musculos flexores pedis nomine *Peronæi antici* retuli. Conf. N. (76 *). Quandoque tamen etiam ue ad minimum digitum excurrit.

b) Hoc *Douglas* alique varii non notarunt.

c) Quam *Douglas* egregie descripsit *Myogr.* p. 155. 156.

que in quatuor tendines, priorem perforantes, qui desinunt in phalanga tertia.

Abductores; *Interossei in* }
terni IV.

Abductores; *Interossei ex-* }
terni III.

de quibus mox
 S. 354. plura. (a)

353 **PROPRII** sunt vel pollicis, vel reliquorum digitorum.

POLLICIS musculi proprii sunt septem.

Extensor longus; cujus origo, antèrius, a ligamenti interossei & fibulæ parte fere media; finis, phalangæ primæ & secundæ facies gibba sive superior.

Extensor brevis; cujus origo, pars superior & anterior calcanei prope astragalum, finis ibidem, ut prioris. Videtur hic musculus sæpe pars extensoris communis brevis digitorum, præsertim quando hic tantum tendines mittit ad tres priores digitos, ut aliquoties vidi. (b)

Flexor longus; origo, pars fibulæ posterior finis, phalangæ ultimæ pars inferior.

Flexor brevis; origo, os cuneiforme medium, finis ossa duo sesamoidea pollicis, quæ hujus primæ phalangæ per ligamenta junguntur.

Abductor, sive *Thenar*; origo, latus internum calcanei & ossis navicularis: finis, latus internum pollicis, in osse sesamoideo interno. (c)

Adductores, scilicet ad reliquos digitos,
Antithenar; origo, os cuneiforme tertium & cal-

(a) Omnes hos interosseos unicum tantum esse musculum vult Gouey *Chyrurgie veritable* p. 211.

(b) Idem notatum inveni a *Coupero* *Myograph.* p. 215.

(c) Latus internum, ubi pollex situs est; sed externum hic vocamus, quod reliquos digitos respicit, quod a *Coupero* aliisque invertitur.

& calcanei pars anterior; finis vero os sesamoideum externum . (a)

Transversalis; origo os quartum metatarsi, finis juxta præcedentem. Hic musculus etiam digitos ad pollicem, aut ad se invicem adducere videtur.

4 Musculi proprii reliquorum digitorum .

DIGITI PRIMI, sive pollicis proximi duo sunt;

1. *Adductor*; inter pollicis & primi digiti ossa metatarsi situs, totum spatium interosseum occupat, tam in superiori, quam in inferiori pedis parte conspicuus. Oritur ab ossis metatarsi secundi capitulo posteriori, & latere pollicem respiciente, partim superius, partim inferius, & in latus internum, pollicem respiciens, primi digiti inseritur. Vocatur vulgo *interosseus externus primus*.

2. *Adductor*; situs, os inter metatarsi secundum & tertium, oriundus utrinque ex secundo & tertio osse metatarsi, replens superne totum hoc interstitium, & inseritur in latus externum digiti primi, ac *secundus est interosseus externus s. superior*. (b)

DIGITI SECUNDI sive MEDII, musculi proprii sunt duo;

1. *Abductor*: inferne in eodem interstitio tantum videndus, provenit ex tota concava sive inferiore parte ossis metatarsi tertii,

R. 2 & in

(a) *Couperus* eum pro adductore minimi digiti habet, *Myograph.* p. 214. & *Casseri* inventionem tribuit: attamen inferi scribit, non in minimum digitum, sed in os metatarsi, minimo digito proximum, p. 223. Igitur pro musculo minimi digiti proprie haberi nequit, attamen digitum minimum una cum quarto ad pollicem adducere potest, præsertim cum viderim in eodem cadavere ipsum in altero pede osse quarto, in altero ex interstitio inter quartum & quintum os, quasi ex musculo interosseo prodire.

(b) *Interossei pedis externi* rectius *superiores*, *interni* vel *melius inferiores* dici possunt.

& in medii digiti latus internum abit. Estque *interosseus inferior* s. *internus primus*.

2. *Abductor*; oritur utrinque ex tertio & quarto osse metatarsi, & in digiti medii latus externum immittitur, estque *interosseus externus tertius*.

DIGITI TERTII musculi proprii duo sunt,

1. *Adductor*; cujus origo, concava superficies ossis metatarsi quarti; finis in digiti tertii latere interno. Est *interosseus externus secundus*.
2. *Abductor*; superne inter quartum & quintum os metatarsi situs, utrinque ex ossibus vicinis ortum trahens, finitur in latere externo digiti tertii, seu minimo proximi, estque sic *interosseus externus* s. *superior quartus*.

DIGITI MINIMI musculi proprii tres sunt;

1. *Adductor*: ex concava sive inferiori ossis metatarsi quinti facie prodit, & in digiti minimi latus internum desinit, estque vulgo *interosseus externus tertius*.
2. *Abductor*, oritur partim ex parte inferiori & anteriori calcanei, partim ab osse metatarsi quinto, inseriturque lateri exteriori primæ phalangæ.
3. *Flexor proprius*; cujus origo, partim capitulum posterius ossis metatarsi quinti, partim calcaneus: finis vero, pars inferior primæ phalangæ.

COMPENDII ANATOMICI

P A R S II.

A D E N O L O G I A .

55 **A**DENOLOGIA est doctrina de glandulis, quas Græci *αδένες* vocant, Latini vero *glandulas*, a glandibus forte quercinis, quarum figuram nonnullæ æmulantur. *Adenologia quid?*

356 Partes, quibus veteres glandulæ nomen dederunt, quamvis tam varia figura, magnitudine, & colore se offerant, a vulgo tamen, quod mirandum, facile cognoscuntur: definitionem vero, sive descriptionem earum dare, quæ omnes veras glandulas comprehendat, & nullis aliis partibus sit communis, quas veteres, tam nomine, quam re, a glandulis distinctas esse voluerunt, aliudque nomen indiderunt, res est adeo difficilis, ut præstantissimi, acutissimique viri iducusque præstare non potuerint. *Definitio glandularum difficilis.*

357 Multi enim doctissimi Anatomici, & inter hos tales nonnulli, qui ex instituto, vel, ut ajunt, *ex professo* de glandulis scripserunt, earumque naturam curatius extricare, illustrareque studuerunt, sine dubio, ob rei difficultatem, nullam definitionem, aut perspicuam descriptionem dederunt, aut dare potuerunt: quo vero proeffecerunt, ut multæ in glandularum doctrina ortæ fuerint confusiones atque errores. *A multis propterea omissa.*

358 Alii vero, qui audaciores fuerunt, atque definitionem aliquam dare conati sunt, tanto peius discrepant, atque tam imperfectas & erroneas sepe protulerunt, ut vel cum glandulis, quas omnes tamen pro talibus agnoscunt, non conveniant: vel alias partes cum glandulis confundant, quæ tales tamen non sunt: sicuti hoc prolixius

lixius in *Dissertatione de Glandulæ vera appellatione*, nostro sub ductu & præsidio Altorfii quondam habita, ostensum est.

Probatio I.

359 Quidam enim glandulam *per partem globosam* &c. definiri volunt; verum illi hac definitione excludunt *pancreas*, glandularum maximam, atque præcipuam: quippe quod cum nulla figura minus convenit, quam cum globosa, & tamen semper pro glandula habitum fuit. Ita etiam *capsulæ atrabiliarie*, *parotides*, aliæque, quæ globosæ non sunt, ex numero glandularum proscriberentur: quæ tamen quoque ab omni tempore glandulæ fuerunt, & appellatæ sunt.

Probatio II.

360 Alii dixerunt: *glandulam esse partem mollem, laxam, spongiosam*, &c. verum habemus primo glandulas, quæ molles, laxæ, & spongiosæ non sunt; sed quæ duriusculæ, firmæ, & compactæ deprehenduntur. Deinde aliæ existunt partes quoque *molles, laxæ, & spongiosæ*, ut pulmones, pinguedo, aliæque, quæ tamen, omnium consensu, glandulæ non sunt; & idcirco cum glandulis confunderentur.

Probatio III.

361 Nonnulli glandulam vocarunt *parenchyma*, sive *carnem mollem, laxam, & fungosam*. An vero hi glandulam melius clariusve definiverint, quam præcedentes, ex modo dictis facile judicari potest: iisdem enim, quos modo indicavimus, defectibus hæ definitiones laborant.

Probatio IV.

362 Non pauci, qui *glandulam congeriem vasculorum omnis generis, vel partem ex congerie vasorum compositam esse dixerunt*, putarunt, se optime glandulæ naturam & definitionem exhausisse. Verum enim vero, an non membranæ, musculi, aliæque omnes partes corporis humani, si accuratius earum examen instituat, congeries sunt vasorum omnis generis? Igitur hæc definitio glandularum naturam minime exhaurit, eisque minime competere vel tribui jure potest.

363 Alii distinctionem glandularum ab aliis partibus in eo quæsi verunt, ut eas congeriem vasculorum, propria membrana inclusorum, esse affirmaverint. Sed quæro, an non idem in pulmonibus, corde, ventriculo, musculis, aliisque partibus, a glandulis distinctissimis adsit & reperiatur? tota enim horum substantia congeries est vasculorum, quæ peculiari membrana includuntur. Quod cum ita sit, profecto ad veram glandulæ definitionem sufficere nequit.

Probat
tio V.

364 Quidam, imo multi, voluerunt, quod ubicumque secretio, ibi glandula: ideoque non a fabrica, aut a priori; sed ab usu, sive functione, & a posteriori, ut ajunt, glandulæ definitionem petere allaborarunt. At primo videmus multas fieri secretiones, earumque etiam maximas, quæ in corpore contingunt, sine ope vel interventu glandularum. Quis enim est, qui neciat, *chylum* in intestinis a fecibus secerni, sine ope glandularum solis osculis vasorum lacteorum absorbentibus, in papillis tunicæ villosæ? Sic in testibus, genitura; in sinibus pituitariis cranii, pituita separatur, ubi tamen nullæ sunt glandulæ. Ita etiam *pinguedo* in folliculis sive cellulis membranæ adiposæ tenuissimis, ubi nullæ glandulæ videri aut demonstrari possunt, secernitur.

Probat
tio VI.

(a) E contrario habemus glandulas, ab omni-
bus pro talibus receptas, de quibus tamen incer-
tum est, an aliquid secernant. Quis enim pro-
bare certe potest, glandulam *pinealem*, *pituita-*
R 4 *riam*,

(a) Jam dudum etiam *Schelhamerus* noster hanc sententiam impugnavit, docuitque, non omnes separationes liquorum in corpore animalium per glandulas fieri: in *Anal. Anatom. Diss. III. N. XXXVII. Meryus* quoque in *Hist. Acad. Reg.* variis in locis se opinioni huic opposuit: præsertim cum ex ejus collegis fuerint, qui ipsorum mensium in mulieribus excretionem non nisi per glandulas (quæ tamen in utero non deprehenduntur) fieri posse existimaverunt: cui sententiæ *Littrius* potissimum addictus erat.

viam, capsulas atrabilarias, thymum, glandulam thyroideam, bronchiales &c. aliquid secernere? & tamen pro glandulis ab unoquoque habentur. Imo quia veteres certas partes vocarunt glandulas, etiamsi ignoraverint eas aliquid secernere, (sicuti id de omnibus, usque ad præcedens seculum, ignorarunt) hinc aperte sequitur, veteres glandulas non ob usum, sed ob alias rationes aut qualitates, ita vocasse. Accedit, quod vulgus adhuc hodie ex sola externa facie, sive ex solo habitu dignoscat glandulas, etiamsi eorum usum ignoret. Igitur ex aliis signis poterunt cognosci.

Probat.
VII.

365 Alii, inter quos dux est *Malpighius*, quando in statu præternaturali in cadaveribus, hydrope, phthisi, hæctica, aliisve gravioribus morbis, defunctis, *corpuscula sphæroidea*, sive rectius, *morbosa tubercula, atheromata, steatomata, grandines, congestiones terrestres aut tartareas*, in formam globulorum compacta, invenerunt in hepate, liene, cerebro, peritonæo, pericardio, &c. mox inde concluderunt, hæc tubercula, sive corpuscula, quia sphæroidea apparuerunt, veras glandulas fuisse: ideoque hæc viscera in statu naturali ex talibus corpusculis, sive ex meris & infinitis glandulis componi.

366 Ad quæ vero respondeo: primo, hæc corpuscula sphærica in corporibus sanis eis in locis non deprehendi, saltem consueta & ordinaria non esse: ideoque illa effectus potius existere causæ morbosæ, stagnationes terrestrium, aut crassarum & viscidarum particularum in minimis vasculis, sphæriculas tales postea mentientes. Quod enim naturale & ordinarium esse statuitur, illud etiam semper, vel saltem plerumque, in statu naturali, non tantum in morbo, patere debet: alias enim fallimur vehementer. Quoties enim arteriæ & membranæ variæ, hinc inde in cor-

corpore cartilagineæ, imo ossæ deprehensæ erunt! An vero recte inde inferitur, arteriam & membranarum naturalem constitutionem esse cartilagineam vel osseam? Profecto minime. ætherea corpuscula ejusmodi sphæroidea, sive stius tubercula, non solum in porcorum hepate & liene, verum, quod probe notandum, pius etiam in pulmonibus unius ejusdemque animalis observavi; quæ tuberculis, cum in superficie, tum in tota interna pulmonibus substantia, scatebant. Similia etiam corpuscula aliquoties, ut *Malpighium* (a) & alios taceam, ipse juvenibus hæctica defunctis in pulmonibus observavi. Nemo tamen hanc ob causam, opinor, pulmonem viscus glandulosum appellabit: neque etiam uterum; quamvis in ipsa uteri substantia ejusmodi corpuscula rotunda quoque observata sint. (b) Cur igitur alia viscera, in quibus tubercula in statu morbofo deprehenduntur, glandulosa vocabimus? cur speciatim lienem? in quo tamen nulla secretio cognita, & nulla actio glandulosa contingit. Neque unquam satis probarunt *Malpighiani*, sphæroidea talia corpuscula glandulas potius esse, quam tubercula, ex morbofo adam causa producta; quia etiam in superficiei membranarum viscerum, teste ipso *Malpighio* (c), & quidem etiam in ipsius cordis membrana visa sunt, ubi nemo facile glandulas deprehendit.

367 Rursus alii in cerebro, hepate, & renibus glandulas invenerunt: & hinc has partes vere glandulas esse evincere volunt. (d) Verum prius, status hi rursus fuerunt prorsus morbofi & extra-

Probat.
VIII.

(a) Vid. ejus Epist. de Glandul. pag. 5. edit. Londin.

(b) Vid. *Peyeri* Parerg. anatom. p. 132. *Ruyfch.* Thes. t. IX. p. 70. & Tab. III. fig. 1. lit. D.

(c) Loco modo citato.

(d) Conf. *Malpigh.* loc. cit.

extraordinarii: qui propterea, quia in sanis idem non reperitur, ad statum naturalem & ordinem probandum non sufficiunt: in quo longe aliter hæ partes apparent: nam ipso *Malpighio* notante (a), non semel ingens vesica cerebri vires supplevit; quod sane statum naturalem (cujus causa tamen adducitur) docere nullo modo potest. Deinde, *veteres nunquam vesiculas appellarunt glandulas*, aut tales esse voluerunt; idemque confusio nominum ac rerum, & logomachia orirentur innumeræ, si nunc vesiculas, aut folliculos, vellemus appellare glandulas. Denique quæro, cur non ex his observationibus cerebrum, *hepar*, & *nares partes vesiculosas* potius esse concludant, quam glandulosas? Nemo enim hæc minus, & ne quidem ipse *Malpighius*, pulmones ex vesiculis in ipso statu naturali constantem propterea glandulosum appellare voluit; sed omnes, ut æquum, scapham appellarunt id est, vesiculosum, quod vesiculosum existit; vasculosum, quod est vasculosum. Neque ovarium glandulis annumeratum fuit, licet in eo in statu naturali vesiculæ manifesto deprehendantur. Hinc miror, nonnullos tales observationes tanti facere, præsertim eam, de renibus *Littrii* (b), ut inde renum substantiam (quæ tamen a *Ruyfchio*, locis supra adductis, (§. 219) aliisque, tota vasculosa demonstrata est, & atropia talis deprehenditur) mere glandulosam esse, certo evictum voluerint: quæ tamen mihi ad glandulosam eorum substantiam probandam ob rationes dictas, nihil facere videntur. Vid. (77*) de his plura.

Obje-
ctio I.

368 Regerunt hic quidam patroni glandularum, primo, vasculosum & glandulosum non differre, omne enim glandulosum esse vasculosum & e

(a) Epist. de Glandul. pag. 6.

(b) Hist. Acad. Reg. Scient. An. 1705.

e converto, vasculosum quoque glandulosum
pellandum esse. (a) Cui objectioni vero res-
pondeo, confundi sic partes, quæ revera & ab-
solute distinguendæ: quia alias hac ratione sta-
tuendum esset, totum corpus, dum omnes ejus
partes vasculosæ, ex meris glandulis componi:
quod absolum est; adeoque hæc sententia
illis, qui accurate loqui, & distincte de par-
tibus judicare volunt, non probari potest, quia
omniam in anatome confusionem pareret.

69 Deinde quidam cum MALPIGHIO affir- Obje-
ctio II.
de fol-
liculis
glandu-
larum.
unt, in quavis glandula minima, simplici, at-
que sic etiam in omnibus, quas in visceribus sta-
tuunt glandulas, necessarium esse folliculum, sive
glandulam, inter extrema arteriarum, venarum,
ductuum excretoriorum interjectum, quibus
retio fieret, iisque a causa quadam morbosa
mutatis, folliculos, adeoque & glandulas con-
tineas reddi. Sed præterquam quod multi ce-
rerrimorum anatomicorum huic sententiæ,
quam non probatæ, & mente solum conce-
pit, contrarientur, (dum in statu naturali in
visceribus ne quidem glandulæ videri pos-
sunt, multo minus earum folliculi) experientia
mea victus affirmo, æque facile, aut forte adhuc
facilius, vasa minima in vesiculas mutari pos-
se, sicuti tales in placenta uterina, teste Ruys-
schio, Rauboltio (b), aliisque mere vasculosa, in
membris, superficie cutis, oculis, aliisque
partibus, ubi glandulæ non adsunt, nec demon-
strari possunt, sæpius observatæ sunt. (c) Ergo
idem in renibus, hepate, cerebro, &c. con-
tin-

(a) Ita tamen post alios adhuc ratiocinatur doctiss. Mi-
chaelis in libr. de Separatione fluidorum.

(b) Histor. Acad. Reg. 1714. 1715. 1718.

(c) De vesiculis & tuberculis in partibus non glandulo-
sis, ut placenta &c. repertis vid. Dekkeri & Bidloi exerci-
tium. Ruyssch. Adversar. II. p. 24. Vallisner. de generat. Diar-
rhæ. Paris. An. 1722. mense octobri.

tingere poterit. Cum vero anatomici sit, nunc dicere aut suspicari, sed demonstrare; hinc utique pro veris ea accipienda non sunt, quæ sanis nunquam apparent. In statu enim præ naturam tot sunt monstra & aberrationes naturæ, ut illi, qui ex ejusmodi constitutione naturalem deducere volunt, facillime a vero aberrare queant. Præterea notandum, veras glandulas, ut salivales, mesenterii, thymum, pancreas &c. raro, si unquam in vesiculas mutatas reperiri; unde patet glandulas veras vix vel nunquam partes vero vasculosas sæpissime vesicularium faciem induere, atque sic multis, quasi glandulæ hæ essent, illudere. (a) Sed demus Malpighianis, esse in quibusdam glandulis aliquam vesiculam sive folliculum; tamen inde non sequitur, eos in omnibus iis partibus adesse, quas glandulis constare contendunt: quia effector strii corporis ad potentiam suam demonstrandam partes variis modis componere voluit, ut diversis usibus tanto sint aptiores. Multi quoque cum Malpighio folliculi significationem, ut hypotheseos suam tanto melius tueantur, laxissimam faciunt, & vascula seminalia testium longissimum imo totum etiam longissimum intestinorum tractum pro folliculo glanduloso habent. Ita ventriculum, pericardium, tunicam testis vasculalem, peritonæum, pleuram, & nescio quæ non partes, pro folliculis adeoque & glandulis sumunt, atque sic necessario omnes fere partes glandulas faciunt. Quam apta vero vel inepta hæc

(a) Doctissimus quidam vir objecit, vasculosas partes vesiculas mutari vix posse, folliculos vero glandularum facillime. Sed hæc si vera essent, vesiculæ in glandulis minimatis longe frequentiores essent, quam in visceribus reperiuntur. Experientia vero contrarium docet. Adeoque vel folliculi non sunt in istis glandulis, vel saltem vascula facillime in vesiculas transmutantur folliculis, licet modus, quo hæc fiat, non adeo manifestus sit.

folliculi glandulosi sit significatio, aliis a
ejudiciis liberis judicandum relinquo.

70 Abunde præterea cognoscimus, *secretio-* *Secre-*
sine folliculis talibus interjectis & fieri posse, *tiones*
revera etiam plerisque in partibus ita fieri. *sine fol-*
liculis

Ut enim taceam chyli atque pinguedinis
retionem (b), & fingamus folliculum in glar- *fieri*
possunt.

a quadam simplici, per quam arteriæ & ve-
ultimæ disseminatæ sint, & in quo, uti vo-
t, ductus excretorius incipiat; tunc follicu-
tamen ad secretionis negotium nil præsta-
sed receptaculi tantum officio fungeretur.
ando enim perpendimus illud liquidum, quod
folliculo vel ductû excretorio jam hæere con-
itur, cognoscimus quoque illud jam esse se-
tum, & non ibi demum secerni. E venis
o (nisi in hepate, ubi vena portæ vicem
erariæ præstat) secretio non contingit; quia
guinem revehunt, e quo jam secretio facta
ergo in arteriis, & præcipue in lateralibus
alculis, perfici necesse est, quos e laterali-
minimarum arteriolarum provenire eodem
e modo, ut vasa chylifera ex intestinorum
ribus egredi conspiciamus, existimo. (c) At-
hoc modo secretiones in cerebro, renibus,
ate, testibus, cute, aliisque membranis, imo
ipsis glandulis fieri concipimus. Quoniam ve-
natura simplex esse solet in suis actionibus,
folliculi vel non conspiciuntur, vel, si ad-
, potius receptaculi, quam organi secretorii
nus perficiunt; hinc certiore hunc secre-
is modum, a manifesta chyli secretionem de-
sum-

e) In hoc *Michelottus* omnino mecum consentit, loco
o, licet in aliis dissentiat.

) *Malpighius* etiam lympham ab arteriis emanare judi-
Epist. de glandul.

) Consentit etiam in hoc cum *Bellino* & me *Miche-*
s. l. c.

sumtum, dubio incertoque modo præferendum merito esse censeo.

Vasculosum & glandulosum distinguendum.

371 Igitur, qui æquivocationes cum inde provenientes erroribus atque confusionibus evitare, &, quantum fieri potest, removere voluerit, illi *vasculosum & glandulosum non pro una eademque re habere*; sed, ut partes ipsæ figuræ facie, habitu, atque aspectu se distinguunt, nomine quoque eas distinguere debent. Adæque viscera, quæ oculis, injectionibus, aut microscopiis, vasculosa deprehenduntur, & in quibus in statu naturali nulla distincta corpuscula sphærica, peculiari membrana inclusa, contineantur, illa haud incongruo aut alieno nomine insignire fas est; sed *vasculosum*, suo nomine, *vasculosum*: & *glandulosum*, *glandulosum* appellandum; ita enim æquivocatio & confusio harum partium, quæ in libris multorum medicorum regnant, optime evitabuntur. (a)

Quid veteres vocaverint glandulas.

372 Sed si jam quærat, *quid glandulosum quidve glandula* dici debeat? Respondeo, quod recentiores, ut ex hætenus dictis patet, inter se non conveniunt; hinc primo considerandum existimo, *quid veteres glandulas vocaverint*; deinde, quare illud ita vocaverint: ne veterum nomina, quod Morgagnius alique prudentiores sæpe meritoque inculcant, præter necessitatem immutemus. Prius perpendendo, invenimus glandulas vocasse *glandulam pinealem*, *pituitariam*, *parotides*, *maxillares*, *jugulares*, *thyroideam*, *thymum*, *pancreas*, *glandulas mesentericas*, *axillares*, *inguinales*, (b) ideoque hæc, aliæque his similes partes, quæ forte ipsis non innotuerunt

(a) In hoc Michelottus dissentit, & *vasculosum* atque *glandulosum* pro una eademque re habendum esse vult; re an immerito, aliis judicandum relinquo. Interea tamen infra adhuc nonnulla hac de re differemus.

(b) Conf. Hippocrates lib. de glandulis, alique veteres

, & impofterum glandulæ vocandæ funt: fic
ex notis & datis ad ignota & dubia no-
da ducimur.

3 Quod vero ad pofterius attinet, *quare has* Quare
es (372) glandulas nuncupaverint, certum certas
veteres eas non ob globosam aut sphericam partes
am ita appellasse; alias pancreas, thymum, glandu-
que his non annumerassent. Neque ob *mol-* las vo-
laxam, & spongiosam substantiam: alias enim cave-
ores & compactiores glandulas e numero ea- runt.
exemissent; & pinguedinem ac pulmones,
ilem, laxam, spongiosamque substantiam ha-
es, in numerum earum retulissent. Neque
o, certas partes ob *usum sive secretionem glan-*
s vocarunt; quia maximam partem ignora-
glandulas aliquid secernere; dum hic usus
um superiori potissimum sæculo de quibus-
innotuit. Ex adverso vero viscera, de qui-
certo sciebant, ea aliquid secernere, ut he-
renes, ac testes, pro glandulis non habue-
. Præterea, neque lienem glandulam voca-
; licet putaverint eum bilem atram e san-
ne secernere. Ideoque illi, qui ab officio se-
ionis partes appellandas esse censent glandu-
graviter hallucinari videntur, & a priscis
ter necessitatem nimis recedunt; dum sic par-
contra mentem & consuetudinem veterum,
dulæ appellandæ essent, quæ tales non sunt,
am alia nomina ab ipsis receperunt, ut inte-
a, uterus, pulmo, cutis, membranæ, &c. &
tra, partes quædam, quas illi glandulas vo-
ant, hodie non amplius essent glandulæ, quia
ramus, utrum aliquid secernant, an alii u-
nobis adhuc incognito, a conditore destina-
sint; ut glandula thyroidea, bronchiales,
itaria, pinealis, aliæque.

4 Clarum igitur est, veteres quasdam partes Ob cer-
ri corporis non ob aliam causam, quam ob tum ha-
pecu- bitum
sive sa-
ciem.

peculiarem carnem, id est, ob *peculiarem habitum*, sive ob *singularem faciem externam*, nunc habito respectu, sive ad *structuram internam* sive ad *figuram sphaericam*, sive ad *usum*, (quod quid nonnulli contradicant) glandulas diximus; ideoque, cum nobis neque liceat, neque confusionis metum opportunum sit, nomina vetera præter necessitatem mutare, aut glandularum nomen talibus partibus imponere, quod nimis diversæ sunt ab illis, quas ita vocarunt; hinc nomen glandulæ nulli parti (licet similem fabricam internam similemve usum habeant quam quædam glandulæ obtinent) recte committere potest, nisi talibus, quæ *similem faciem externam*, sive *peculiarem illum habitum* exhibeant, ob quem olim & primum ita dictæ fuerunt, & adhuc hodie a vulgo ita dicuntur.

Quid
glandu-
la sit.

375 Quid igitur glandula sit, aut quomodo optime definiatur, hic non repetemus, quia jam pag. 10. §. 33. definitionem earum ex hoc fundamento dedimus; ita, ut melius jam, quam olim, si sine præjudicio res perpendatur, ab aliis partibus distingui queant.

Quare
ad ha-
bitum
hic con-
fugien-
dum.

376 At mirabuntur forte non pauci, quare *peculiarem habitum glandularum*, ad eas dignoscendas, confugerim. Sed mirari, opinor, decessent, si considerabunt, alia certa signa, & differentiam specificam, hucusque ab auctoribus data non esse, nec dari potuisse; & propterea hunc habitum graves ob causas in auxilium vocare, necessum habuisse. Nam quia summi Botanici, sicut ex quamplurimis exemplis apud RAJUM, TOURNEFORTIUM, BOERHAAVIUM &c. Botanicos ævi nostri principes constat, ad proprium certarum plantarum habitum subiade confugere coacti sunt, quando genus in-
tast

(a) Sententiæ huic nostræ solus, quantum novi, Miclotus se opposuit: cui vero mox infra respondebimus.

asque earum characteristicas aliter definire aut describere non possunt; hinc quia hoc ipsis licitum est, cur Anatomicis in tali casu, ubi ob ei difficultatem perfecta definitio aut descriptio ut nota characteristica dari nequit, idem non sit licitum? Nemini vero hanc sententiam obtrudimus; sed simulac quis talem definitionem ut notam dabit, qua glandulæ, sine peculiari habitu, ab aliis partibus rite distingui queant, & quæ omnibus glandulis competat, (quod tamen adhuc nemo fecit) tunc sententiam meo-rem accipere non detrectabimus.

377 Si vero quæratur, *quid sit ille peculiaris habitus in glandulis?* Respondemus, illa singularis vasorum complicatio & compositio, unde talis emergit forma, qua primo intuitu a muscu-
s, pinguedine, ossibus, membranis, vasis, & sceribus reliquis corporis animalis dignoscitur; si quidem habitus vel forma verbis describi ne-
quit; simili modo, ut Botanici *habitu musci*, algatissimæ licet herbæ, verbis describere non possunt, teste Celeb. RAIO (a), & tamen tam doctis, quam ab indoctis, ex *peculiari habitu* facie facile cognoscitur, atque ab aliis plan-
s, eodem modo, ut glandulæ ab aliis parti-
is, distinguitur.

378 *Quæcumque igitur pars a veteribus glandu-* Quid
appellata est, aut faciem sive habitum illum pro
tinet, quem illæ partes habent, quas veteres glan-
glandulas appellarunt, talem pro vera glandula dula
nosscimus, & pro tali habendam esse cense- habenda-
mus. Quæcumque vero ea facie, sive habitu de- dum.
terminatur, illam e numero glandularum extermin-
dam esse judicamus. Notandum autem hic
, veteres non solum glandulas magnas pro-
hibus agnovisse, sed etiam glandulas parvas,
S spe-

Speciatim mesenterii, inter quas multæ valde exiguæ: quas tamen quivis fere e vulgo, in vultus verbi causa, adhuc glandulas appellat, & pro glandulis agnoscit. Hinc ubicunque vel majores vel minores partes occurrunt, facie, sive habitu illo præditæ, quem partes, a veteribus & vulgo glandulæ appellatæ, obtinent, illæ pro glandulis merito agnoscendæ sunt.

379 Ex iisdem verorationibus expungenda veniunt e numero glandularum 1. *corticalis cerebri substantia*: quia nihil in ea, neque nudis neque armatis oculis, naturaliter conspicitur quod glandularum figuræ, aut faciei, sive habitui simile sit; e contrario autem injectione docuerunt, eam ex meris vasculis constare. Hippocrates etiam notanter scribit (a), *cerebrum glandulæ simile esse*; illud vero glandulam non vocavit, quia simile non est idem. Hoc ipsum sentiendum de hepate, liene, & testibus; in quibus Ruyschius, Leeuwenhæck, Vieussenius, Bergerus, ego, & multi alii præstantissimi anatomici nihil, quod *glandularum habitum* obtineat vel quod glandulam referat, in statu natura reperire potuimus; at vascula copiosissima ubique in eis deprehenduntur. Hinc igitur rectius *vasculosa* appellantur hæc viscera, quam *glandulosa*, quia revera vasculosa sunt, atque sic competens nomen ipsis tribuitur. Omnium vero maxime miror, quod ob tubercula in cadaveribus morbofis quandoque *in liene reperta*, multi lienem quoque glandulosum esse perhibeant (b) cum tamen lien nihil, quod notum sit, secretat, verum alio longe officio fungatur; vid. Not. (21 *) adeoque ne quidem glandulis indigeat. Si veteres hoc egissent, qui secretionem biliatræ ipsi, licet falso, tribuerunt, condonandum

hoc

(a) Lib. de Glandul.

(b) Quod tamen Douglas adhuc fecit in Actis Anglican.

oc ipsis esset facilius. Cum vero hoc hodie ad-
uc contingat, ubi doctiores conveniunt, nullam
excretionem hic fieri, atque insuper ductu quo-
ue excretorio destituatur; non concipio, in
quem usum glandulæ in eo adesse debeant; præ-
sertim cum omne id, quod lien præstat, aut his
glandulis tribuitur, per vasculosam fabricam vel
que bene, vel adhuc facilius & melius intelli-
gi, atque explicari queat. Si *Renes* ex homine,
porco, bove, vitulo, cane &c. vel recentes, vel
pæti discerpuntur, tota corticalis eorum sub-
stantia, æque ac interior, vasculosa sive tubu-
losa apparet; rotunda vero corpuscula, ex qui-
bus eos constare perhibent, offendere potui nun-
quam. Aut si forte quandoque nonnulla depre-
ndantur, ut *Ruyschius* aliquando quædam vi-
dit, ea cum ipso vel morbosa esse existimo, vel
imparia & exigua sunt, ut largissimæ urinæ
excretioni minime sufficere queant. Ita & *testi-
li* omnium fere consensu prorsus sunt vascu-
losi. (a) Item in *pleura*, *pericardio*, *peritoneo*,
nicæ vaginali, naturaliter nullæ sunt glandulæ,
sed subinde tantum tubercula morbida.

380 DIFFERENTIAS *glandularum* auctores
amplurimas excogitarunt; ex quibus hic pau-
cas, quas vero sufficere existimamus, profere-
mus. Dividemus eas primum in *simplices*, quas
i *conglobatas* vocant, ex unico corpusculo
cæroideo, distincto, suæque membranula in-
voluto constantes; & in *compositas*, quas vulgo
pellant *conglomeratas*, quæ ex pluribus mino-
ribus, unica communi tunica inclusis, compo-
nuntur. (b) Differunt 2. *Consistentia*: dum quæ-
dam

a) Vid. figur. nostr. 24. Tab. VI.

b) Divisionem glandularum in *conglobatas* & *conglome-
as* valde ineptam esse judicat *Schelhamerus*, *Analect.*
t. Dissert. III. N. 39. cum *globus* & *glomer* idem si-
ficent.

dam duriusculæ, quædam mollissimæ, præsertim illæ, quæ in juncturis ossium hærent. 3. *Color* pleræque quidem pallidi sive carnei sunt color alia longe magis rubentes; quædam flavescentes, aut fulcæ; nonnullæ prorsus nigricantes. 4. *Figura*: plurimæ quidem sunt globosæ, siphæroidæ, & quædam glandiformes; multo vero ab his figuris quam alienissimæ, ut pancreas, thymus, thyroidea &c. Quædam etiam a figura nomen acceperunt, ut glandula pinealis, miliares, & tonsillæ, barbaris amygdalidæ. 5. *Ufu* differunt: unde quædam salivales, mucosæ, lymphaticæ; aliæ mucilaginosæ, sebaceæ, ceruminosæ, lacrymales, pituitariæ &c. dici consueverunt. 6. *Situ*: ob cujus diversitatem, parotides, maxillares, thyroidæ, linguales, palatinæ, labiales, jugulares, cervicales, bronchiales, axillares, inguinales, lumbares, intestinales, mesentericæ, renales vocantur. Ita etiam a situ vel *solitariae*, vel *congregatae*, præsertim in intestinis, vocari solent. *Magnitudine* glandulas quoque differre, tantum est omnibus, ut non opus esse existimen verbis id indicare prolixius.

DE GLANDULIS SPECIATIM.

Glandula
intra
cranium.

381 Videamus vero jam speciatim, quænam partes in numero glandularum merito retineant: & quidem primo IN CAPITE. Hic quis velit totum *cerebrum* pro glandula magis habere, quia HIPPOCRATES illud, ob qualemcumque similitudinem, ut supra jam monuimus, *corpus glandulis simile* vocavit (a), non valde

(a) Lib. de Glandulis.

valde repugnabo; licet cæteri veteres idem non gerint. At corticalem ejus substantiam naturaliter ex innumeris parvis glandulis sive corpusculis globosis, ut BIDLOUS delineavit (*a*), constare, a sententia HIPPOCRATIS & autopsia, ut supra evici, quam alienissimum est. Atamen in duræ matris sinibus, & extra eosdem latera, glandulæ exiguæ reperiuntur a PACCHIONO descriptæ. (*b*) Aliæ in foveis ossis frontis & circa divisionem vasorum quandoque concurrentes, inter duram matrem & arachnoideam a Santorino indicantur. (*c*) Ita ego aliquoties acervos quasi similium glandularum in foveis ossis frontis, quæ haud procul a sinu longitudinali sæpe his ossibus insculptæ sunt, vidi, quæ quoque dura matre, ut Santorinus de his in foveis ossis frontis scribit, testæ non essent, verum dura mater ibi deficiebat, & quasi perforata erat. Videntur hæ glandulæ humectandæ duræ matri inservire. Præterea in cerebro pro glandula habenda est glandula pinealis, g. 144. & sub cerebro glandula latet pituitaria in sella equina, de qua vid. pag. 148. quam vero glandularum omnium usus valde incertus est. In plexu choroideo nullas naturaliter esse glandulas, injectiones RUYSCHII & topica nos docuerunt.

382 Extus in capite habemus *Parotides*, *Maxillares*, *Sublinguales*, *Linguales*, *Labiales*, *Palatinae*.

Glandula
extus
in capite

a) Anat. Tab. X. fig. 2.

b) De Gland. conglob. duræ matris.

c) Observ. anat. p. 52. Sed cum in tunica arachnoidea sint vasa conspicua, haud intelligo, quomodo glandulae novæ, ut ab ipso appellantur, circa truncos vasorum, inter duram matrem & arachnoideam, quemadmodum inagine scribit, hæere potuerint. Ego haud raro nonnullas circa divisiones ramorum notabiliorum pia matris hinc observavi: quæ igitur aliæ forte erunt, quam quas Santorinus hic notavit.

latinas, & buccales hinc inde per membranam oris dispersas, p. 155. descriptas. Glandulam item lacrymalem, olim innominata dictam, in orbita, pag. 152. Sub palpebris, ceraceas sive sebaceas Meibomii, ibidem indicatas. Intus vero in uvea oculi, ubi quidam tales adesse statuunt, ob eam solum hypothesein, nullam secretionem fieri sine glandulis, servandam, nullæ reperiuntur. Præterea hic occurrunt Tonsillæ in faucibus, de quibus p. 160. Glandulæ in membrana pituitaria narium, mucosæ, pag. 164. & ceruminosæ, in meatu auditorio, p. 167.

De
glandula
thyroidea.

383 In COLLO occurrit potissimum *Glandula Thyroidea*, tanquam colli maxima, (vid. p. 128.) quam quia a VERHEYENO & male scripta, & male delineata est, in *Ephemeridum Cent. VII. & VIII. pag. 365.* accuratius descripsi, ex cadavere humano, & una cum *bronchialibus glandulis*, magnitudine naturali delineari curavi: ubi simul delineationem thyroideæ ex infante addidi. Est vero hæc glandula plerumque unica in homine, non duplex, lunæ cornutæ ut plurimum similitudinem referens, cornubus ex utroque latere non deorsum, ut *Verheyenus* pingit, sed sursum exporrectis, eisque tam cartilagini thyroideæ & cricoideæ, quam œsophago utrimque adhæret. Pars vero media, quam *isthmum* appellant, superioribus asperæ arteriæ cartilaginibus jungitur. (a)

Sententia
Ver-
celloni
de ea.

384 Prolixius etiam in prædictis *Ephemeridibus* de usu novo, quem VERCELLONIUS (b) huic glandulæ adscribit, differui; dum eam *nidulum ovulorum verminosorum* constituit, e quo pe-

con-

(a) Conf. *Morgagn. Advers. I. Tab. 1. Cantius* figuræ cordis Tab. 4. eam delineat, quam vero semper aliter deprehendi.

(b) In *Diff. de glandulis conglomeratis œsophagi.*

conspicuum non venirent; *ovula verminosa*, in hac glandula generata, in oesophagum, & inde in ventriculum, pro charactere vitali, chylo in ventriculo impertiendo, atque digestionem promovenda, transmitterentur; quæ vero ovula in statu præter naturam sæpe in vermes abirent.

385 Sæpius in hanc rem in cadaveribus humanis inquisivi: fibras quoque satis manifestas, quibus oesophago adhæret, deprehendi; glandulam semper duriusculam, firmamque offendi; verum neque ovula in ea observare, neque du-
 ulos cavos deprehendere potui. Anno autem 1719. Altorfii, in cadavere feminino, quod publice dissecai, glandulam hanc liquido valde turbidam reperi: propterea speravi, me hic aliquid circa usum ejus deprehendere atque manifestare posse. Quam ob rem a parte posteriori tam tracheam, quam oesophagum aperui, ut in hoc cavum recte inspicere possem; deinde glandulam hanc manibus primo leniter, postea fortius pressi, ea spe, fore ut vel in tracheam, vel in oesophagum, vel in utrumque aliquid liqui-
 ingrederetur; verum ne guttula neque in tracheam, neque in oesophagum impelli potuit; ut ut mihi semper adhuc dubium sit, cui usui stabilis hæc glandula inserviat, aut in quam portem aliquid infundat. Cum vero hanc turgidam glandulam, ad interiora lustranda, disseca-
 m, liquidum limpidum copiosum effluebat, quod repletissimum erat sphaerulis flavescens, æ, ut guttulæ olei minutissimæ, aquæ innatas-
 sent. Utrum vero hæc corpuscula *ovula* fuerint ERCELLONII, an aliud quid, determinare non audeo. Interea tamen hanc observationem et notare volui; fortasse enim experimentis posterum instituendis aliquid lucis dare poterit: nihil tamen ab eo tempore notatu dignum.

*Quid
ego ob-
serva-
verim.*

in ea observare potui; manetque igitur ejus usus mihi adhuc incertus.

*Glandulae
jugulares
laryngis,
tracheae
& oesophagi.*

386 Præter hanc glandulam in collo hinc inde diversæ glandulæ in interstitiis musculorum & pinguedine, magnitudinis & figuræ variæ, situsque & numeri incerti, deprehenduntur, *jugulares* in parte anteriori, *occipitales* & *cervicales* in posteriori appellatæ; quarum usus quoque non adeo certius est. Vulgo vasis lymphaticis servire creduntur; quem vero in finem ipsis inserviant, non perspicio. In *Epiglottide* RUYSCHIIUS atque MORGAGNIUS glandulas exhibuerunt ac delinearunt, sicuti indicavimus. In reliquis laryngis partibus, & præsertim juxta cartilagine arytenoideas, ut & in *trachea*, glandulæ a MORGAGNIO delineantur, (a) quæ vero sæpius non adeo magnæ sunt, ut in illo cadavere fuerunt, unde suas delineavit; interea tamen semper satis conspicuas eas offendi. In *oesophago*, præsertim ejus parte superiori, multæ sæpe glandulæ reperiuntur, quæ a VALSALVA (b) delineatæ sunt. Reperi vero eas aliquando adhuc majores, & in singularum medio foraminulum, tanquam osculum, sive ductus excretorius, conspiciebatur, quas adhuc delineatas asservo.

De thym.

387 IN THORACE glandulæ quædam sunt externæ, quædam internæ. Externe mammarum præcipuam substantiam glandulosam esse, supra, ubi de mammis actum, docuimus. Quid vero de areolarum glandulis sentiamus, §. 397. videri potest. Interne vero occurrit primo *Glandula THYMUS*, cujus descriptionem pag. 121. dedimus, duas vero diversas ejus figuras Tab. IV. fig. 14. & 15. exhibuimus. Anno 1706. con-

tro.

(a) Advers. anat. I. Tab. II.

(b) De aure humana Tab. V. fig. 2.

controversiæ de hac glandula ortæ sunt inter BIDLOUM & VERHEYENUM; dum BIDLOUS in dissertatione quadam de Thymo, Lugduni Batavor. habita, acriter aggressus erat VERHEYENI descriptionem & delineationem huius glandulæ: cui vero VERHEYENUS eodem quoque modo responderat. Huic deinde BIDLOUS alteram dissertationem opposuit: quam ille altera quoque responsione refutavit. Quænam vero BIDLOUS statum controversiæ reliquerat, & latinitatem *Verheyeni* potissimum carere annisus erat, hinc nihil utilitatis ex illa controversia natum est.

388 In thorace præterea occurrunt considerandæ GLANDULÆ BRONCHIALES: (de quibus jam N. 259.) quæ sunt satis notabiles glandulæ, extus in trachææ & bronchiorum majoribus divisionibus sitæ (*a*), coloris nigricantis, sed usus quoque adhuc dubii. Creditum vulgo fuit, has glandulas separare liquidum quoddam, quod in bronchia demitterent, pro eorum humectatione atque lubricatione. Verum VERCELLONIUS (*b*) vult, eas potius liquidum, digestionis inserviens, per tenuissimos ductus ad œsophagum (cui maxime quoque adærent) & ventriculum mittere. Inquisivi quoque jam sæpius in hos ductus, & reperi etiam vixbras satis notabiles, ab his glandulis ad œsophagum exporrectas: quæ vero nunquam tam magnæ erant, ut cavitas se in eis manifestaret, vel fetam admiserint, & propterea uberiori inquisitione indigent. Aliquando in cadavere virili in maxima harum glandularum calculum reperi, extremum articulum digiti auricularis ad-

Glandula
bronchiales.

(*a*) Harum in situ & magnitudine naturali delineationem accuratam dedi in Ephemer. Centur. VII. & VIII. Tab. VI. pag. 361. verum chalcographi incuria variæ tam male sculptæ sunt, ut a bronchiis distinguere nequeant.

(*b*) In supra citata dissertatione.

adæquantem; postea vero etiam in muliere, me dissecta, paullo minorem in eadem glandula vidi, quod deinde etiam ab aliis notatum invenni. Anno 1723. in cadavere viri multas ejusmodi glandulas nigras in tota tracheæ parte posteriori, juxta hanc & œsophagum, phaseoli parvi & seminis tritici figura ac magnitudine, offendi, atque nonnullæ etiam anteriori tracheæ parti laxè adhærebant.

Glandula
dorsalis.

389 Circa quintam circiter dorſi vertebram in thorace subinde notabilis reperitur glandula œsophagi posteriori parti adhærens, a VESALIO aliisque veteribus jam delineata atque descripta, quam DORSALEM appellare solent. Hæc glandula diversæ observatur magnitudinis sæpe tamen phaseoli vel amygdalæ magnitudinem obtinet, & subinde major, subinde quoque minor reperitur. Imo non raro vel prorsus deficit, vel saltem adeo exigua est, ut, omni licet industria adhibita, eam invenire non potuerim. Quandoque etiam duæ hic reperiuntur glandulæ: id quod quidam frequentius esse volunt una. Ante plures annos virum secui, qui nihil cibi aut potus amplius deglutire poterat, propter obstaculum quoddam, quod non in faucibus, sed in thorace percipiebat. In hoc hanc glandulam ad ovi gallinacei magnitudinem auctam reperi, unde œsophagus ita comprimebatur, ut nihil amplius transire potuerit. Paucis etiam abhinc annis a celebri Germaniæ Medico consultus fui ob similem morbum, quo filius ejus, qui non nisi difficillime propter obstaculum in œsophago deglutire poterat, laborabat. Suspicatus sum, idem vitium hic adesse: æger etiam mortuus est. An vero cadaver incisum, & quid repertum sit, non comperi. VERHEYENUS œsophagum ex eadem causa penitus coalitum reperit. (a)

390

(a) Anatom. Cap. de œsophago.

390 VERCELLONIUS (a) hanc glandulam *Ejus
usus.* quoque dicatam esse statuit separationi liquidi digestionis inservientis : id quod per ductus tenues in œsophagum transfundi affirmat : quos vero ductus etiam neque alii, neque ego hucusque reperire potuimus. Cl. FANTONUS (b) alique jam ante VERCELLONIUM suspicati sunt, has glandulas in cavitatem œsophagi mucosum liquidum secernere, seque eorum meatus in cane, in quo hæ glandulæ excreverant, non solum vidisse, sed etiam *vermiculos* in iis invenisse scribit. Ita etiam celeb. MORGAGNIUS (c) refert, has glandulas in canibus sæpe turgere, & a vermiculis quibusdam rubentibus, oblongis, & tenuibus incoli: id quod & REDIUS (d) atque CLERICUS (e) confirmant. Atque talibus in casibus, MORGAGNIUS scribit, caliculos in œsophagum apertos reperiri: verum glandulis his secundum naturam se habentibus, nullos evidentes meatus in cane, multo minus in homine videri. Quare vero tam frequenter his in glandulis vermiculi oriantur, & an forte hic talis vermiculorum nidus sive ovarium, quare VERCELLONIUS in thyroidea statuit, res est ulterioris indaginis.

391 In ABDOMINE reperiuntur multæ glandulæ: quarum maxima est *Pancreas*, pag. 82. Deinde *Glandulæ renales*, sive *Capsulæ atrabiliaræ*, pag. 88. postea *Mesaraicæ* pag. 77. *Intestinales*, tam BRUNNERI, quam PEYERI, in intestinis, pag. 73. & 81. notatæ. *Ventriculi glandulæ* in canibus & porcis facile apparent, in homine vero perquam difficulter: atque quam
ma-

(a) In eadem dissertatione.

(b) Anatom. Corp. hum. dissert. III. pag. 55.

(c) Advers. anatom. III. pag. 5.

(d) De Animal. vivent. in viventibus repertis.

(e) De lumbrico lato, cap. 13.

maxime de iis in homine dubitarem, nisi **C. MORGAGNIUS** me suis observationibus de illis certiores reddidisset. Postea tamen **Helmstadii** eas in ventriculo cadaveris virilis admodum insignes deprehendi. Præterea circa *vertebras lumborum*, ubi chyli receptaculum situm est, circa *os sacrum*, & *divisionem vasorum iliacorum* variæ glandulæ, sed diversæ figuræ & magnitudinis, reperiuntur, *Lumbares*, *Sacræ*, & *Iliacæ* vulgo dictæ, in quas vasa lymphatica copiosa ingrediuntur: quæ inde in receptaculum chyli se exonerant. Vidi lumbares glandulas in muliere ultra pugni magnitudinem excretas: id quod etiam in pueris atrophis defunctis sæpius observavi. In *hepatis parte concava* circa ingressum venæ portæ, & *collum vesiculæ felleæ*, ut & *prope lienem*, juxta ingressum vasorum, sæpe glandulæ conglobatæ, phaseoli quasi magnitudine reperiuntur, quæ a nonnullis *Glandulæ hepaticæ*, *cysticæ*, *venæ portæ*, *lienares* sive *splenicæ* appellantur, vasisque lymphaticis servire videntur. In hepate bubulo modo indicatæ glandulæ in concava parte plures ut plurimum conspiciuntur, quam in homine: quarum nonnullæ amygdalæ, aliæ nucis, aliæ parvi ovi magnitudinem quandoque adæquant. Circa *sinistrum ventriculi orificium* extus ei adhærere glandulam, phaseoli magnitudine, affirmat **VERCELLONIUS**: e qua quoque ductum excretorium in ventriculum desinere affirmat. (a) Talem quidem glandulam sæpe in porcis inveni, ductum vero de tegere non potui. At in homine, nescio quam ob causam, ne quidem adhuc glandulam notabilem videre potui, licet in variis cadaveribus in eam magno studio inquisiverim. In *omento* nonnulli ubique, ubi pinguedo continetur, glandulas

(a) Loco citato.

glandulas statuunt, pinguedinem secernentes: (a) verum paucissimæ tantum, præsertim ubi pyloro jungitur, subinde reperiuntur, *omentales* dictæ, & pinguedo hæc ex arteriolis, sicuti aliis in partibus, secernitur. In *vesicula fellis bouum* sæpius parvas glandulas flavas, ceruminosis in meatu auditorio haud absimiles, vidi. In humana vero quandoque tantum eas videre potui. (b) *Vesica & ureteres* interdum parvas glandulas ostendunt, & quidem in his hinc inde, nullo certo in loco, apparent; in illa vero maxime prope collum, attamen raro conspicuæ sunt.

392 In partibus genitalibus virorum occurrunt In partibus genitalibus virorum. 1. *Glandulae Cowperi*, de quibus pag. 98. & infra Nota (29*) . 2. *Glandulae Littrii*, itidem pag. 98. descriptæ . 3. *Glandulae odoriferae Tysonis*, in præputio & corona penis, pag. 95. & 96. quarum tamen illæ, quæ in præputii parte interiori existunt, frequentius se mihi obtulerunt, quam eæ in corona penis: ubi valde difficile est eas a papillis nerveis, ibidem occurrentibus, distinguere. 4. *Prostatae*, quæ pag. 94. descriptæ sunt . 5. *Glandulae vesicularum seminalium* raro quidem occurrunt: aliquando tamen eas seminis anapi magnitudine conspexi. HARDERUS (c) vero scribit, se eas, una cum foraminulo excretorio, tantas vidisse, ut setam in eas immittere potuerit; ideoque maximas intestinorum rafforum æquaverint. 6. *Glandulas parvas in urethra virili* describit TERRANEUS (d), quas hinc inde in ipsa cavernosa urethræ parte hære- re perhibet, urethram multis foraminulis perforan-

(a) *Hippocrates* lib. de Glandul. multa loquitur de glandulis epiploï sive omenti; sed voce epiploï mesenterium intellexisse mihi videtur.

(b) Vid. *Ephem. Nat. Curios. Cent. V. & VI. pag. 343. Tab. VI. fig. I II.*

(c) In prodrom. physiologico.

(d) In *Tract. de Glandulis*, pag. 32.

forantes, & liquidum lumbricum in eam excurrentes. Harum vero nullam adhuc offendere potui. Hoc vero vidi, quod MORGAGNIUS scripsit (a), *foraminula* scilicet illa, *retento intus liquore, turgidula non raro, specie subrotundorum albescentiumque corpusculorum imponere*. Testes vero cum epididymidibus a glandulis propter distinctionem, quia manifesto vasculosi sunt, *habitu glandulæ* destituuntur, & veteres & plerique et recentioribus eos quoque a glandulis distinxerunt.

In naturalibus mulierum.

393 In partibus mulierum naturalibus ad glandulas referri possunt, 1. eæ, quas MORGAGNIUS in nymphis detexit atque descripsit (b) magnam cum odoriferis præputii penis similitudinem habentes. Hæ glandulæ quidem non in omnibus feminis æque magnæ & conspicuæ sunt, ut ab ipso delineantur: quod inde fieri existimo, quia ipsæ nymphæ in diversis subjectis figura & magnitudine multum diversæ sunt: & ubi nymphæ valde exiguæ, ibi hæ glandulæ vix in conspectum veniunt: contra vero, ubi illæ magnæ glandulæ hæ quoque manifestius se ostendere solent, eæque ut plurimum tanto majores, quanto nymphæ majores existunt. Ita enim in muliere, nymphas valde amplas & simul crassas habente, nonnullas eadem magnitudine offendi, quali a MORGAGNIO delineantur. In aliis autem eas vix, aut prorsus non conspiciere potui. 2. *Glandulæ in urethra muliebri* æque ac in virili statuuntur. (c) Meis quidem observationibus ductulos in urethra vidi, at nullas glandulas videre potui. 3. *Circa urethræ vero ostium in vagina uteri*, ubi lacunæ se manifestant, *seatas* admittentes, in cadaveribus quandoque glandulas

(a) Advers. anat. prim. §. 10.

(b) Advers. anat. I. Tab. III. &c.

(c) Bidloo Anat. Tab. 51. fig. 4. Terræneus de glandulis pag. 44. & alibi.

ulas subjacentes offendi, qualem valde insignem MORGAGNIUS (a) delineat. Has vero & lympharum glandulas sæpius valde turgere observavi partus tempore, quando mulieribus in partu difficili, verrendo atque extrahendo fœtum, adstiri: quia tunc partibus his a sanguine, copiosius influente, turgescunt, omnia minus in conspectum prodeunt, quam in cadaveribus: ubi non raro, neque ductus, neque glandulæ apparent. 3. *Vesiculæ circa uteri orificium æternum* sæpe occurrentes, p. 100. in gravidis & puerperis optime apparentes, pro ovario non a quibusdam reputatæ, non pro glandulis haberi posse cenfeo: partim quia faciem sive habitum glandulæ non obtinent, partim quia confuso inde oriretur vesiculosi & glandulosi: quippe quæ partes a veteribus semper pro distinctis partibus habitæ fuerunt, ideoque & hodie non confundendæ, sed pro diversis habendæ sunt; alias enim ovarium quoque aliæque partes vesiculosæ glandulas transmutarentur. 5. In utero nonnulli glandulas statuunt, pro sanguinis menstrui secretionem perficienda: quod præter alios LITÆUS præsertim sæpe fecit in Historia Academiæ Regiæ. Non quod eas viderit, aut figuram, magnitudinem, vel habitum earum descripserit; nam non entis nullæ sunt affectiones) verum tum quia falsa illa hypothesi imbutus erat, illam fieri secretionem sine glandulis.

394 In placenta uteri ob eandem forte malam hypothesin varii glandulas statuerunt, & nonnulli adhuc statuunt, licet nullus, quomodo se habeant, descripserit aut demonstraverit. E contrario frequentes Ruysschii observationes, variis in scriptis ejus iteratæ, diligentes placenta pervagationes Raubolti (b), itemque nostra aliorumque

Glandulae
placentæ.

a) Loc. cit. H.

b) In Histor. Acad. Reg. An. 1714. 1715 & 1718.

que in hac parte adhibita diligentia, glandulas nullas hic detegere valuerunt; verum eam meris vasis sanguiferis coagmentatam esse, fatuevicisse opinor.

Glandula
artuum.

395 *Glandulæ ad artus sive extremitates* pertinentes, sunt 1. *Axillares*, sub alis, pinguedine involutæ, vasis axillaribus adsitæ; & 2. *Inguinales*, utrinque in inguinibus ad vasa cruralia collocatæ; quæ variis in morbis sæpe intumescunt, inflammantur, & in abscessus vel quandoque scirrhus insanabiles tendunt. Harum vero usus haud manifestus est. 3. In artubus occurrunt quoque *Glandulæ Haverianæ* (a), a usu *mucosæ* dictæ: quæ in articulationibus ossium, præcipue femoris, tam ubi cum acetabulo ossis innominati, quam ubi cum Tibia iungitur, quam maxime observantur. In aliis quidem iuncturis quoque tales reperiuntur, verum longe minores. Hæ glandulæ omnium mollissimæ sunt, & *liquidum mucosum* secernunt, quod in iuncturis ossium deprehenditur, pro extremitatibus eorum lubricandis, ut motus libere atque expeditè fieri queant, & ne invicem concrecant. Hæ glandulæ multum ad pinguedinis quandam subtilem speciem accedunt, qualis etiam in interstitiis quorundam muscutorum, itemque in canali vertebrarum, circa spinalem medullam deprehenditur; ita ut ambiguum sæpe sit, utrum vera glandula, an pinguedo quædam laxior, cui *Ruyschio* & mihi similior videtur, adsit. Ceterum etiam circa *scapulam*, *flexuram cubiti*, *manus*, *genu*, *pedis*, aliisque in locis inter musculos variæ hinc inde parvæ glandulæ reperiuntur, quas vero omnes sigillatim hic recensere, earum incertus numerus, situs, figura, & magnitudo, tum compendii brevitās prohibent.

(a) In Osteologia Haveri descriptæ.

396 Restat, ut pauca adhuc de glandulis cutaneis dicamus. VERHEYENUS (a) inquit STENONEM observasse, singulis poris cutis suam glandulam subjacere, ex qua vasculum sudoriferum, in exteriori cutis superficie desinens, exurgeret: inde VERHEYENUS, licet ipse se tales vidisse non affirmet, eas glandulas subcutaneas appellat. Sed quot, quælo, tales glandulæ adessent, si omnibus poris (quorum infinitus est numerus,) glandula subesset? tantus certe numerus visum effugere non posset. Attamen, si cutis a subjecta pinguedine exacte separatur, nullæ glandulæ, neque in superficie pinguedinis, neque in inferiori cutis facie conspiciuntur. Pinguedinis quidem exiguae particulæ foveolis cutis hinc inde adhærere semper deprehenduntur, quæ multis imposuisse videntur, & quæ mihi quoque in juventute ab uno præceptorum meorum pro glandulis demonstratæ sunt; quæ vero a glandulis ab accurato spectatore nullo negotio distinguuntur. Hinc certum esse puto, glandulas subcutaneas, id est, tales, quæ cuti sub quovis poro subjacerent, quasque miliares vulgo appellant; non dari. Videtur potius hypothesin hanc a falso illo axioma ortam esse, *ubique secretio, ibi glandula*; dum enim STENO aliique cognoverunt, e singulo poro fieri excretionem; hinc ex illo axioma judicasse videntur, etiam cuivis poro glandulam subjacere; quod vero falsum esse jam supra N. 364. probavimus. In ipsa vero cute, aut superficie ejus exteriori, sub epidermide, variis in locis corpuscula sphaeroidea, una cum ductulo excretorio sæpe conspiciuntur, præsertim in palpebris, naso, auribus, areolis mamillarum, sub alis, in cute penis & scroti, circa anum & pudenda mulierum &c. quæ

T

si tan-

(a) Anat. cap. de cute, cap. 35.

si tanquam peculiaria corpuscula adsunt, pro glandulis cutaneis, sed non pro subcutaneis haberi possunt: quia non sub cute deprehenduntur.

*Epicri-
sis de
illis.*

397 Circa quas vero adhuc notamus, 1. eas non æque copiosas, nec æque magnas, in omnibus occurrere; nam in quibusdam nasus & palpebræ corpusculis talibus miliari magnitudine scatent, eisque exasperatæ sunt, ita ut notabilis faciei deformitas inde inducatur; in quibusdam vero paucissimæ æque exiguæ; in aliis vero prorsus nullæ conspiciuntur. Sic cutis penis & scroti quorundam talibus corpusculis valde luxuriat; in aliis contra vix ulla, vel nulla prorsus reperiuntur. Ita in areolis mammarum rarius tam magna deprehenduntur, quam a MORGAGNIO delineata sunt. (a) Unde patet, eas & numero, & loco, & magnitudine multum variare. 2. Mihi aliisque variis adhuc dubium superesse, utrum hæc tubercula veræ sint glandulæ: & an non potius ductuli excretorii, ex arterioli cutis provenientes, qui vel a densitate cuticulæ, vel a crassitudine materiæ contentæ obstruuntur, & deinde in tubercula expanduntur. Ita etiam sentiunt RUYSCHIIUS & BOERHAAVIUS; (b) qui eas propterea folliculos, cryptas, sive receptacula cutanea appellant. Ita quoque sentit VERCCELLONIUS, dum affirmat (c), glandulas sebaceas (ita enim recentiores hæc tubercula appellant) meras esse extremitates arteriolarum in folliculos expansas: ut & BIANCHUS, dum glandulas cutaneas nec esse, nec necessarias esse ad secretionem in cute iudicat. (d) Ratio etiam suadere videtur, has particulas globosas non esse

(a) Advers. anat. prim. Tab. IV. fig. 2.

(b) Ruysschii Advers. anat. Dec. I. pag. 9.

(c) Dissert. de Glandul. conglomer. œsophagi p. 150.

(d) In Hepatis Historia.

esse veras glandulas : 1. quia in tam multis hominibus sanis prorsus defunt, vel saltem variis in locis non in conspectum prodeunt. 2. Quia, postquam digitis contenta sive stagnans materia viscida aut sebacea exprimitur, totum tuberculum disparet, & pars concidit; id quod non fieret, si tuberculum vera glandula, hoc est, peculiare quoddam corpusculum, ex vasculorum congerie, peculiari membrana inclusum fuisset, licet aliquid inde fuisset expressum. Igitur hanc rem, & multa alia circa glandulas momenta, uberiori eruditorum disquisitioni commendo, antequam aliquid certi de iis affirmetur; ut sic veritas in dies augeatur, atque promoveatur.

398 Hanc meam de glandulis sententiam, tanquam claram, perspicuam, cum natura glandularum, & cum mente veterum, imo & cum vulgi de glandulis idea optime convenientem, multis hucusque eruditis haud displicuisse intellexi; imo a Medico Gallo tanti fuit habita, ut totam meam Adenologiam præcedentis editionis verbatim Gallice verterit & in suam Anatomien transtulerit. (a) Neque ullum novi, qui hanc meam sententiam adhuc impugnaverit, nisi Clariss. *Michelottum*, Medicum & Mathematicum Venetum nobilissimum, in tractatu de separatione fluidorum in corpore animali; qui finxit, se ignorare, quid per peculiarem glandularum habitum velim, dum scribit: „Neque vero eos de sententia (scilicet Malpighiana) deducunt, quæ Heisterus per peculiarem habitum, nescio quem, definire conatus, nuperrime opposuit, p. 34. Sed præterquam quod vulgus & mulieres glandulas ex solo & noto eorum habitu, non ex libris, non aliunde, non ex definitione aut descriptione vel doctissima cognoscunt, ipse Mi-

*Michelottiob-
jectionibus
respon-
detur.*

(a) Noguez Anatomie du corps de l'homme 12. Paris 1723.

chelottus satis indicat, se hunc *glandularum habitum* haud ignorare, atque sic meam glandulæ descriptionem non adeo obscuram esse, quando pag. 235. ita habet: „ *Facile concederem, de*
 „ *glandularum majorum, & quarundam minorum*
 „ *structura exteriori per faciem quandam, seu*
 „ *habitum exteriorem judicari posse &c.* Consentit præterea mecum, non omnes secretiones sive separationes fluidorum interventu vesiculæ aut folliculi fieri, sicut *Malpighii* rigidiores affectu voluerunt, dum ait: „ *Ceterum convenit mihi*
 „ *cum Heistero, separationes fluidorum in ani-*
 „ *mantibus sine folliculis, sive vesiculis interje-*
 „ *ctis, & fieri posse, & revera etiam plerisque*
 „ *in partibus ita fieri.* Verum sustinet, *abditam*
 „ *& penitissimam glandularum, & præcipue mini-*
 „ *marum, constitutionem, non in singulari exteriori*
 „ *facie sive habitu, sed potissimum in earum stru-*
 „ *ctura vasculosa, fluidorum separationi maxime op-*
 „ *portuna, consistere: atque inde concludit p. 236.*
 „ *cerebri partem corticalem, hepatis, renum, atque*
 „ *testiculorum partes vasculosas penitissimas in glan-*
 „ *dularum numerum referendas esse.* Verum hæc
 sententia jam supra num. 368. & seqq. satis, ut
 opinor, refutata est; dum demonstravi, confusio-
 nem partium inde oriri, quando inter partes vas-
 culosas & glandulosas, ab antiquissimis tempo-
 ribus distinctas, distinctionem jam tollere veli-
 mus, ita enim quælibet fere pars corporis fie-
 ret glandula; quod profecto valde incongruum
 esset: dum scapha scapha, & quælibet res suo
 proprio nomine, si distincte, clare, & accurate
 loqui atque judicare velimus, appellanda sit.
 Præterea Auctor doctissimus ex sua de glandula
 idea, quam in sola structura vasculosa consistere
 indicat, non male eos sentire existimat, qui
 ubicumque secretiones, sive liquorum separationes,
 ibidem glandulas esse pronuntiant. Sed & hanc
 sen-

sententiam confusiones & errores parere, quodque jam supra num. 364. 393. & 395. indicavi; quia chylus sine glandulis in intestinis, pinguedo sine glandulis, mucus in sinibus pituitariis, genitura in testiculorum vasculosa fabrica, sanguis menstruus in utero sine glandulis &c. feceruntur, & omnes membranæ, imo omnes fere partes glandulæ in posterum essent vocandæ; quod revera neque cum sententia veterum, neque cum natura partium convenit, atque ab idea, quam vel vulgus, vel alii sapientes, qui Medici aut Anatomici non sunt, de partibus habent, qui glandulas, musculos, pinguedinem, membranas, intestina, vasa &c. facie satis distinguunt, nimis abhorreret. Veniunt mihi occasione hujus jam in mentem aliquot disticha, quæ aliquando in honorem cujusdam Medicinæ Candidati, de glandulis disputantis, Altorfii adhuc confeci; quæ quia non male huc quadrant, apponere lubet.

Dicere difficile est Medicis, quæ *glandula* pars sit;

Nondum Doctores hoc docuere fatis.

Corporis hinc omnes mire confundere partes

Cœperunt, & pars *glandula* quævis erat.

Nunc quivis plexus valorum *glandula* dictus;

Nunc membrana omnis *glandula* facta fuit.

Mox cerebrum, splen, pulmo, jecur, renes

que vocati

Glandula; nunc quævis *bullula* talis erat.

Ast qui distinguit partes, quas visus & usus

Distinguunt priscus, rectius ille docet.

Quapropter quamvis & ego glandulæ abditam

& penitissimam substantiam vasculosam esse in

definitione mea S. 33. posuerim, tamen quia

quam plurimæ partes vasculosæ existunt, quæ

immerito & non nisi nimio novaturienti studio

glandulæ vocarentur cum Malpighianis, hac in

Adenologia ostendi, vesiculosum & vasculosum esse ad glandulæ definitionem non sufficere; & cum nec secretio, ut modo evici, neque aliud quid, mihi hætenus notum, sufficiat ad glandulas re vera extra controversiam tales, quasque veteres ita appellarunt, ab aliis partibus distinguendas, *faciem illam peculiarem sive habitum glandulæ proprium*, pro iis ab aliis rite discernendis in auxilium vocandum esse merito iudicavi & adhuc iudico, atque has forte ob causas egregius Anatomicus Argentoratensis, *Henricus Albert. Nicolai*, hypothesein *Michelotti* de glandulis *præcariam esse*, pronunciavit dissert. de directione vasorum, pag. 7.

Atque
etiam
Boer-
haavii.

399 Neque a me a me abducunt sententia, quæ *Clariss. Boerhaavius* proluxa epistola ad *Ruyschium* in favorem hypotheseos *Malpighianæ* in medium produxit. Sciendum enim est, *Ruyschium* atque *Boerhaavium*, Medicos in Belgio principes, meosque olim Præceptores æternum venerandos, sæpius amice de glandulis coram disputasse. Cumque *Ruyschius* pro sua, *Boerhaavius* pro *Malpighiana* staret hypothesei, convenerunt inter se, ut *Boerhaavius* epistola ea, quæ pro *Malpighii* sententia facerent, complecteretur; *Ruyschius* contra hæc, si posset, responsione impugnet, everteret, suamque uberius illustraret atque vindicaret sententiam; idque postquam factum esset, binæ hæ epistolæ titulo opusculi *Anatomici de fabrica glandularum in corpore humano*, evulgatæ sunt. (a) In priori harum *Boerhaavius* summa, qua pollet, ingenii vi omnia produxit argumenta, quæ pro *Malpighiana* moveri possunt hypothesei; quamvis, ut ipse fateretur, sæpius minus a *Ruyschio* dissentiat, quam ex verbis ipsius colligi possit; quibus deinde in posterio-

rio-

(a) Lugduni Batavorum An. 1722. in 4.

rioribus literis *Ruyschius* nerveose respondit. At tamen, quia nonnulla haud exigui in hac doctrina momenti superesse puto argumenta contra *Malpighium*, quæ *Ruyschius*, tunc fere nonagenarius, & negotiis multis, laboribusque Anatomicis continuo distractus, imo obrutus, prætermisit, venia nobilissimorum horum Virorum, in primis *Boerhaavii*, mihi semper amicissimi, non contradicendi, sed veri studio, quædam adhuc pro *Ruyschiana* meaque firmanda sententia proponam, & responsioni *Ruyschianæ* quasi superaddam. *Malpighius*, & qui eum sequuntur, atque adhuc ipse *Michelottus*, glandulam *vesicula*, vel *folliculo* membranaceo construi, sicut jam supra satis exposui, docuerunt. Verum *Boerhaavius*, qui tamen *Malpighii* partes, si servari possent, majori studio & acumine, quam forte unquam alius, defendendas suscepit, in hoc mox ab hujus sententia recedere videtur, dum glandulam *simplicissimam* definit partem, quæ propriæ membranæ simplici apparatu format involu-
crum, cavum, intra quod singularis humor secer-
nitur, &c. pag. 3. & 4. Verum cum *involucrum*, ut notum est, nihil aliud propriè sit, quam integumentum; integumentum vero alicujus partis non sit ipsa pars, ut *involucrum* hepatis non est ipsum hepar: atque sic *involucrum* glandulæ (venia tanti viri) non est ipsa glandula: idcirco *involucrum* pro glandula ipsa rectè ac citra confusionem sumi aut haberi non potest. Quod si vero *Clariss. Auctor involucri* voce, eoque inusitato & improprio utatur sensu, pro folliculo aut vesicula, cum *Malpighianis* reliquis, præter ea, quæ supra jam hac de re disputata sunt, hoc solum adhuc hic monebo, atque æquis arbitris judicandum relinquam, an non, si *vesiculam*, *folliculum*, aut *involucrum* pro glandula habere velint, *vesiculæ* & *glandulæ* voci novam

prorsus atque veteribus inusitatam, imo incognitam prorsus significationem affingant, atque utramque confundant? Velim enim, ut demonstrent, quis auctorum veterum, Græcorum aut Latinorum, aut quis ante Malpighium, *vesiculam*, *folliculum*, aut *involutrum* pro glandula habuerit, aut glandulam vocaverit? Manifestum enim est, novas ejusmodi significationes vocabulorum hodie sine confusione rerum introduci non posse: nam est re vera nova prorsus ac veteribus incognita vocis glandulæ & vesiculæ notio, quæ præterquam quod nova, &, me judice, incongrua sit, non modo præter necessitatem excogitata est, sed etiam ad confusiones & errores producendos aperte facit. Concedo quidem summis his Viris, dari in corpore humano, variis in partibus, vesiculas aut folliculos, *intra quos liquida diversa secernuntur, continentur, foveantur, mutantur, & per emissarium denique excernuntur*; vero nego has partes glandulas recte aut jure vocari. Nam vesica urinæ, vesicula fellea, vesiculæ seminales, vesiculæ in sinibus ossium cranii, *partes sunt cavæ; intra quas liquida diversa secernuntur, continentur, foveantur, mutantur, & per certa emissaria denique emittuntur*, habentque sic omnia requisita, quæ a Clariss. Boerhaavio glandulæ adscribuntur: nemo tamen veterum, nemo recentiorum, has partes glandulas vocavit, aut glandulas esse voluit; verum suo genuino eas nomine *vesicas*, aut *vesiculas*, omni ævō appellarunt. Quare si etiam clare demonstrentur vesiculæ, variis in corporis partibus, in quibus vel re vera adsunt, ut in cute, vel in quibus ex adhuc in statu secundum naturam sunt dubiæ, in quas *liquidum quoddam secernatur, contineatur, foveatur, mutetur, & per emissarium emittatur*: tamen inde non evincitur, glandulas esse in illa parte, sed vesiculas: eamque

que ob causam eæ etiam partes non glandulosæ, sed vesiculosæ appellandæ erunt: quia ut vesicæ vel vesiculæ majores, quas antea nominavimus, se habent, adeoque & idem nomen ipsis dandum est; nisi data opera æquivocationes, logomachias, & confusiones in rem anatomicam & medicam magno ejus damno invehere velimus: nam juxta tritum illud,

Errorum genitrix est æquivocatio semper. Ubi igitur non nisi vascula deprehenduntur, illæ partes *vasculosæ*; ubi vesicæ, illæ *vesiculosæ*; ubi vero glandulæ, illæ etiam *glandulosæ* vel *glandulæ* appellandæ sunt. Itaque in cutis variis partibus, ut in naso, auriculis, aliisque partibus folliculi aut vesiculæ deprehenduntur, in quibus liquidum unctuosum, illudque sæpe testax & sebaceum reperitur; hæc vesiculæ sive folliculi, quia sunt vesiculæ, & nullam, me judice, faciem glandulæ obtinent, ob rationes expositas immerito glandulæ appellantur; verum rectius *folliculi*, *receptacula*, *cryptæ*, omnium vero optime *vesiculæ cutaneæ* dicerentur; quia ea habent requisita, quæ vesicæ reliquæ supra nominatæ, & ab iis vix nisi magnitudine differunt. Cur itaque his vesiculis nomen vesiculæ negent Malpighiani, aliudque haud congruum, novum, confusiones pariens, & cum earum natura ac ratione non conveniens imponant, causam gravem aut urgentem video nullam; supraque jam (§. 367.) monui, quod si etiam in hepate, renibus, cerebro &c. in naturali ac sano statu vesiculas re vera adesse demonstrent, viscera tamen hæc immerito *glandulosa*, sed **VE-
SICULOSA**, ob causas modo & supra alias, dicenda sint. Ubi vero vesiculæ ejusmodi glandulosa carne, id est, tali substantia cinctæ sunt, quæ glandulis, sive partibus, quas nemo glandulas esse negat, propria est, vel quæ faciem & habi-

habitus glandulæ omnibus notum obtinet, videmus adesse in glandulis labrorum (a), asperæ arteriæ (b), palati, pharyngis, & intestinorum præsertim duodeni & recti, tunc hæ partes glandulæ jure & recte nominantur; verum non *vesiculam*, ut Malpighiani volunt, multo minus ob *involucrum* membranaceum; sed propter peculiarem earum faciem & carnem glandulosam qua vesiculæ hæ cinguntur; quippe ob solam hæ faciem, aut ut clarius loquar, ob hanc carnem propriam (non ob alias causas) ut supra eici, veteres certas corporis partes glandulosas appellarunt, (quorum nomina præter necessitatem non mutanda) adeoque & nobis non tales partes glandulæ appellandæ sunt; alias, abunde demonstravi, æquivocationes, rerum partium confusiones, atque errores necessario quuntur; quæ omnia evitantur, si a veteribus in glandularum appellatione non recedamus, sed cum ipsis, ut par est, consentiamus.

400 Denique adhuc monemus, tumores illos quos Clariss. *Boerhaavius* cum *Malpighio* in folliculis sive vesiculis cutaneis oriri & existere dicat, ut atheromata, steatomata, talpas, &c. mea sententia non in cute oriri, sed sub cute quotiescumque enim tumores ejusmodi, quos sæpe feci, scalpello exstirpavi, non solum ante curationem sub cute actu percepi, verum quando eos excidere volui, tota mihi semper cutis prius discindenda erat, antequam ad tumorem ejusque folliculum pervenire potuerim, quod etiam ex iis exemplis, quæ auctor clarissimus ipse vidit, & descripsit pag. 14. &c. manifestum est. Unde liquido constat, quod parum tota hæc de tumoribus cysticis recitata ad glandularum cutanearum, alique morborum casus

(a) Vid. Tab. nostra VIII. fig. 36. dd.

(b) *Morgagn.* Advers. anat. I. Tab. II. oo.

casus ad aliarum glandularum probationem faciunt; dum partes nimis a statu naturali recedere possunt; præsertim cum veræ glandulæ vix nunquam, partes vero vasculosæ sæpissime in hyatides aut vesiculas mutantur; ubi quam maxime etiam ille casus, in hoc libello recensitus, notatu dignissimus est; ubi totum hepar in hyatides fuit mutatum, ut de vena portæ & vena cava nullum superfuerit vestigium: id quod normem partium in morbis transmutationem docet, unde nihil de vera partis fabrica disci potest.

SCHOLION.

HIPPOCRATEM in glandularum descriptione ad habitum earum potissimum respexisse, ex hoc intelligi posse puto, quando ita loquitur: (a) *Natura ipsis est spongiosa: sunt enim raræ & pingues; neque carnem habent reliquo corpori similem, neque aliud quid corpori simile, sed friabilem & multis venis (hoc est vasis) refertam.*

NO.

(a) Lib. de Glandulis.

NOTÆ, SIVE ILLUSTRATIONES
quorundam locorum, quæ tabulis nostris
anatomicis commode inferi non
potuerunt.

De offi-
culis
sesa-
moi-
deis.

NOta (1*) ad finem pag. 50. Solertissim
quondam noster per quadriennium, & quo
excurrit, auditor, Dn. *Christ. Jac. Trevv*, nu
Medicinæ Doctor Norimbergæ celeberr. obser
vationem anatomicam Ephemeridum Centu
VI. Anno 1717. per me inferi curavit, quæ il
dem pag. 245. legitur, *de ossiculis quibusdam ju*
samoideis, quæ suo Marte, in cadaveribus variis
in Theatro anatomico Altorfino a me dissectione
invenit, & in hac Observatione, tanquam nova
va, descripsit, atque delineavit. Hæc vero con
servatio, licet sub *TREVVII* nomine a me trans
missa fuerit; certas tamen ob causas ab illustri
bus harum Ephemeridum directoribus, pau
mutatis, sub meo nomine, me tamen inscio
inconsulto, impressa est; quod propterea hic in
dicare volui, ne vel ipse *D. TREVVIUS*, vel alii
quibus illud notum fuit, existiment, me hono
ri ipsius aliquid detrahere, aut mihi quid, quod
tamen meum non est, tribuere voluisse: ideo
que totam illam observationem ad laudatum
TREVVIIUM pertinere, publice hic profiteor. C
terum illa ab ipso descripta ossicula, præsertim
ea, quæ in ossibus femorum locantur, antequam
ea *TREVVIUS* nobis monstravit, ut verum fatear
ignoravi, & tunc tanquam nova consideravi
cum primis quia *Cl. RAVIUS*, meus olim in anat
ome, & præsertim in Osteologia præceptor
(cui graves ob rationes fidem adhibueram) et
in demonstrationibus suis osteologicis non solum
non demonstravit, sed etiam in Osteologia su
scripta, quam tunc temporis cum auditoribus
suis

uis communicavit, atque describendam dedit, aperte negavit, dum ita de ossibus sesamoideis locutus est. Notandum, inquit, me ossium numero non plura ossa sesamoidea adscribere, quam decem; duo scilicet, ad secundum articulum utriusque pollicis manus & pedis; unum in utroque tendine musculi tibialis postici (a) innatum. Ceteri digitorum articuli NUNQUAM hæc habent, rarissime prædictus tendo, &c. Atque sic RAVIUS illa in femore, & auriculari digito sita non tantum fisset, verum etiam reliqua omnia sesamoidea, præter decem illa enarrata, negat. Deinde cum viderem HORNIUM in microcosmo suo, hujusque commentatores, (qui tamen viri fuerunt doctissimi) alioque multos anatomicos hæc ossicula quoque prætermisisse; itemque VERHETENUM (b) illa in femore locata non sua observatione, sed tantum secundum BARTHOLINI assertionem commemorasse, imo MARCHETUM, celebrem quoque anatomicum, asseverasse (c), se nunquam hæc ossicula in femore a quibusdam descripta reperire potuisse, quamvis multis in cadaveribus investigaverit: hinc sententiæ RAVII, quem in ossibus & musculis egregie versatum sciebam, fortius adhærebam; præsertim cum ea etiam aliquoties, sed frustra, inquisiverim. At TREV-
II demonstrationibus revera convincebar, dari minino interdum ossa sesamoidea adhuc alia, quam quæ a RAVIO mihi indicata erant. Cum vero postea horum ossiculorum causa plures anatomicos pervolverem, atque ex variis cognoscerem, non unum, sed duo ossicula sesamoidea in
ea

(a) Forte hic Ravius loco tibialis postici, peronæi posci scribere voluit: ego enim, Vesalius, alique, non in tibiali, sed in peronæo postico ossiculum sesamoideum innuimus.

(b) In Anatom. Cap. de ossibus sesamoideis.

(c) Anatom. Cap. XIX. ubi de musculis gastrocnemii agit.

ea femoris parte, ubi musculi *gastrocnemii* originem habent, in senibus non raro reperiri, nominatim ex *VESALIO* (a), *RIOLANO* (b) (q) primam inventionem eorum *VESALIO* adscribit *BARTHOLINO* (c), *MUNNICKIO* (d), *DRACK* (e) &c. Ex *FALLOPIO* vero (f) & *COVVEPE* (g) eos tantum unum ibi reperire potuisse, quod idem forte erit, quod *TREVVIUS* descripsit: hic hujus consensu hic monere volui, *hæc ossicula esse nova*, sicuti prima fronte ipsi, mihi, aliisque multis apparuerunt; attamen quia hoc tempore fere oblivioni data erant, & a nemine attea unquam mihi demonstrata, vel indicata imo a magnis Anatomicis variis frustra quæta, & hinc vel negata, vel saltem silentio prætermissa, nec usquam delineata fuerunt; quapropter, licet non nova sint, tamen curiosis anatomicis haud ingratum erit, quod *TREVVIUS* unum & deinde ego etiam alterum in femore, oblivioni quasi tradita, non solum resuscitaverimus sed etiam novis experimentis comprobaverimus atque figuris naturali magnitudini respondentibus illustraverimus: (conf. Tab. I. fig. 2. 3. 4. multum enim figuræ partium, nondum satis cognitarum, ad anatomen perficiendam exornandamque faciunt. Ita in vertebræ lumbaris primæ processu laterali ossiculum sesamoideum laterale ejus utrinque adhaerens & peculiari sinui insidens se vidisse commemorat *Clariss. Schulzius* in *Commerc. litter. Universal. A. 1731. pag. 33.*

De epidermidis ge

(2*) ad §. 196. pag. 58. Explicatur generatio & regeneratio epidermidis alio modo a *CL. MORGAGNI*

(a) Corp. human. Anat. Cap. 28. Lib. I.

(b) Anthropograph. Lib. V. Cap. 42.

(c) Anathom. Cap. de Ossib. sesamoideis.

(d) De Re Anatomica §. LXV. ubi de his ossib. agitur.

(e) Anthropolog. pag. 729.

(f) Observ. Anatom. mihi pag. 441.

(g) Myotom. Reform. Cap. 34. p. 206.

NLO in Advers. anatom. alteris pag. 13. Nimi- neratio-
 m cuticula ipsi nihil aliud esse videtur , nisi ne, præ-
 sa summa cutis superficies , a compressione exter- para-
 durata , & quasi callescens : unde insensibilis tione &
 quasi emortua esset . Sed ingeniotæ huic con- vasis .
 turæ obstare existimo cuticulæ jam in fœtu ,
 ero adhuc incluso , præsentiam : ubi liquoris
 nni mucilago , fœtum ambiens , non admit-
 re vel efficere posse videtur talem cutis com-
 pressionem , qualis ad cuticulæ productionem ,
 siccationem , & quasi callescentiam requirere-
 . Præterea , quomodo cuticula & corpus re-
 gulare Malpighii optime sint præparanda , egre-
 Ruyschius docet in Advers. anat. III. p. 26.
 & anatomicum Anglum , cui S. Andreæ
 men , fortiter impugnat : qui non solum vasa
 dermidi adscripsit ; verum etiam affirmasse
 itur , se vasa hæc ita replere posse , ut rubra
 teria injecta valde turgerent , atque ubique
 ero oculo copiosissima apparerent : quæ vero
 yschius negavit .

3*) ad S. 198. p. 61. Recentiores nonnulli de- Dezlan-
 bunt glandulas , in cute hinc inde existentes , dulis se-
 as sebaceas appellant , præsertim in auribus , baceis .
 pebris , naso , areolis mammarum , scroto , &
 is cute , præputio , in nymphis & labris puden-
 um muliebrium , circa anum , axillas , sive alas ,
 ex quibus materia quædam crassa , sebo si-
 is , hinc sebacea dicta , sæpe exprimi potest .
 as vero partes non nisi extremitates esse arte-
 rum , in folliculos expansas , contendit BER-
 RUS (a) & VERCELLONIUS . (b) Deinde
 corpuscula potius Receptacula esse humoris
 osi , unctuarii , quam veras glandulas , docet
 VERHAUVIUS (c) , quæ subtili foramine , quod
 emis-

) In Physiologia variis in locis .

) In Dissert. de glandul. œsophagi p. 150.

) In Ruysch. Advers. Anat. dec. I. p. 10. & seq.

emissarium eorum est, epidermidem perforant: atque hunc humorem ex cutis arteriis minimis, in hæc *receptacula cutanea* desinensibus, deponi; qui, dum secernitur, tenuis est. Quando vero ex quacunque causa diutius ibi haereret, exhalante parte tenuissima, reliquum spissari, ceræ sive sebi indolem adipisci, & bercula creare, quæ glandulas referrent, in facie frequentia, in primis in naso & fronte. Hæc fortiter pressa eructare materiem lentam, viscam, sebaceam sive ceraceam, quæ sæpe exquiritur vermiculum repræsentaret, ut multi homines imagine decepti putent, se vermes cutaneos vidisse. Inde postea *pustularum*, *atheromatum*, *meliceridum*, aliorumque morborum cutaneorum originem, perquam erudite, ut solet, deducere voluit. Hanc de ita dictis *glandulis cutaneis* opinionem non solum semper fovi, sed etiam, quando Anatomen doceo, docui. Sed de his plura jam dicta sunt in Adenologia; ex quibus verum minimum id evictum esse credo, glandulas raras cutaneas tanta copia non dari, ut cuivis *raminulo cutis insensibili*, sive *unicuique poro* ut subjecta sit: sicuti STENO, & multi alii per eum crediderunt, atque docuerunt. Cl. Boerhaavivius, in epistola ad Ruyschium de glandularum fabrica, hos folliculos pro veris glandulis habere videtur: cui vero & Ruyschius in responsione contradicit, & nos de hac hypothese N. 339. sententiam nostram exposuimus.

De li-
gamen-
to Pou-
partii.

(4*) ad S. 205. p. 67. *Ligamentum*, ita dictum *Poupartii* (a), perhibetur esse ligamentum transversum a spina anteriori ossis ilei ad supremam ossis pubis partem extensum: quo conniventia musculorum abdominis, ubi processus peritonæi & vasa spermatica in viris transeunt, firmam per-

(a) In Hist. Ac. Reg. Scient. A. 1705. pag. 64.

perhibent, ne tam facile intestina prolabi, aut herniæ generari queant. Sed recte **MORGAGNIUS** Advers. Anat. III. p. 2. negat hæc ligamenta, eaque nihil aliud esse sustinet, quam imam oram sive limbum tendinis musculi oblique descendentis: quæ etiam semper mea mens fuit, & propterea, ne entia præter necessitatem multiplicarentur, silentio hæc ligamenta in prima editione mei Compendii anatomici, tanquam partes seorsim non existentes, prætermisi. Consentit etiam nobiscum *Couperus*. (a) Interea tamen robore suo ligamenti munus præstare videtur; ne intestina facile prolabi & herniæ hic generari queant: id quod *Vesalius* haud ignoravit, sed plane satis indicavit. (b)

(5*) ad S. 205. pag. 66. Celebris *Tournefortius* (c) aliquando Medicis persuadere voluit, vomitum a solis musculis abdominis perfici: verum *Schellhamerus* jam dudum hanc sententiam rejecit. (d) *Chiracus* autem postea & *Du Verneus* vomitum a motu extraordinario diaphragmatis & musculorum abdominis simul fieri sustinuerunt, absque concursu ventriculi. (e) Verum *Littrius* & hunc ad hanc actionem concurrere, gravibus rationibus evicit. (f)

(6*) ad S. 206. pag. 68. Varii scriptores perhibent, se in peritonæo, pleura, & pericardio, corpuscula sphæroidea (quæ glandulas esse vocant) observasse. Verum quia hæc observationes omnes ex corporibus ægris, sive ex statu morbooso sunt desumptæ, & in sanis nunquam, quantum novi, adhuc visæ; hinc potius existimo hæc

V
cor-

An a muscu-
lis ab-
dominis
vomi-
tus?

De glan-
dulis pe-
ritonæi,
pleura
& peri-
cardii.

(a) In nova sua Myotomia p. 2. & T. XIV. XV.

(b) De Fabrica corp. hum. Lib. II. c. 31. p. 334.

(c) In Catalog. plantar. Parisiens.

(d) In Analest. anat. Dissert. VIII. in fine.

(e) Hist. Acad. Reg. An. 1700.

(f) Ibidem.

corpuscula glandulas repræsentantia, nil nisi tubercula morbo producta existere, a stagnatione materiæ terrestris, aut viscidæ, in minimis arteriis harum membranarum orta: quæ neglecta consideratio multas in mente produxit, atque in anatomen præter necessitatem introduxit glandulas, quæ in corpore animali sano re ipsa non existunt, & propterea in statu secundum naturam non reperiuntur. *CHESELDENUS*, recens scriptor Anglicus, scribit, se in muliere hydroptica peritonæum, tres pollices crassum, reperisse, & in hoc glandulas ejus nudo oculo conspicere potuisse. (a) At, quis ex ingenti illa atque morbosa peritonæi mutatione non suspicabitur corpuscula hæc pro glandulis habita glandulas veras non esse, sed potius res novas morbo productas? Sicuti enim quandoque in quibusdam partibus calculi, ossicula, cartilagines, athetomata, steatomata, aliaque inusitata corpora producuntur, aut partes ipsæ in ossa, imo in lapides mutantur (b), quas mutationes nemo facile pro statu naturali dijudicando habebit: ita & hanc mutationem pro naturali illarum partium statu inde cognoscendo assumi non posse credo. Neque video, quomodo certe probabunt talia corpuscula, in statu præter naturam, eaque quandoque tantum apparentia, veras esse glandulas. Idem judicandum esse puto de aliis similibus variorum auctorum observationibus, sicuti in Adenologia nostra pluribus evicimus rationibus, ad quas varii recentes scriptores, qui post me de hoc argumento egerunt, non satis respexisse videntur.

De apertura
menti
naturali.

(7*) ad §. 208. p. 70. *Foramen naturale*, sive *aperturam* peculiarem, aut *introitum* in cavum cimen-

(a) In anatome sua editionis primæ p. 96.

(b) Exempla legi possunt in Hist. Acad. Reg. A. 1700. aliisque quamplurimis scriptoribus.

omenti, invenit & descripsit *Vvinslous* (a), celeberrimus Parisiensium Anatomicus, per quem omentum, pro conformatione ipsius naturali rectius demonstranda, flatu pulchre distendi potest. Hæc apertura investiganda sub magno lobo hepatis, inter ligamentum aliquod membranaceum, quod jungit principium duodeni & collum vesiculæ felleæ hepatis, a latere eminentiæ, quæ radix est parvi lobi dicti *Spigelii*, & ligamentum aliud, quod colon nectit pancreati. Hæc duo ligamenta, dum se uniunt, intersitium sive aperturam relinquunt, quemadmodum auctor scribit, quatuor vel quinque linearum diametri in infante quatuor vel quinque annos nato, per quam aperturam ante dicta eminentia transit. Si per hanc magnus tubus immittitur, & reliquum aperturæ digitis constringitur, tota epiplooi cavea flatu expandi potest, atque epiploon tunc sacculum, quem *bursam* Galli vocant, sed inæqualem, repræsentat; cujus vero cavea, ut idem auctor notat, non solo epiplooo conficitur, verum etiam superficie superiori mesocoli, parte intestini coli & ventriculi, ac denique ea membrana, quæ intervallum occupat, quod orificia duo ventriculi intercedit, quam membranam *parvum epiploon* appellat. Usus hujus aperturæ esse existimat, ut humores, qui in cavo omenti forte colligerentur, per eam, homine præsertim dorso incumbente, effluere queant.

(8*) ad S. 208. pag. 71. *Ductus adiposos* (tamquam distincta vasa) ipse *MALPIGHIUS* in Oper. posthum. rursus in dubium vocat: neque eos necessarios esse, recte *MORGAGNIUS* innuit, advers. Anat. III. pag. 3. quia hic æque ac alibi, secretionem pinguedinis ex arteriis fieri posset in cellulas adiposas, & ex his deinde

V 2

eam

(a) Hist. Acad. Reg. A. 1715. pag. 316. edit. Amstel.

eam quoque absorberi rursus posse a venis, sine interventu tertii cujusdam generis vasorum, qualem **MALPIGHIVS** olim adesse suspicatus erat. Negat hos ductus quoque *Rivinus* dissertatione de Cimento.

De fibriscarnosis & tunica cellulosa ventriculi.

(9*) ad S. 209. p. 72. Bene monet *Clar. Morgagnius* (a), multa *Fallopium* de ventriculi structura, præsertim quæ ad fibrarum carnearum ordines attinet, docuisse, quæ postea *Vvillisius* propriis descripsit. *Helvetius* vero longe alium fibrarum muscularium in ventriculo situm, cursum ac divisionem describit & delineat, quam a aliis factum est. (b) An vero semper ita se habeant, dubito; quia aliter eas vidi, atque adhuc ventriculos humanos flatu distentos atque siccatos asservo, in quibus alia ratione se ostendunt. Adeoque potius credo, variam in variis hominibus fibrarum harum esse constitutionem. Præterea *Santorinus* vult fibras ventriculi carneas non annulares, sed spinales esse, hasque maxime in corporibus lacertosis prope pylorum conspicui posse; (c) quod vero distinguere difficile est. Clarius vero apparet tunica cellulosa ventriculi, quam *Morgagnius* sub tunica extima sive communi nuper indicavit, præsertim ea in parte quæ utraque ejus ostia interjacet. (d)

De papillis & glandulis ventriculi.

(9**) ad S. 209. pag. 72. Tunicam ventriculi villosam *Malpighius* negat (e) quia a nervea separari non posset; atque propterea tres tantum tunicas ventriculi numerat. Interea tamen villosos & papillas ventriculi non negat. Alii vero eas negant, aut saltem in dubium vocant. At tamen

(a) Advers. Anatom. III. p. 6.

(b) Histor. Acad. Reg. An. 1719. pag. 41. & Memor. pag. 444.

(c) Observat. Anatom. pag. 255.

(d) Epist. anatom. I. II. 62.

(e) Epist. de glandul. p. 9.

tamen *Ruyfchius* (a) & *Santorinus* (b) docuerunt, quomodo maceratione in aqua præsertim tepida conspicuæ reddi possint in homine; cum longe facilius videri queant in ventriculis ovium, porcorum, canum, aliorumque animalium; ita, ut de his mihi nullum amplius sit dubium. In hac tunica etiam quandoque glandulas ventriculi, eorumque oscula excretoria hiantia prope antrum pylori, *Morgagnius* in viro notavit (c); quo vero in loco se tantum oscula vidisse *Santorinus* affirmat, quæ *siphunculos* appellat. (d)

(10*) ad S. 210. pag. 73. *Glandulæ Brunneri*, quemadmodum ipse docet, in duodeno valde magnæ atque conspicuæ sunt, præsertim in infantibus diarrhœa vel dysenteria mortuis, quæ vero ut etiam in aliis hominibus melius demonstrari possint, coquendum hoc intestinum in aqua esse scribit, donec fundum petat; postea a facie interiori, ablata tunica interna, investigandæ, sic optime apparebunt, præsertim in parte ventriculo vicina.

(11*) ad S. 211. p. 75. *Albinus* in dissertatione inaugurali, Anno 1722. Lugduni Batavorum edita, *novam tenuium intestinorum descriptionem exhibente*, docuit, quomodo vertendo intestinum tenue, illudque scite inflando atque siccando, tunica nervea in *cellulosam* elegantem & novam, *Ruyfchiana* diversam, mutari queat: quod facile succedere ipsemet expertus sum, si modo experimentum legitime instituat. Varia præterea notatu digna & de aliis intestinorum horum partibus, eadem in dissertatione, idem auctor protulit: ut ex. gr. quod *cellulosa Ruyfchii* inter externam membranaceam communem

De glan-
dulis
Brunneri.

De novâ tunica
cellulosa
ut & de
villosa
& mus-
culosa.

(a) Advers. Anatom. III. p. 34.

(b) Observat. Anatom. pag. 91.

(c) Advers. Anatom. III. pag. 6.

(d) Observat. Anatom. p. 164.

ac musculosam, & totum canalem intestinale non cingat: sed deficiat in parte mediastino aversa, sitque mesenterii propago; sua vero non existat inter villosam & musculosam, constituat ipsam nerveam, cingatque totum intestinorum cavum. (a) Deinde quod fibræ longitudinales carneæ tantum sint in parte mesenterio opposita (b) & quod non sint ut fila per totam intestinorum longitudinem extensa; sed interrupta ad similitudinem quasi musculorum rectorum abdominis. Porro quod annulares mesenterio, ut tendini non sint insertæ, sicut *Villifius* voluit; contra actionem tamen earum versus mesenterium fieri. Præterea, quod inflatione nerveæ sive novæ sub cellulosa omnes rugæ & valvulae horum intestinorum evanescant illico, & quod hoc artificii simul tunica villosa a nervea (quæ alia methodo non nisi difficillime recedit) separari queat. Denique quod villi in tunica villosa maceratione levi in aqua tepida & crebra ejusdem ablutione egregie spectabiles reddi queant, si deterfo lubrico muco intestinum inversum in liquore limpidissimo suspendatur; qui villi adhuc crassiores fierent, (præsertim illi, qui cum venis communicant) si cera prius probe infarcti sint. Tandem quod venæ intestinorum per arterias, arteriæ vero per venas cera impleri possint, & per utramque cera usque in cavum intestinorum pelli queat quodque cera tunc instar vermiculorum (si in testi-

(a) *Helvetius* etiam in Hist. Acad. Reg. Scient. Ann. 1721. (quæ vero A. 1725. demum in Belgio prodit) mentionit, se duas in intestinis tunicas cellulosas novas invenisse; quarum alteram ponit inter muscularem & nerveam, alteram inter nerveam & villosam, quæ forte eadem erit ac *Albini*. Attamen monet, se has membranas nondum satis examinasse.

(b) *Helvetius* contrarium sustinet, at longitudinales prope mesenterium fortissimas esse scribit p. 397. Attamen in ultimis inquisitionibus eas in parte mesenterio oppositam quam maxime vidi, ut *Albinus*.

testinum caute aperiatur) tunicæ intimæ villulis adhæreat: id quod multis egregiis meditationibus occasionem præbet.

(12*) ad S. 211. pag. 76. Intima intestinorum tunica vulgo *villosa* appellatur anatomicis, quia parvi ac tenues villi, quasi in holoserico, in ea observantur (a), præsertim in canibus, porcis, aliisque nonnullis animantibus, si in aqua tepida, sæpius mutanda, per unum alterumve diem maceratur, & subinde probe agitatur. Sed *Ruy-schius* notavit, *papillas* quoque in hac tunica existere, eamque ob causam eam *villosa papillosam* appellavit. (b) *Helvetius* vero *villos*, qui pitis similes sint, in hac tunica prorsus negat, eamque ex *solis & meris papillis spongiosis, planis* (quas quoque, quemadmodum microscopio apparent, delineat), *irregularis figuræ, atque foraminulis fere insensibilibus pertusis constare* proponit, quibus foraminulis chylum sorberi, & ad vasa lactea deduci contendit (c); qua de causa etiam eam novo nomine *membranam papillarem* appellat. Quoniam vero hæ papillæ non nisi exquisitis microscopiis patent, & oculis nudis ut villi in holoserico apparent, imo ipsis microscopiis villi simul observantur, nomen usitatum *tunicæ villosæ* non mutandum, sed retinendum esse censeo. Conf. quæ de hac tunica nota præcedenti dicta sunt. Tunc usus ejus, de quo & *Albinus* & *Helvetius* eleganter differunt, tanto erit manifestior. *Helvetius* etiam eodem loco fibras carneas, quas anatomici vel *annulares*, vel *spirales* esse volunt, tales esse negat;

V 4

sed

(a) Vid. *Bartholin. Anst.* quantum renovata pag. 297. fig. 1. *Manger. Theatr. anar.* Tab. 69. fig. 7. *Pechlin. de purgantib.* Tab. II. fig. 3.

(b) *Advers. Anatom.* I. pag. 25.

(c) *Hist. Academ. Reg. An.* 1721. pag. 35. & *Memor.* pag. 392.

Plura
de his
tunicis.

sed ut irregulares & tanquam sectiones circularum in fasciculos collectas proponit atque delineat quas vero ita videre nondum potui.

De in-
vento-
ribus
laqueo-
rum.

(13*) ad pag. 78. Præter hic citatos vasorum lacteorum observatores, *Rolfincius* in dissert. anat. Lib. V. cap. 22. pag. 906. adhuc alios adducit auctores, quos vasa hæc vidisse existimat: & quidem ex veteribus ipsum *Hippocratem* & *Arabes* ex recentioribus vero *Vesalium*, *Fallopium*, & *Varolium*, quorum ipsissima verba refert. Confert etiam *Almelovenii* Inventa Nov. antiqua S. XXIII. Sed hos omnes in animalibus tantum ea vidisse verisimile esse, indicat *Morgagnius* (a); verum *Cæcilium Folium* ea in homine primum observasse.

De va-
sis la-
cteiscor-
poribus
mani a
me ob-
serva-
tis.

(14*) ad p. 78. Anno 1717. juvenis robustus, postquam in nundinis Altorfio vicini oppidi bene pastus ac potus, & forte ebrius, vesperi domum redire vellet, incidit in foveam profundam, aqua repletam, ibidemque suffocatus periit. Altero die ab Illustribus *Academiæ Altorfinæ* Curatoribus ad sectionem publicam mihi transmittebatur: quo die tegumentis communibus, musculisque abdominis demonstrandis occupatus eram. Sequenti die, cum ad interiora perlustranda progrederer, in intestinis tenuibus & mesenterio, tertio hoc a morte die, in magna studiosorum corona, tantam vasorum lacteorum deprehendi copiam, mox sub membrana mesenterii, super pinguedine ejus reptantium, ut sane intestina & mesenterium his vasis, liquido candidissimo lacteo plenis, essent refertissima: quæ copiam lacteorum, alias in canibus, optime licet pastis, occurrentium, longe superabant. In his enim plerumque tantum tractum vasorum mesenterii sequuntur: verum in hoc homine promiscue per totum mesenterium frequentissimis inosculationibus sive anastomosibus se

ex

(a) Epist. anam. x. nut. 85.

extendebant, & nonnulla in glandulas, intestinis
vicinas, mox ingrediebantur: alia vero partim
linguedini mesenterii immergebantur, ut pro-
gressus eorum videri non potuerit; partim ad re-
motiores glandulas abibant, sicuti ea Tab. II.
fig. 8. delineari curavi, quæ vero & pictor &
sculptor satis copiosa & subtilia repræsentare non
potuerunt. Deinde Anno 1718. mensis Aprilis,
in cadavere juvenis, phthisi extincti, præsentibus
aliquot studiosis Medicinæ, vasa lactea, viginti
quatuor horis post mortem, copiosissima rursus
eodem modo reptantia observavi: imo in hoc
cadavere, & postea adhuc in alio, ea ex ipso in-
testino duodeno, (*quod nonnulli negare audent*)
provenire accurate perspeximus. Anno 1719. in
duodeno, prope pylorum, iterum vas magnum
lacteum vidi, atque ab eo tempore adhuc aliquo-
res vasa lactea in intestinis tenuibus humanis,
non adeo turgida, ut in prioribus, conspexi,
spectatoribus demonstravi. Quia vero rarissi-
me in homine, præsertim adeo copiosa se exhi-
bent, atque ea, quæ hucusque Anatomici deli-
nearunt, solum ex brutis desumpta esse videntur,
eorum in homine constitutionem, & a brutorum
lacteis diversitatem figura aliquo modo ostende-
re volumus. Exhibuit quidem *NUCKIUS*, Ade-
ogr. fig. IV. *vasa lactea* (ut scribit) *ex homi-*
ne, verum adeo pauca in tanto frusto intestini
erant, ut cum caninis melius conveniant: nam
in ambobus hisce nostris cadaveribus minimum
duplo plura adfuerunt. Valvulæ, quas hic in
speciosas & magnas delineat, prorsus non ap-
paruerunt; verum vasa lactea in hominibus ita
habebant, sicuti a nobis delineata sunt; valvu-
larum enim & tubercula horum vasorum tunc ap-
parent, quando in animantibus recens maceratis
ostentantur. In priori cadavere, quia juvenis ille,
in media quasi digestionem, cibo & potu bene re-
ple-

pletus, aqua subito suffocabatur, hinc simul
 tus chyli in vasis chyliferis, ad satietatem usque
 repletis, sistebatur: unde factum esse puto, ut
 eo tam egregie conspici potuerint. Alteri vero
 juveni phthisico, ad extremum fere halitus
 gelatinæ, juscula, succolata, emulsiones, &
 milia roborantia ingesta fuerant: inde quod
 mirum non est, hæc vasa tam pulchre repleta
 apparuisse. Quæ occasione cum raro occurrat
 mirum non est, vasa lactea copiosa rarissime
 hominibus observata fuisse. Interea tamen
MORGAGNIUS, uti in *Advers. Anat.* II. pag. 31.
 refert, ea eodem quoque fere modo ab ipso
 sa, imo & in duodeno, mox sub pyloro obse-
 vata, *Adv. Anat.* III. pag. 31. describit. Quo-
 modo vasa lactea in cane liquido cæruleo,
 solutione cærulei montani (Anglice *Stone Blew*)
 in aqua facta, sint replenda, *Musgravius* desc-
 pfit in *Act. Anglic.* N. 275. pag. 996. & in *M*
tii epitome horum actorum Part. II. pag. 76.
 (15 *) ad pag. 79. Varii fuerunt, qui *recepta-*
culum chyli in homine prorsus negarunt; alii gla-
 ndulas lumbares receptaculi vices gerere tradid-
 runt. Verum illud non solum aliquoties, ut
 cum ductu thoracico, argento vivo nitide rep-
 vi, ac tanquam sacculum tenuem membran-
 ceum, nunc simplicem, nunc duplicem, demon-
 stravi; sed varii auctores illud etiam, atque co-
 ctum thoracicum ex homine figuris eleganter
 præsentarunt, ut *Couperus* in *Anatomia sua* ma-
 gna, *Bidlous* in *dissert. de Organo chylifero*
Drake in *Anthropol.* Tab. II. fig. 3. *Salzman*
 & *Wium* in peculiaribus dissertationibus, *He-*
ningerus in *Ephem.* Cent. II. Append. p. 12.
 & *Cantius* Tab. VI. Quare doctiss. *Morgagni*
Bianchum refellit, qui receptaculum hoc in ho-
 mine adhuc negat, ejusque in locum glandul-
 lumbares substituit; insimul ostendit, *Cl. Ru-*
bekium

De re-
 cepta-
 culo
 chyli.

bekium primum fuisse, qui hoc receptaculum ex homine delineaverit. Epist. anat. I. n. 83.

(16*) ad pag. 80. *Valvulæ semilunaris* in vena subclavia ad insertionem ductus thoracici usus a plerisque hucusque creditus est, ut claudat ductum thoracicum, ne sanguis venæ subclaviæ in eum intrare possit. Minime vero eam hujus gratia fabricatam esse sustinet Vir Cl. Jo. Adolph. Wedelius (a), atque docte demonstrat, nulum sanguinem in eum intrare posse, si vel maxime hæc valvula abesset: quia primo valvulæ in ductu thoracico, ac deinde etiam liquidum perpetuo in ipso contentum, hoc impedirent, sanguinique ingressum tentanti resisterent: id quod pluribus rationibus evincit. Præterea ostendit, valvulæ hujus positum talem non esse, ut ingressum sanguinis satis impedire possit, si alius ductus thoracici conditio id admitteret. E contrario vero docet, valvulam hanc, cum adstante simili valvula socia in pariete opposito, idem præstare, quod valvulæ venarum in aliis locis: nimirum ne sanguis e vena cava, dum cor contrahitur, per hanc viam facile retrocedat, sicut pluribus apud laudatum auctorem videri potest. Præterea in universum de usu valvularum semilunarium in animalibus peculiare quoque scriptum tradidit, (b) quo evincit, has valvulas omnes non movere, sed tantum a liquido moveri, ita ut humores non propellant, sed eorum motum tantum determinent, rationesque reddit mechanicas, quare semper vel unica, vel duæ, vel tres, & non plures adsint, aut adesse queant.

(17*) ad S. 215. pag. 81. *Vasa lymphatica* pauciora ex homine habemus delineata; ipsaque ea, quæ

De usu
valvulae
ad
finem
ductus
thoracici
scilicet
et aliarumque
valvularum.

De vasis
lymphaticis.

(a) In peculiari de hac valvula edito programme A. 1724 Jenæ in 4.

(b) Ibid. 1727.

quæ **NUCKIUS** in *Adenographia* sua sistit, a multis pro veris humanis habita, revera, si non omnia, pleraque tamen ex brutis, vel ingenitis desumpta: id quod ejus figuræ de renibus corde &c. sat testantur; sicuti experti anatomici facile observare possunt. Ea vero, quæ *ut addidit humano*, certe nunquam ita visa, sed non nisi ad analogiam cum lymphaticis bestiarum imitanda esse credo; quia enim hæc vasa vix in viventibus videri possunt, vivæ vero mulieres non secantur, patet inde sententiæ nostræ veritas. Interea tamen non nego, quandoque nonnulla observari posse, *videturque ea cum receptaculo chyli primus, in homine conspexisse atque delineasse Cl. Rudbekius Exercit. de Duct. aquæ Tab. X. ut Morgagn. indicat Epist. anat. 1. n. 8*

(18*) ad §. 217. pag. 84. In *Ephemeridum* centuria V. & VI. descripsi quidem jam duodecim vesiculas felleas humanas, in quarum ductu cystico *pulchræ atque mirabiles valvulæ spirales aderant*: quas vero hic, dum, quantum novi, aliis non descriptæ aut delineatæ sunt, Tab. III. fig. 9. iterum sisto: addito simul novo, & tertio schemate ejusdem ductus cadaveris femininæ postea a me dissecti, in quo etiam multæ valvulæ sive membranæ aderant transversæ & obliquæ ductum hunc quasi in cellulas dividentes: quæ vero ductum non omnino claudebant; verum ut valvulæ conniventes in intestino jejuno aut colico se habebant, sicuti ex figuris melius cognoscere licet. **GLISSONIUS** (a) quidem ait, *Anatomicos quosdam in ductu cystico valvulas effinxisse, se autem credere, fibrosum anulum cystidis imposuisse, se enim numquam valvulam ibi invenisse*. Ita & **BIANCHUS** (b) inquit *valvulas cystidis*

De ductu biliario cystico.

(a) Tract. de Hepate, c. 14.

(b) Hist. hepat. edit. primæ cap. 14. §. 2.

Aidis felleæ collum & cervicem occupantes, imaginarias esse. Verum an non hæ indicatæ partes, non semel, sed ab aliquo tempore in plerisque cadaveribus repertæ, sint dicendæ valvulæ, aliis iudicandum relinquo. Ita & quem utrum hic præstare queant, doctoribus indagandum commendo. Moneo solum adhuc hic, Bianchum in nova historiæ suæ hepaticæ editione p. 973. & 974. eas, quæ antea contra ductus cystici valvulas scripserat, revocare, easque, postquam experientia confictus est, jam admittere. Ceterum Baubinus (a), Bidlous (b), & Vestus (c) valvulas etiam hic statuerunt. Schelhamerus vero notavit, ductum cysticum stylum neque a parte duodeni, neque a parte cystidis admittere, flatum vero liberrius (d); unde suspicor, hunc virum valvulas hic offendisse, licet id ignoraverit, & de alia ratione huius phænomeni sollicitus fuerit. Bianchus tamen hic valvulas, cochleam perfectissime representantes, vidit (e); & de usu earum jam Riolanum Highmorum disseruisse Morgagnius indicat Epist. anat. 1. n. 53.

(18**) ad pag. 84. Multum hucusque disputatum fuit, an datur ductus, qui ex hepate, sine interventu alterius ductus, hoc est, *immediate*, loqui solent, in vesiculam fellis bilem invectant. *Bohnus* egregia describit experimenta (f), quibus evincit, dari omnino ejusmodi ductum in bobus, notatque *Glissonium*, *Blasium*, & *Amstelodamenses* jam eorum mentionem fecisse, &que simul inde concludit, ductus etiam tales a homine necessarios esse, & existere. Attamen præ-

*De du-
ctibus
hepaticis
co systi-
cis.*

a) Theatr. anatom. p. 156.

b) Anat. Tab. 38. fig. 3.

c) In Observ. ad Crameri Colleg. chim.

d) Analest. anat. Dissert. XI. N. 23.

e) In Epistola ad Josephum Porzium, Bononiæ edita 1726.

f) In Act. Eruditor. Lipsiens. An. 1682. pag. 20.

præstantissimi anatomici fere omnes eos in animalibus variis quidem concedunt; verum in homine negant, seque illos in hoc nunquam reperire potuisse mecum affirmant. *Cel. Cheselden* Anglus, in prima anatomes suæ editione casu refert, ubi minutissimos ejusmodi ductus in cadavere ictero demortuo se vidisse putavit, atque constitutionem illius vesiculæ fellis Tab. XVI tunc delineavit. Verum in tertia & ultima, quam possideo, libri hujus editione pag. 178. revocavit hanc, quam, ut recens anatomicus, sicut ipse loquitur, proposuerat, sententiam, & fatetur se nunquam postea hos ductus, summa licet adhibita diligentia, deprehendere potuisse. At *Bianchus* denuo illos ductus magno conatu, multarum rationibus & experimentis adstruere contendit (a) eosque in *hepatico-cysticos* & *cyst-hepaticos* distinguit, atque amplissimis figuris evincere fatigavit. An vero hæc inquisitiones aliis quoque in anatomica exercitatis ita succedant, tempus docebit. Hoc saltem certum, quod *Morgagnius* haec omnia negaverit. (b) Unum tamen præ ceteris testimonium adducit, *Cajetani* nimirum *Taconi*, Philosophi & Medici Bononiensis, qui in epistola ad *Bianchum* data, atque simul in figura cum eodem communicata, ductus ejusmodi ex hepate ad vesiculam fellis abeuntes peculiari observatione ex cadavere morbofo confirmare studet. Verum postea in epistola *Josephi Pozzi*, Anatomes Professoris Bononiensis, ad *Janum Paulum Simonem Planchum* Anno 1726. edita, & in hujus responsione ad epistolam prioris tota hæc *Taconi* observatio ficta ac falsa declaratur, atque *Taconium* ab arteriis cysticis deceptum esse (jure an injuria, aliis uberius decidendum relinquo) indicatur. Mihi saltem contigit, ut

cum

(a) In Hist. hepat. nov. edit. pag. 3. & 940.

(b) In Epistol. anatom.

um in hos ductus summo studio sæpius inquirerem, tandem in cadavere quodam, præsentibus multis auditoribus, invenerim aliquem, quem ob colorem flavum & locum prope colli cystidis partem posteriorem, quam attingebat, verum ductum hepatico-cysticum habebam. Sed cum certus essem hujus rei, hinc inde in originem & progressum ejus diu diligenterque inquirerem, atque tandem per inflictum vulnusculum ductum versus cystidem immitterem, cognovi, quod distributionem per cystidem instar ramusculorum arboris se habere, truncumque vas cysticum sanguiferum esse: licet ob colorem, & locum, quo ductus hepatico-cystici in bobus in colli cystidis se interere solent, fere jurassem, non ductum hepatico-cysticum, qui tamen talis non erat, invenisse. Atque inde uberius cognovi, quam facile quis falli possit in ductuum hominis inquisitione, & propterea concludo: quod in homine revera dentur, eos non esse perpetuos, raros, imo rarissimos. Conf. uberius hac de re Morgagnii Epistolæ anat. qui Bianchum pluribus citat.

19 *) ad pag. 84. Qui hepatis substantiam De sub-
 glandulosam esse dixerunt, ex eo potissimum fun- stantia
 damento hoc affirmarunt, quia variis in cadave- hepatis
 ribus morboris, hydrope præsertim aut atrophia glandu-
 losis, corpuscula sphæroidea sæpe quamplu- losa.
 ra in eo observarunt. Verum quia in corpo-
 ribus sanis non ita reperiuntur, hæc corpuscula
 non pro tuberculis præter naturam sunt ha-
 benda, sicuti supra jam docuimus, Nam et-
 si hepar maximi bovis vel equi sumatur,
 quibus omnes hepatis partes valde magnæ e-
 ssent, tamen in eis nulla peculiaris aut distin-
 cta corpuscula, singulari membranula inclusa,
 inspicuntur. At, si in cadaveribus morbo de-
 lectis ad tubercula illa rite attendatur, haud
 adeo

adeo difficulter cognosci potest, tubercula illa se producta morbosa, & tota præter naturam. Ita enim præter alia similia corpora a medicis, cum amicissimo quondam Collega, D. JAC. BAJERO, Altorfii aperui cadaver mulieris hydropico morbo defunctæ, cujus hepar innurra in superficie albicantia corpuscula sphæroidea variæ magnitudinis ostendebat: quæ certe aliis præjudicio occupatis, facile pro grandulis immississent. Sed cum hæc tubercula dissecando accuratius examinarem, materiam continebant substantia hepatis quam alienissimam, & adhibebo, sive materiæ in tumoribus cysticis durioribus sæpe contentæ, similem: quorum tuberculorum deinde, cum hepar (quod naturalem magnitudinem bis æquabat) ulterius dissecarem, intus per totam substantiam quamplurima dispersa invenimus: horumque multa avellanæ, alia nucis, quædam ovi magnitudinem æquabant, imo superabant. Eorum etiam color & totus habitus a substantia reliqua hepatis quam alienissimus erat: unde satis cognosci poterat, hæc tubercula sive corpora sphæroidea non glandulas esse, sed tumores morbosos, licet figuram sphæroideam habuerint, & aliquo modo glandularum mentita fuerint. Similiter, si aliis in subjectis tam humanis, quam brutis, talia tubercula examinavi, ea semper de natura tumorum cysticorum inveni: qui, sicuti in externis partibus, & internis oriri solent, atque sub specie glandularum sæpe imponunt. Alii *vesiculas morbias* hepate observarunt, quas nonnulli glandulas esse volunt; sed idem hic opponimus, quod Nicolaus (77*) renibus talibus opposuimus.

De ita
redic-
que bi-
lis.

(19**) ad pag. 83. *Palpinus* me reprehendit
(a) quod contra *Verheyeni* sententiam itum

redic-

reditum, sive ingressum bilis per ductum cysticum in cystidem, ejusque rursus egressum e vesicula per eundem ductum in cholidochum asseruerim: cum plerique præstantissimi anatomici, ut perhibet, hoc negent, & cum *Verheyeno* sentiant: qui impossibile esse putat, per unum eundemque ductum cysticum bilem in cystidem influere, & rursus inde effluere posse. Verum *Bobnius* (a) & *Ortlobius* (b) gravissimis rationibus atque experimentis certissimis (quæ ipse repetiit) hoc evicerunt, consentiuntque *Cole* (c), *Jo. Maur. Hoffmannus* (d), & alii quam plurimi, illudque uberius confirmavit *Bianchus* (e): qua de re tanto minus dubitandum, quicquid nonnulli contradicant, quia analogiam habemus in vesiculis seminalibus, in quibus idem fieri certi sumus, neque vel ipse *Palpinus* negat.

(20*) ad pag. 87. Sicuti in hepate, ita & in *De glandulis in* liene nonnulli corpuscula sphæroidea quandoque observarunt in cadaveribus morbidis, quæ pro *lienis substantia.* glandulis lienis venditarunt. Sed idem hic, quod paullo supra contra corpuscula sphæroidea hepatis dixi, regerere licet. Imo, quia ne quidem secretio contingit in liene, dum nullus ductus excretorius adest; hinc tanto minus glandulæ hic requiruntur. Cui enim usui hic erunt glandulæ, ubi nulla fit secretio? Cum vero *RUTSCHIIUS* in variis suis scriptis & præparatis tam clare demonstraverit, hæc viscera esse vasculosa, verasque glandulas in eis non adesse, atque *SCHELHAMMERUS* etiam glandulas lienis *Malpighii*, racematim ei in hærentes, merum esse com-

X

men-

(a) In *Actis Erud. Lips.* A. 1682. pag. 20. & A. 1683. pag. 126.

(b) *Hist. partium.* pag. 135.

(c) *De secret. animal.* pag. 133.

(d) In *Idea Machin. corp. human.* pag. 55.

(e) In *Hist. Hepat.* cap. XIII. edit. prior. & cap. XVIII. edit. poster.

mentum statuat (a), præstat certum pro incerto amplecti. Conf. quæ in Adenologia N. 365 & seq. hac de re dicta sunt.

De usu lienis. (21*) ad pag. 87. Nullius visceris usus magis obscurus fuit, quam lienis, & hinc nullum magis dissentientes scriptorum opiniones excitavit. Multi enim cum Erasistrato (b), præsertim quia animalibus, salva vita, excindi potest, eum pro inutili & superflua corporis parte, sive pro errore naturæ, habuerunt. Alii eum tantum ob æquilibrium corporis conservandum factum esse putarunt. Nonnulli cum Hippocrate & Aristotele aquosas partes e ventriculo attrahere sustinuerunt. (c) Plerique veterum illum cloacam bilis atra sive malancholiæ cum Galeno constituerunt. Quidam fermentum sive menstruum ventriculi pro digestionem promovenda in eo secerni, & ad ventriculum demandari existimarunt. Varii lienem risus auctorem crediderunt, juxta tritum:

Splen ridere facit, cogit amare hepar.

Alii eum sanguinem inspissare decent. HAVERUS (d) putavit, illum præparare mucum illum, qui in glandulis mucosis articularum secernitur. SCHELHAMMERUS, (e) & cum hoc Angli recentiores, ut LISTERUS (f), & PURCELLIUS (g) eum diverticulum sanguinis esse volunt in motibus fortioribus: qui ultimus quoque vult, eum sanguinem inspissare, & ope acidi, nescio cujus, præcipitationem producere, pro meliori bilis secretionem. Alii adhuc alios usus produxerunt, quos omnes hic recensere prolixum nimis foret. Ego vero existimo, eum vi situs & fabricæ ejus sanguinem

(a) Analest. anatom. Dissert. X. N. XXII.

(b) Galen. de usu part. lib. IV. cap. XV.

(c) Vid. Casp. Hoffman. de usu lienis.

(d) In Osteologia.

(e) Analest. anatom. Dissert. X. §. 40.

(f) Tract. de Humoribus.

(g) Tract. de Colica.

guinem tenuem, fluidissimum suppeditare hepati, ut reliquus crassus ex ceteris partibus ad hepar influens, & ex quo bilis in denso hoc viscere secer- menda, fluidior reddatur, hepatis obstructio sic im- pediatur, bilisque secretio hoc modo promoveatur. Nam si vena splenica in cane aliove animali vi- vente inciditur, sanguinem tenuem, floridum, sub- tilem effluere & alii & ego sæpe deprehendi, nunquam vero crassiorem reliquo sanguine ve- noso.

(22*) ad pag. 88. Renum substantiam ob tu- De glan-
dulis in
renibus.
bercula quandoque in eis reperta glandulosam quoque efficere multi conati sunt, de quibus ve- ro idem sentiendum, quod de tuberculis in he- pate nota (19*), & superius N. 365. & seq. in adenologia diximus. Quid vero de renibus, vesiculosis observatis, sit judicandum; inferius in Nota (77*) videri poterit.

(23*) ad pag. 89. Quoniam usus harum glan- De re-
nibus
succen-
turiat-
is.
ularum adeo obscurus & incertus est, ante ali- quot annos Academia Burdegalensis in Gallia in- signe præmium publice obtulit ei, qui usum ve- rum earum detegere posset; verum nemo, quan- tum adhuc percepimus, fuit, qui id præstare, et præmium deportare valuisset. Attamen haud adeo diu post, Anno nimirum 1719. Valsalva, celebris quondam Bononiensium anatomicus, pu- blicari curavit, imo ad varios scripserat (a), se- rum earum deprehendisse, ductusque invenisse, qui in viris ad epididymides, in mulieribus ve- ro ad ovaria abirent, easque sic ad generatio- nem conferre, atque dissertationem hac de re editurum promiserat. Verum quamvis postea auctor adhuc per aliquot annos vixerit, promif- tamen illa dissertatio non prodiit; neque ad- huc ullum ab auctore hosce ductus didicisse co-

(a) Vid. Vallisneri Histor. generat. pag. 353.

gnovi. Hinc de iis non solum dubito, verum etiam ingens harum glandularum magnitudo in foetu, & diminutio contra in adultis, huic usui quam maxime ob stare videtur. Ceterum de harum fabrica eleganter differit *Malpighius*. (a)

De tunica
cellulosa &
musculari
vesicae.

(24*) ad pag. 90. Tres vulgo tantum membranae in vesica urinaria numerari solent, a nobis 222. recensitæ: verum quia *WARTHONUS* cellulosa[m] numerat in mesenterio, in qua pinguedo hæret; *RUTSCHIIUS*que & alii cellulosa[m] in intestinis, ut §. 211. dictum est; hinc eodem jure & easdem, vel forte adhuc graviores ob rationes in vesica humana tunicam cellulosa[m] statu posse credo; quia manifesto inter extimam & muscularem tunicam plerumque, si non semper pinguedo eaque sæpe copiosa in pinguibus ibidem reperitur, in peculiaribus cellulis adiposæ secreta, collecta, atque in certum usum affecta; sic ut merito quatuor membranae vesicae urinariae numerari queant. Ex eodem fundamento *Cl. Morgagn.* recte etiam tunicam cellulosa[m] ejusmodi & in ventriculo & in vesicula fellis statuit, contra *Bianchum* vero tunicam vesicae muscularem, quam in *Hist. Hepat.* p. 980. negare conatur, mascole defendit & confirmat. In canibus vero hæc cellulosa vesicae tunica vix in conspectum prodit. Inservire videtur in homine a vesicam contra urinæ acrimoniam defendendam.

De testibus.

(25*) ad pag. 92. Cum varia notatu digna de testibus suo loco pagina 92. commode inferere non potuerim, nonnulla adhuc hic notabo. Primo *Cl. Morgagnius* indicat (c) quod verarum testium substantiam vasculosa[m] ex veteribus primis indicaverint *Arantius*, *Cabrolus*, & adhuc per-

(a) Epist. de glandul. pag. 5.

(b) Epistol. anat. I. n. 62.

(c) Advers. anat. I. pa. 21.

perspicacius *Riolanus*, *Graafius* vero connexionem horum vasculorum & usum demonstraverit. Hæc vero substantia vasculosa bene apparet in testudine (*a*), in suibus (*b*), ariete (*c*), gliribus. (*d*) Deinde notamus, arterias spermaticas non semper ex aorta, sed sinistram quandoque ex emulgente, imo utramque aliquando ex hypogastrica provenire (*e*). Id quod haud observasse videntur illi, qui arterias spermaticas prorsus defecisse scribunt; quos nugari dicit *Graafius*. (*f*) Præterea *Lealis* & *Schraderus* (*g*) volunt, arterias spermaticas, antequam ad testes perveniant, per anastomoses communicare; quod tamen alii observare non potuerunt. (*h*) Denique prima harum arteriarum descriptio *Andernaco* deperi videtur. (*i*) Tandem albugineam testis tunicam in duas facile dividi posse, *Morgagnius* monet (*k*): *Teichmejerus* vero eam in tres, tendinosam scilicet, vasculosam, & nervosam distinguit. (*l*)

(26*) ad pag. 93. *Peculiaris testiculi & epididymidis præsertim dispositio* observata a me est *Helmstadii* in viro a me publice dissecto: ubi testiculus sinister non in scroto erat, sed in abdomine reperiiebatur; verum non in pelvi ad vesicæ latera, ut ab aliis observatum (*m*), sed eo loco, ubi alias vasa spermatica abdomine e-

De epididymide peculiaris.

X 3

gre-

(*a*) *Advers. anat.* IV. p. 4.

(*b*) *Schelhamm. Analekt. Diff.* XII. §. IV. lit. B.

(*c*) *Lealis* de part. genital.

(*d*) *Graaf. & Cheselden.*

(*e*) *Nicolai direct. vasor.* p. 69.

(*f*) De viror. organ. generat. p. 30. Conf. *Vallisner. de generat.* p. 352.

(*g*) In observ. anatom.

(*h*) Vid. *Heucheri Dissert. Anatomes ars magna*, §. VII.

(*i*) *Institut. anatom.* p. 37.

(*k*) *Adv. anat.* IV. p. 3.

(*l*) *Anthropolog.* 171.

(*m*) *Advers. IV.* pag. 1.

grediuntur, altero longe minor, & sine epididymide. Vid. Tab. VI. fig. nostra 25. m. Epididymis vero non per musculos abdominis, ut alias vasa spermatica transeunt, versus scrotum egrediebatur, & per inguen sinistrum ad supremam usque scroti partem se extendebat. A finis vero epididymidis vas deferens rursus reflectebatur sursum, quod juxta epididymidem per inguen & deinde musculos abdominis ventrem intrabat & consueto alias more ad vesiculam seminales sinistram abibat: quemadmodum hoc, & quomodo vasa spermatica hic se diviserint, clarius ex figura modo citata cognosci potest.

De du-
ctibus
excre-
tor. ve-
sicular.
femi-
nal.

(27*) ad §. 227. pag. 94. *LEALIS* delineavit *vesiculas seminales uno ductu communi in urethram desinentes*: cuius descriptionem etiam sequitur *C. BOERHAAVIUS* (a), & ut percepi, nonnulli in Gallia perhibentes, frequentius eos unico communi ductu gaudere, quam duplici. Verum ego semper duplicem observavi: atque non solum vesiculas tales exsiccatas ceraque repletas affertivo, ut & alias in spiritu balsamico, in quibus duplicem semper ductum ostendere possum; verum in omnibus cadaveribus, quæ adhuc secum semper hucusque duplicem ductum, & duplicem osculum excretorium demonstravi. Præterea omnes reliquos Auctores, (præter modo citatos) consentientes habeo. Imo & ipse Boerhaavius postea sententiam hanc mutavit. (b) Idcirco licet forte subinde simplex tantum orificium, & unicus ductus adsit, tamen nondum credere possum hoc frequentius reperiri, si modo rite inquirantur: quia omnes ceteri anatomici mecum contrarium observarunt. Facile vero contingere potest, ut minus exercitati unicum tantum reperire queant.

(28*)

(a) In Instit. med. edit. alter. & tertia §. 648.

(b) Edit. quarta.

(28*) ad pag. 96. In præfatione editionis *De Uter-
gamen-
tis pe-
nis la-
terali-
bus.*
secundæ hujus compendii notavi, me in ultimo, quod sub manibus tunc habebam, cadavere virili in pene, præter ligamentum ejus suspensorium, duo *lateralia ligamenta*, suspensorio fere similia, reperisse: quæ utrimque mox supra ortum musculorum erectorum ex ossibus pubis prodibant, & supra insertionem horum musculorum in latera corporum cavernosorum penis se inferebant. Cum vero hæc ligamenta ab eo tempore non nisi bis, & quidem tenuiora longe, quam prima vice, deprehendere potui, eas pro partibus ordinariis habere nequeo.

(29*) ad pag. 98. *CHESELDENUS* *An- De
glus, & municeps COVPERI*, has ipsius glandulas in prima anatomes suæ editione pag. 160. *gland-
ulis
Covv-
peri.*
prorsus in dubium vocat, affirmando, se eas nunquam reperire potuisse: additque præterea, *nisi hæ glandulæ inventum essent Covvperi, suspicandum foret*, quasdam glandulas exiguas, vel ob statum morbosum ita intumuisse in eo cadavere, unde *COVPERUS* illas delineavit: utpote qui lusus naturæ in glandulis non essent rari. Sed in tertia editione *Cheseldenus* omne, quod modo ex ipso adduximus, omittit; attamen non affirmat, se has glandulas reperisse, verum modo indicat, *Covvperum* has tres glandulas descripsisse pag. 294. unde suspicor, eum hucusque ipsas non vidisse. *Morgagnus* tamen affirmat, se illas in pluribus cadaveribus invenisse, & ea quidem aliquando magnitudine, ut parvum phaseolum superarent, interdum pari, alias minori magnitudine conspexisse: sæpe tamen etiam eas, omniquamvis adhibita diligentia, deprehendere non potuisse. (a)

(30*) ad pag. 101. Multum semper utramque *De hy-
mene.*
X 4 in par-

(a) Adversar. anatom. IV. pag. 25. & seq.

in partem de *existentia membranae hymenis* in virginibus disceptatum est a Medicis; multis earum olim & adhuc hodie vel negantibus, vel pro re inconsueta aut præter naturam venditantibus. Sed videntur hi juniorum puellarum verarumque virginum vaginas haud inspexisse, & solum de floratas perlustrasse. Ego certe in omnibus, quas ego examinavi puellas juniores, (examinavi vero permultas) tam recens natas, quam aliquot menses, natas, itemque unius anni, biennes, sexennes, & illam quatuordecim annos natam, cuius descriptio & delineatio in *Ephem. Centur. VII. & VIII. Tab. VI. fig. 4.* a me exhibitæ est; æque semper membranosum quoddam corpus, orificium vaginae coarctans, nunc *annulare* nunc *semilunare*, reperi: ita ut pro statu morbofo, quod in plerisque occurrit, minime sit habendum. Quod vero in adultioribus raro reperitur, multæ hujus rei possunt esse causæ, de quibus vero hic dicendi non est locus. Consentiant mecum Viri gravissimi, *Wierus (a)*, *Riolanus*, *Graaf*, *Swamerdam*, *Morgagnius*, *Santorinus*, alique. *Vesalius* ab initio illud quoque negaverat: postquam vero juniores & veras examinavit virgines, illud affirmavit.

De u-
teri
crassitie
in gra-
vidis.

(31*) ad pag. 104. Nonnulli scriptores, & imprimis celebris *Mauriceau (b)* ac *Dionis (c)* voluerant, *uteri substantiam in gravidis tenuiorem fieri, quam in non gravidis*: credendo, impossibile esse, uterum in tantam molem, quanta est ultimis mensibus in gravidis, extendi sine diminutione substantiæ aut crassitie. Verum non solum *Deventerus* integro ac peculiari capite illam

(a) *Observ. med.* pag. 95. 99. & lib. de præstig. *Dæmon.* lib. III. cap. 19.

(b) *Traité des maladies des femmes grosses.*

(c) In *Chirurgia sua*, itemque in lib. de arte obstetricæ. cap. de sect. cæsar.

am sententiam refellit (a), verum ego ipse varias gravidas, aliasque mulieres, & in partu, paullo post partum mortuas cultro aperui; sed nunquam uterum tenuiorem, sæpe vero crassum inveni. Quod in primis probe notavi, cum hic Helmstadii, intra unius circiter anni spatium, tres gravidas mortuas aliquando incisi: quarum duæ in partu, una vero ex vulnere capitis, mortuæ erant: sicut haud pridem scripsi. (b) Sed dubium mihi interea objecerat vir quidam eruditus, an non forte partus demum tempore tanta sanguinis copia ad uterum adflueret, qua ita extenderetur, quæ copia extra illud tempus non adesset, adeoque etiam uterum extra illud tempus forte non ita crassum esse: cum observationes ex mulieribus in partu, aut paullo post partum mortuis hanc ob causam fallere posse. Verum omne hoc dubium sustulit exemplum mulieris, quæ extra partus tempus ex vulnere gravissimo capitis, glande plumbea medium cerebri penetrante concitato, sana ceterum & subito octavo graviditatis mense interfecta est. In hac nullus insolitus tunc erat sanguinis ad uterum affluxus, nullus pariendi coactus, & tamen uteri substantia non erat tenuis, sed æque crassa, ut in aliis gravidis & pueris eam observavi. Consentiant etiam mecum, ceteri scriptores a *Deventero* & a me in *Actis Acad. Nat. Curiosor.* laudatos, *Virarissimi*, *Morgagnius* (c), *Littrius* (d), *Voglius* (e), *Santorinus* (f), *Vaterus* (g), aliique.

De-

- (a) Operat. chirurg. cap. VIII.
- (b) In *Actis Natur. curios.* vol. I. pag. 400.
- (c) *Advers. anat.* IV. p. 46.
- (d) *Hist. Acad. Reg. Scient. An.* 1720. pag. 22.
- (e) In *Anthropogenia* Part. II. pag. 35.
- (f) *Observat. anatom.* p. 163.
- (g) *De utero gravido* pag. 11.

Et mus-
culo no-
vo Ruy-
schii.

Denique etiam ad hunc locum notamus, quod *Ruyfchius* in puerperarum uteri fundo fibras orbiculares spirales sive orbiculares viderit & delineaverit, quas novum uteri muscolum orbicularem appellavit (a), cui vires adscribit placentam, in partu edito, ab utero separandi & expellendi: quae simul docet, placentam nunquam vi ab utero separandam; sed si lenem tractionem non requiritur, relinquendam esse, donec ab hoc novo musculo (quem tamen a reliqua uteri musculosa fabrica juvari existimo) protrudatur. Inquiri sibi postea occasione oblata in gravidis in hoc muscolum orbicularem; verum eum ita invenire non potui: sed solum fibras musculares, in vario sensum inextricabili modo circum tensas; quas pro idem imo plus praestare posse puto in foetuum cundinisque expellendis, quam fibras illas orbiculares, eamque ob causam uterum ex gravida, paucis diebus ante partus tempus subito extincta, huc aservo.

De men-
struorum
fontibus.

(32*) ad pag. 104. De menstruorum fontibus sive scaturigine, utrum ex ipso utero, an solae ex vagina uteri proveniant, Medici non conveniunt: quibuldam prius, aliis posterius asseruntibus, eorumque magnum catalogum proponit doctissimus *Morgagnius*, (b) qui simul docet, quod suis observationibus hunc cruorem prius ex fundo uteri, nunquam vero e vagina provenisse viderit. Idem & ego duobus in cadaveribus quam luculentissime vidi, & leni uteri pressione guttulas sanguinis ex foraminulis adhuc satis conspicui expressi. Confirmat etiam de menstruorum ex utero ortum *Littrius* notabilibus

(a) *Advers. anatom. Decad. III. Deinde in peculiari libello de hoc musculo belgice edito. Item in epist. Vallae ad Ruyfchium de hoc musculo.*

(b) *Advers. anat. I. p. 45.*

us observationibus (a), itemque Grassius (b), Santorinus (c), ac Schulzius. (d) Unicus vero est, quem novi ex recentioribus (e), qui sustinet, sanguinem menstruum ex sola vagina prodire, illudque se in cadaveribus observasse scribit. Quibus observationibus variisque rationibus mixtus, naturam in hoc negotio variare, & modo per uterum, modo per vaginam, modo forte per utraque loca exire, cum Freindio (f), Morgagnio, & Vaterno (g) existimo.

(33*) ad finem pag. 107. Vesiculæ in ovariiis observatæ vulgo cum Hornio, Graafio, Stenone, Merkringio &c. pro veris ovis hucusque a plerisque habitæ sunt, in quibus fœtus principium, usque rudimentum sit delineatum. Verum recentiorum varii, ut Morgagnius, Vallisnerius, Santorinus, & Paitionus cum Malpighio dubitant non solum, vesiculas illas vera esse ova, verum etiam evincere volunt, in luteis istis glandiformibus corporibus vera latitare ovula, sed minutissima, quæ post imprægnationem accrescerent: cum e contrario vesiculæ, pro ovis vulgo habitæ, facta imprægnatione decrescerent, vero ovum & fœtui in nutrimentum cederent, atque ejus expansionem, accretionem, & separationem promoverent: quæ sane res digna est, ut uberius investigetur, donec ad majorem certitudinem in re perveniamus. Cæterum licet plerique recentiores medici generationem hominis ex ovo credant, sunt tamen, præter Diemerbroekium, Ruysschium, Duverneum Chirurgum, in Zodiaco Medico Gallico, A. 1680. & Sbaraleam, ex recentissimis.

De ovulis & corporibus luteis.

a) Hist. Acad. Reg. An. 1720. p. 20.

b) Ephem. Nat. Curios. Cent. V. obs. XXIV.

c) Morgagn. Advers. anat. IV. p. 48.

d) In Commenc. litterar. An. 1731.

e) Gouey veritable chirurgie pag. 397.

f) In Emmenologia.

g) De utero gravido.

tissimis auctoribus, qui systema hoc impugna-
Vidussius (a) & *Voglius* (b) Itali, atque *de*
Motte Gallus (c); qui vero a multis recen-
 ribus, ut *Morgagnio* (d), *Santorino* (e), &
 de generatione speciatim haud pridem scrip-
 runt, *Nigrifolio* (f), *Vallisnerio* (g), *Paitono* (h)
 aliisque refelluntur: qui & *Leeuwenbækii* sy-
 ma generationis ex vermiculis in genitura v-
 li destruere satagunt.

De Tu-
 ba Fal-
 lopia-
 na.

(34*) ad pag. 108. Figuram, quam *DRAK*
 exhibet, de *Tuba Fallopiana*, quia liber ex
 Britanniam in paucorum manibus versatur,
 Tab. III. fig. 10. sistere volui. Quia vero in
 sectione publica cadaveris feminini mense
 nuario A. 1719. cum mercurium in venam sp-
 maticam dextram immitterem, ligata tubæ *Fal-*
lopiæ inferiori parte una cum ligamento
vespertilionum dicto, ne mercurius ad reliqua
 teri vasa descenderet, copiosissimorum, atque
 subtilissimorum vasorum cursum longe alia,
 adhuc pulchriori ratione per has partes obs-
 vavi, atque auditoribus demonstravi; totamque
 partem, quia nusquam similis figura existat, e-
 lineari curavi, sicuti repræsentatur Tab. III. fig.
 11. Ubi vero mercurius, postquam Tubæ *Fal-*
pianæ copiosissima vascula, totam tubam den-
 tissimis ramusculis ambientia, gratissimo spectacu-
 lo repleverat, tandem in ipsam tubæ caveam
 illapsus est; manifesto indicio vasa hæc cum
 vitate tubæ communicare, & pro ea humectari
 da at-

(a) In lib. cui titulus: *Motivi di dubitare intorno la*
nerazione de' viventi &c. in Ven. 1717. 12.

(b) In *Anthropogenia*, Bononiæ A. 1718. 4.

(c) *Dissertation sur la Generation*. Paris, 1718. 8.

(d) *Advers. anatom.* variis in locis.

(e) *Observat. anatom.*

(f) *Considerazioni intorno alla gen. de' viventi*.

(g) *L' Istoria della Generazione*, Venez. 1711.

(h) *Discorsi della Generazione*, in Venezia 1712. & 1716.

la atque lubricanda aliquod liquidum illuc deponere.

(35^{*}) ad finem pag. 108. Uterus quidem originarium atque consuetum fœtus est domicilium, ubi crescit, & ad partus tempus continetur; verum exempla quoque non defunt, fœtus extra uterum conceptos esse, & ad perfectionem usque accrevisse: quibus etiam, præter alias rationes, erudimur, *fœtum non in utero ex mixtura triusque sexus genituræ oriri*, ut cum veteribus nonnulli recentiores volunt, neque ex *substantiæ uterinae*, ut *Voglius* in *Anthropogenia* sua concludit, *elongatione*, verum *jam in ovario principium sumere*, ibidemque a genituræ virilis parte maxime volatili imprægnari, & subinde varias causas vel in hoc, vel alio loco remoramati, ut in uterum pervenire nequeat; sed nunc in ovario se extricare non possit, modo in cavum abdominis decidat, alia vice tubæ Fallopianæ angustias superare haud valeat; verum ibidem parti cuidam accrescat; nutrimentum capiat; sua plerumque & matris morte: quemadmodum triplicis hujus generis historias ex variis scriptoribus collegit atque prolixissime descripsit *Wangetus* (a); de fœtibus vero extra uterum atque in tuba Fallopii repertis *Dionis* (b) & *Anel-* (c) varia quoque exempla proferunt. Spectatim vero historias fœtuum in ovario reperi-
tum publicarunt *Zodiacus Medico Gallicus* (d), *Vieussenius* (e), ac *Littrius* (f); in abdomine depre-

a) *Theatr. anatom.* Tom. II. p. 140. & seq. quas iisdem libris in bibliotheca sua chirurgica Tom. II. pag. 131. utriusque forte molem & pretium augeret, repetit.

b) *Dissertation sur la generation de l'homme.*

c) *Suite de la nouvelle methode de guerir les fistules urinales* p. 294.

d) *An.* 1682.

e) *Dissert. de structura & usu uteri.*

f) *Histor. Acad. Reg. An.* 1701.

deprehenforum, *Straussius* (a), *Baylius* (b) & aliorum adhuc observationes refert, *Savio* (c), *Courtial* (d), *Bianchus* (e), *Calvus* (f), quibus & ea addenda historia, quæ de foetu ex utero reperto refertur in *Diario Gallico* 1722. sed in *tuba Fallopiana* inventorum, *Fal-
lanus* (g), *Elsbolizius* (h), *Bussiere* (i), *L-
trius* (k), *Duverney* (l), *Cyprianus* (m). Quibus adhuc addendum recentissimum exemplum *Santorino* (n) descriptum, aliudque, si non idem a *Paitono* indicatum, at simul in dubium vocatum, (o) & forte quoque ea historia *Camerae* de foetu per annos 46. in utero detento, de eo An. 1720. *Tubingæ* peculiarem dissertationem edidit, cujusque in variis Diariis mentio fit. quibus satis constare arbitror, quæ modo affirmavimus. Conferri hic meretur *Celeb. Vallis-
rii* liber doctissimus, de *Generatione*, Italico sermone scriptus, & sæpius jam a nobis laudatus (36*) ad finem pag. III. Quæstio agitata inter anatomicos, an sanguinis detur circulus ciprocus inter matrem & inter foetum: plerisque id negantibus, vel saltem in dubium vocantibus. Verum, præterquam quod *Covvperus* mercurium in ar-

De cir-
culo
sangu-
inis in-
ter ma-
trem &
foetum.

- (a) Historia foetus *Mussipontani*.
- (b) *Histor. anatom. gravidit. Annor. XXV.* ubi foetus *epiploos* annexus erat.
- (c) *Observ. Chirurg.*
- (d) *Observat. anatom. pag. 29.*
- (e) *Manger. Theatr. anat. Tom. II. p. 142.*
- (f) *Anel. loco citato.*
- (g) *Anthropograph. lib. 2. cap. 35.*
- (h) De conceptu tubario, de quo etiam *Tillingius* & *Deusingius*.
- (i) In *Act. Anglican. 1694. & Lipsiensibus.*
- (k) *Hist. Acad. Reg. An. 1702.*
- (l) *Ibid.*
- (m) *Epist. de foetu &c.*
- (n) *Observ. anatom. pag. 225.*
- (o) *Discorso IV. della Generazione, pag. 97.*

arterias umbilicales fœtus injectum vidit in-
 are in venas uteri matris (a); & e contrario
Ruffenius mercurium in arterias carotides canis
 avidæ injectum non tantum in omnes ejus
 membranas & viscera decurrisse; sed etiam in
 tellos in ipsius utero conclusos pervenisse af-
 mat, ut ipsorum interiora, cutisque ipsa hoc
 mercurio, per vasa sanguinea affluente, jucun-
 dæ spectaculo pingerentur. (b) *Meryus* hunc san-
 guinis circulum singulari confirmat exemplo mu-
 ris, ultimo mense gravidæ, infelici lapsu su-
 o enecatæ, ac in sectione abdominis cavitati
 sanguine turgidam, ex adverso cuncta vasa
 sanguifera, cum propria, tum fœtus una mor-
 tuus, prorsus vacua exhibentis, cum placenta ni-
 minus uterina matrici adhuc integra sine ul-
 lius sanguinis in utero effusione adhæresceret.
 Hoc unicum optarem, ut auctor addidisset,
 quænam vasa in abdomine matris læsa fuisset,
 unde sanguis effluxisset, vel ut alii, qui
 in sectioni interfuissent, hoc adhuc publice
 scirent, ut observatio sic perfectior esset. De-
 que & meam addam observationem, quam ha-
 parum sententiam hanc firmare credo. Ni-
 tum anno 1724. mense Decembri, præsentis
 D. *WAGNERO*, Collega meo conjunctissimo,
 Academiæ nostræ Philiatris, puerperam se-
 quæ duos fœtus in utero gesserat, unoque
 feliciter excluso, paullo post intra quartam
 de partem, ob enormem supervenientem ute-
 ri hæ-

a) Anatomy of the human Body Tab. 54. & Ast. E.
 or. Lips. An. 1699. pag. 53.

b) *Manget*. Theatr. anatom. Tom. II. pag. 139. Quare
 propter hoc experimentum mercurium in carotides, &
 in alias arterias, utero propinquiores, injecerit, ratio-
 nem exhibet nullam.

c) *Histor. Acad. Reg. An. 1708. p. 43. & 240. Confer-*
am potest, quod idem Meryus circa hoc argumentum
situ sine corde nato profert. An. 1720. p. 17.

ri hæmorrhagiam, altero adhuc retento morbo est. Hanc infelicem puerperam aliquot hodie post (citius enim affines sectionem admitti recusarunt) incidi, ejusque vasa sanguifera sanguine vacua deprehendi. Cumque deinde matrem quoque aperirem, inveni placentam foetus nati ab utero magna ex parte solutam; unde non dubio subita & lethalis illa hæmorrhagia foetus vero in utero adhuc relictæ placenta minus exacteque utero cohærebat. Perlustravi atque indicatis tunicis foetus relictæ, quæ ad intestinæ erant, ipsum hunc foetum scalpello aperui, ut philiatris ea, quæ in foetu notata sunt, demonstrarem; nullum in hoc infante sanguinem, neque in corde, neque in vasis majoribus deprehendimus. Unde constare potest sanguinem hujus foetus per arterias ipsius umbilicales & placentam ad uterum matris transisse, atque una cum materno sanguine per uterum effluxisse. Eundem reciprocum hunc circuitum etiam statuunt viri doctissimi, *Rauholtius* & *Morgagnius* (b), *Salzmannus* (c), aliique. Vero placentæ gemellorum, licet placentæ inter se invicem arctissime sæpius concretæ sint, communicare existimo. Nam asservo tales placentas, in quibus unius arterias & venas communia materia probe replevi, ubi vero nihil alteram arctissime licet connexam transit in placentam.

De nutritione
foetus
in utero.

(37*) ad finem pag. 113. *Fœtum per os et in utero nutriri*, præter alia singularis casus quem bis, multis Studiosis Medicinæ præfatus sum, Altorfii observavi, extra dubium ponendum videtur. Accepi nimirum aliquando foetum in cinure

(a) In Histor. Acad. Reg. An. 1714. ubi de placenta agit.

(b) Adversar. anat. IV. pag. 82.

(c) Dissert. de circul. sanguin. in foetu,

cinum perfectum, utero & membranis suis adhuc inclusum tempore hyemali frigido; ubi non solum liquor amnii, qui fœtum ambit, congelatus erat; verum idem liquor congelatus per os, totum œsophagum, & ventriculum, tanquam unum continuum corpus, digiti circiter crassitie, in œsophago reperiēbatur; quod ipsum deinde alia hyeme iterum mihi videre contigit: ita, ut liquoris hujus, fœtum ambientis, cum eo, qui in ventriculo ejus reperitur, communicatio inde sit manifesta. Neque verisimile est, tantam illius liquoris copiam, quanta in ventriculo fœtus perfecti plerumque reperitur, in hoc omnem secerni, sicut nonnulli existimant, sed aliunde potius eum provenire credo; præsertim cum omnibus illis qualitatibus donatus sit, quas ille habet extra fœtum, cui innatat. Egregie etiam hanc meam sententiam confirmat observatio, quæ in *Frid. Hoffmanni* dissert. de pinguedine pag. 10. refertur: ubi auctor scribit, infan-
tem perfectum natum esse, cujus funiculus umbilicalis putredine totus corruptus erat. Impossibile fuisset, ut vixisset, nisi aliunde, quam per funiculum, nutrimentum capere potuisset. Ita & *Petitus* Academiæ Parisinæ ostendit funiculum cœtus humani, qui in medio nodulum habebat: ubi manifesta indicia adfuerunt, hunc nodulum prius ante partum jam constrictum fuisse; unde iudicandum, hunc fœtum, sicut priorem, nutritione per os conservatum fuisse. (a) Qualem nutritionis fœtus modum per os, ex glandula thyma, *BELLINGERUS* Anglus in medium produxit, ut supra pag. 122. indicavimus. Conf. Act. Erud. Lips. A. 1718. p. 6.

(38*) ad pag. 115. *Usus* hujus foraminis ovalis magnas quondam movit lites inter *Meryum* (qui

De foraminis ovalis usu.

(a) Vid. Hist. Acad. Reg. 1718. pag. 40.

(qui sanguinem ex auricula sinistra contra vulgarem, ac receptam sententiam in dextram per illud influere contendebat) & *Duverneum*, *Tazarium*, *Sylvestrum*, *Bussierum*, *Listerum*, & *Verheyenum*, qui contrarium sentiebant, & pro recepta sententia, quam etiam plerique adhuc hodie tuentur, pugnabant; qua de re evolvi possunt cum primis *Historia Academiæ Regiæ Parisiensis* Anni 1699. aliaque laudatorum virorum scripta. *VVinslous* tamen *Meryo* aliquo modo iterum assentire videtur in ejusdem *Academii Historia* An. 1717. pag. 20. & 272. edit. *Amstelædam.* atque simul docet, *Galenum* hoc foramen & canalem arteriosum jam scivisse pag. 281. aliter ac hactenus creditum fuit. Plura etiam de hac re, ut *Nova litteraria* indicarunt, in *Hist. Ac. Reg.* 1725. proposuit, qui vero tomus a manus nostras nondum pervenit.

De mediastini interstitio.

(39*) ad pag. 120. Hoc interstitium varii magni nominis anatomici negant, imo imaginarium pronunciant; & a violenta sterni elevatione illud demum produci contendunt. Verum in illud interstitium semper in parte non solum superiori, sed etiam diaphragmati vicina, quamvis sternum lenissime tantum, ut ab hoc diaphragma commode separari queat, elevetur, deprehendi; quia blanda profecto elevatione, quam ego utor, nihil, quod antea non erat, nihil novi aut præter naturam, produci posse existimo. Imo An. 1730. in anatome publica illud amplissimum inveni ac demonstravi, ita ut mediastini membrana dextra sterni medio, sinistri vero tantum cartilaginibus costarum sinistri lateris adhæreret. Deinde præter varios auctores qui abscessus & pus in hoc interstitio viderunt, *Majerus* quoque recens auctor se sæpius ferum in hoc mediastini interstitio invenisse affirmat. (a)

(40*)

(a) In Colleg. Anatomico-præst. 4. Pragæ, 1715. p. 99.

(40*) ad pag. 122. Idem Majerus ex Muralti De thymi observ. XXXIII. refert, quod hic in thymo plurima vascula crystallina, ad mediastinum & pericardium serpentina, viderit, itemque ductum ad conchillas meantem, natura durum & membranaceum. (a) Quo vero in libro Muralti, cum plures ediderit, hæc observatio contineatur, invenire non potui.

(41*) ad pag. 125. Disputant nonnulli recentiores anatomici, quare arteria pulmonalis amplior sit vena pulmonali: cum alias in omnibus partibus venæ arteriis ampliores esse soleant. Quidam existimant, hoc fieri propter sanguinem in arteria nimis resolutum, qui in pulmone per expirationem rursus congereretur sive condensaretur, eumque propterea in vena pulmonali minus spatium requirere. Ego vero missis aliorum sententiis existimo, arteriam propterea ampliorē hic esse, quia sanguis ad cor refluus ob assitudinem difficulter per rete subtilissimum pulmonis vasculosum transire potest; hoc enim fluctatur vehementer, hinc aliquo modo in progressu suo retardatur, unde arteria distenditur dilatatur. Ex adverso sanguis venæ pulmonalis notabile obstaculum vix habet, quod ejus potui resistat; sed libere in cordis caveam sinistram influere potest; hinc hæc minor sive angustior. (b) Cum supra commemorare præterferim capsulam sive tunicam cum pericardio continuam, quæ vasa pulmonum, arteriam nigrum ac venam pulmonalem, itemque bronchia, extra & in pulmone, eodem modo, ut

Quare
arteria
pulmonalis
amplior
vena.

Y 2

capfu-

(a) In Colleg. Anatomico-pract. pag. 109.
(b) Conferri hac de re prolixius possunt ea, quæ Helwigius in Histor. Acad. Reg. Ann. 1718. pro condensando sanguine in pulmonibus, & contra hunc Michelottus in pægari epistola, atque Santorinus observat. anat. pag. 143. de eo attenuando doctissime scripserunt.

De ve-
na
bron-
chiali.

capsula Glissonii vasa hepatis includit, quam cel. *Lancisius* haud pridem egregie descripsit, (a) eam adhuc supplementi loco hic indicare volui (42*) ad pag. 125. *Venas bronchiales*, quas in homine sæpe frustra investigavi, primum An. 1719. in cadavere muliebris clare ac perspicue vidi, aliquot ramis ex venis intercostalibus ad bronchia abeuntes, quorum ramorum tres erant satis notabiles, calami straminei tenuioris crassitiem habentes; quæ vero non semper occurrunt. Sed *Couperus* affirmat, se unam vel plures sæpe vidisse in subclavias influere. (b) Plura de hac vena legi possunt in cel. *Morgagnii* Epist. anat. I. n. 90. ubi inter alia etiam meminit *Galenum* jam de hac vena scribere.

De ma-
gnitu-
dine ca-
nearum
cordis.

(43*) ad pag. 131. Auriculæ & ventriculi cordis, licet non in omnibus, ob diversam ætatem staturam, aliasve causas, eandem magnitudinem & capacitatem habeant; tamen auricula dextra & ventriculus dexter ut plurimum sinistris capaciores existunt: qua de re multa experimenta ab *Helvetio*, *Salzmanno*, *Michelotto* & *Morgagnio* facta collegit & recensuit *Nicolai* (c) *Anatomes* jam Professor Argentorati; quibus vero adhuc alias superaddit *Santorinus* (d): quæ egregie hoc argumentum illustrant.

Tuber-
culum
cordis
nega-
tur.

(44*) ad pag. 131. Hoc tuberculum, quod *Louverus* primus descripsit (e), quodque in bo-
um & vitulorum cordibus, massa sive eminencia carnea efformatum, facile ostenditur, in corde humano numquam observare potui. Memini quidem aliquem præceptorum meorum, cum tuberculum hoc in corde humano auditoribus suis
osten-

(a) Lib. de corde, &c. p. 23. 30.

(b) Anat. of. Hum. Bodies.

(c) In Dissert. de Directione vasorum &c. pag. 51.

(d) Observat. anatom. pag. 144.

(e) Lib. de Cord. pag. 48. Tab. I. fig. I. cap. I.

ostendere vellet, aperta vena, cum nihil in loco a *Louvero* indicato protuberaret, vossella partem eam, ubi tuberculum in cordibus vitulinis existit, apprehendisse, illamque elevando dixisse: *Videtis hic tuberculum cordis Louveri*. Verum cum nec ante, nec post usum vossellæ tuberculum eo in loco viderem, diligenter deinde in quamplurimis cordibus humanis illud inquisivi; verum nunquam illud deprehendere potui. Interea tamen laudatus modo *Nicolai* (a) affirmat, quod hæc eminentia in homine longe major sit, quam in bestiis. Verum ego ob hanc causam plura corda humana in spiritu vini asservo, in quibus semper ostendere possum tale tuberculum sive eminentiam abesse, eamque ob causam in prioribus hujus libri editionibus illud, tamquam partem in corpore humano non existentem, omisi. Nusquam etiam in elegantissimis de corde figuris in *Covvperi* nova Myotomia reperitur; sed concursus ille venæ ascendentis & descendens, planus, ut ego semper vidi, repræsentatur: & si forte quandoque adest, quemadmodum & *Schulzius* se illud vidisse affirmat, (b) raro tamen id adeste existimo.

(45*) ad pag. 132. *Louverus* in cordis descriptione fibras rectas musculares, subjectas reliquas involventes, descripsit: quæ quidem in animalibus brutis facile ostenduntur; verum a quibusdam magni nominis anatomicis in humano corde prorsus negantur. Fateor quidem, tam multas in hoc non adeste, quam in bestiis; at tamen hoc affirmo, me in humano ea ostendere posse, præsertim in superficie sinistri ventriculi. Quem in finem adhuc cor humanum diuturna maceratione in aqua, donec membranam externam avellere potuerim, ita præparavi, ut

Y 3

abla-

(a) Loc. citato pag. 53.

(b) In commerc. literar. An. 1731. p. 33.

De fibris
cordis
rectis.

ablata membrana hac, mox fibræ rectæ in conspectum prodierint: quod cor etiam propterea adhuc in spiritu asservo, ut dubitantibus illas ostendere possim.

De ve-
ro œso-
phagi
situ.

(46*) ad p. 134. Non conveniunt recentiores anatomici de situ œsophagi respectu asperæ arteriæ in collo. Plerique cum recta post tracheam situm esse scribunt, inter hanc scilicet & vertebrae colli; Cl. Morgagnius vero eum aliquo modo ad latus dextrum tracheæ inclinantem delineavit. (a) Sed Winslous ad latus sinistrum illum semper situm esse contendit. (b) Cantius erroris Vesalii accusat, quod gulam post tracheam collocaverit, atque simul Morgagnium reprehendit, quod œsophagum in latus dextrum asperæ arteriæ pinxerit, provocatque ad Eustachii tabulas. Verum ego in hoc situ naturam variare, & ut dicunt, ludere existimo: certeque asseverare possum, me, ut alias observationes taceam, adhuc ultimis investigationibus aliquoties gulam œsophago subjacere deprehendisse: in aliis cadaveribus ad latus dextrum inclinantem, ut a Morgagnio pingitur, attamen eum etiam in latere sinistro vidi. Si quis vero Eustachii tabulas, ad quas Cantius, licet neque numerum tabulæ, neque figuræ indicet, provocat recte inspicit, ille cognoscet, opinor, Eustachium etiam œsophagum post tracheam pinxisse. Nam in tab. 41. fig. 8. & 9. ubi trachea cum gula (quod notandum) capite dextro lateri incumbente sistitur, gula vix potest aliter apparere, quam si ad latus sinistrum inclinaret, licet post tracheam sita sit; tabula vero 42. fig. 4. & 6. gula & trachea quam manifestissime sibi incumbunt.

De du-
ctibus
novis
Vercel-
lonii.

(47*) ad pag. 135. Ductus excretorios novos, in œso-

(a) Advers. anat. prim. Tab. I. lit. G.

(b) Hist. Acad. Reg. A. 1715. p. 315.

in œsophagum desinentes, multos haud adeo pri-
dem descripsit JAC. VERCELLONIUS in libro,
cui titulus: Dissertatio anatomico-medica de glan-
dulis œsophagi conglomeratis 4. Astæ MDCCXI.
In hoc libro Auctor contendit digestionis nego-
tium nondum hucusque perspectum fuisse, quia
Medici humorem vere digestivum ignoraverint.
Hunc vero humorem œsophago & ventriculo
per ductus subtilissimos infundi, 1. ex glandulis
conglomeratis, sinistro ventriculi ostio astitis, 2.
ex dorsalibus, & 3. ex bronchialibus & trachea-
libus. Ex thyroidea vero glandula, quæ nidus
esset ovorum verminosorum, ovula verminosa
ad œsophagum & ventriculum transmitti, quæ
chylo characterem vitalem conciliarent; sicuti
hoc jam in Adenologia N. 384. & seq. indica-
vi. Quid vero de his glandulis ac ductibus ob-
servaverim, in adenologia quoque candide pro-
fessus sum.

(48*) ad pag. 139. Naturam varie in sinibus *De fini-*
his duræ matris ludere, quartumque non semper *bus du-*
adesse, jam pag. 139. notavi. Hinc vero adhuc *ra ma-*
monendum sinum lateralem sinistram ex obser- *tris.*
vatione Morgagnii sæpissime a dextro incipere,
non autem a longitudinali, ut vulgo putarunt.
(a) Deinde sinus faucis, quem inferiorem vo-
cant, mihi omnium minime sinum videri, quia
tunicæ ejus tenues, ut in aliis venis; neque li-
gura ejus angularis, ut aliorum. Præterea no-
tavit Morgagnius, se sinus laterales per canalem
peculiarem transversum communicantes invenisse
(b): id quod ego quoque anno 1726. vidi;
huncque canalem sive sinum communicationis,
sicuti in eo cadavere erat, Tab. VII. fig. 32. de-
lineari curavi. Rivinus quoque sinus transversi
mentionem facit, Dissert. de Auditus vitiis, pag.

(a) Advers. anat. VI. p. 2.

(b) Ibidem pag. 2.

31. Omnes vero minores duræ matris sinus describere velle, vix operæ pretium esse puto.

De rete
mirabili.

(49^{*}) ad §. 273. pag. 148. Non pauci sunt auctores, qui hoc recte homini denegant, quorum varios collegit Nicolai, (a) mirorque ipsum *Ruyschium*, qui hoc rete olim figura & verbis indicaverat (b), nunc fabulis illud annumerare: (c) cum tamen, si modo dura mater utrinque juxta glandulam pituitariam scalpello decenter aperiatur, unicuique rete mirabile facile in conspectum veniat. Illud primum a Varolio descriptum esse notat Morgagnius Epist. anat. I. n. 91.

De primario
visus
organo.

(50^{*}) ad pag. 154. Veteres pro primario visus organo *humorem crystallinum* agnoverant; recentiores vero superiori sæculo tunicam nerveam oculi, *retinam* dictam; quæ sententia cum experimentis opticis optime conveniens, plerisque & Medicis & Mathematicis post *Cartesium* placuit, & adhuc hodie placet. Attamen *Mariottus*, celebris Mathematicus, *choroidem* organum visus præcipuum constituere voluit (d), multis ratiociniis & experimentis in medium adductis. Hunc deinde secutus est *Meryus* (e), varia quoque nova experimenta proferens; itemque *Do: de Mayran* (f) & *Dn. de S. Yves*, oculusarius quondam Parisinus celebris. (g) Verum quia in omnibus reliquis sensuum organis pars sentiens primaria nervus est, rationem sufficientem non video, quare hic nervi optici expansionem in

ocu-

(a) Dissertat. de directione vasorum, p. 43.

(b) Epist. problem. VII. Tab. 13. lit. T.

(c) Advers. anat. II. pag. 45.

(d) *Nouvelles decouvertes touchant la vue*, & Aët. E-rudit. 1683. pag. 67.

(e) Hist. Acad. Reg. 1704.

(f) Dissert. de causa lucis phosphororum. Vid. Aët. E-rudit. 1717. p. 460.

(g) *Traité des Maladies des Yeux*, p. 36.

oculo, quæ retina est, excludere, aliique minus ad sensationem aptæ membranæ hoc negotium committere malimus. (a)

(51*) ad pag. 154. Lis ab aliquo tempore mihi mota est, ab adversario sententiæ meæ de cataracta & glaucomate, **UTRUM PLUS HUMORIS AQUEI EXISTAT IN ANTERIORI, AN IN POSTERIORI OCULI CAMERA?** id est, *utrum plus humoris aquei inter corneam & uveam, an inter uveam & lentem crystallinam existat?* Adversarius sustinebat, in posteriori, ego vero in anteriori camera plus contineri affirmabam. Ille, ut videtur, ex figuris brorum magis, quam autopsia edoctus, & ad hypothesin suam de suffusione sine cataracta tantò melius defendendam, ita sentire necesse habebat: præsertim cum plerique scriptorum anatomicorum & opticorum spatium illud inter uveam & crystallinum, vel majus longe, (b) vel saltem æquale (c) pinxerint illi, quod inter uveam & corneam intercedit. Cum vero ob multa ex-

De humoris aquei & crystallini in oculo vero situ controversia.

- (a) Conf. de la Hiere diss. de Visu, & Hamel. Hist. Acad. Reg. m. pag. 73.
- (b) Vid. Vesalius ca. de Oculo, Casserii Tab. anat. lib. Tab. XII. fig. 1. Vid. Vidius anat. Tab. 78. fig. 20. Valda Anatom. Tab. III. lib. V. fig. 1. Keplerus Paralipom. g. 177. Horstius de Natur. hum. Tab. XXIX. Bartisch. Ophthalmod. fol. 8. Plater. Tab. Anat. Tab. 49. fig. 1. Himmer. Anatom. p. 238. Baubin. Theatr. anat. lib. III. Tab. XII. fig. 1. Bartholin. Anat. reform. cap. de Oculo, Tagn. Anat. Tab. 13. fig. 1. & 2 Briggs Ophthalmogr. fig. 5. Schön. ocul. artificial. variis in figuris, Blegny Zodiac. Med. Gallic. An. II. p. 112. fig. 1. Salom. Alberti in Hist. part. p. hum. Meekren. obs. chirurg. append. cap. XII. Bourne Tab. anatom. V. fig. 3. Wagner. diss. de oculo fig. 5. 6. Finiere Experiences de Physique Tab. 5. 16. aliique.
- (c) Ut Stephanus Dissert. part. corp. hum. pa. 303. Carus in Dioptr. Scheinerus in Fund. opt. Honorat. Fabri de homine pag. mihi 300. fig. 1. Newton. Opti. Hartker. Dioptr. Verheyen. Tab. XXVII. fig. 5. Raubault Physica, aliique.

ta experimenta, olim jam in Hollandia instituta, certus essem, plus humoris aquei in anteriori quam posteriori camera reperiri, tamen occasione hujus controversiæ denuo accurate in hujus rei veritatem inquirere, veramque delineationem exhibere constitui, quia a paucis fatis bene humorum oculi situs exhibitus est. (a) Quod vero in oculis recentibus, & non congelatis effluxum humoris aquei inter disseccandum, & collapsum tunicarum, humorum situs rite conspicui, adeoque de eo recte judicari nequit, propterea necessum est, ut experimentum in oculis congelatis institutur: in quibus, si caute procedamus, omnia naturalem & verum situm retinent. At quoniam ultima illius hyemis, & penultimæ maxima pars, cum altera vice hoc compendium ederem, nimis temperata erat, & magni frigoris tempore cadavera humana minus non mox prostabant, primo in variorum animalium oculis recentibus ego aliique tam Antoni, quam Norimbergæ, instinctu meo, experimenta instituimus, & in omnibus his oculis per axin dissectis, crystallinum uveæ valde vicinum, atque *inter crystallinum & uveam exiguum ac vix percipiendam humoris aquei copiam invenimus, inter uveam vero & corneam quadruplo vel saltem longe majorem semper quantitatem effundimus*, sicuti ex Tab. nostra IV. fig. 18. quod suillum oculum repræsentat, videre est. Nullum vero æqualem, nedum majorem copiam post uveam invenit; sed omnia experimenta & delineationes cum sententia nostra accurate conveniebant. Interea tamen, ut quoque ex homine delineationem veram exhibere possem, si forte & ultima illa hyeme cadavera frigoris tempore me

(a) Inter eos, qui hunc situm optime repræsentarunt sunt *Fabric. de Aquapend. de Visus organo cap. VII* & *Mariott. de Visu fig. 3. Bidloo de Oculis & Visu pag. 21*

me deficerent, per litteras rogavi Cl. MORGAGNIUM, quia sæpius ipsi cadavera præsto essent, ut non solum suam sententiam hac de re mihi perscriberet, verum etiam oculi humani, dicto modo præparati, delineationem transmitteret. Ad quæ Vir humanissimus doctissimusque VII. Kal. Februar. anni 1719. non modo respondit, *se semper longe majorem humoris aquei copiam inter corneam & iridem, quam inter hanc & crystallinum vidisse*, sed etiam delineationem, quæ Tab. nostra IV. fig. 19. hic a nobis exhibetur, benevole transmissit. Opportune vero in fine mensis Martii anni 1719. cum alteram hujus compendii editionem pararem, cælum frigidum nobis favit, ut experimentum quoque novum in nomine, violenta morte extincto, instituere optime licuerit, ubi in theatro anatomico toti spectatorum coronæ in oculo bene congelato clare demonstravimus, vix conspicuam humoris aquei copiam inter iridem & crystallinum, longe vero majorem inter iridem & corneam extitisse: ita ut cum delineatione MORGAGNII oculus sic optime convenerit; id quod & postea nobis multisque aliis semper feliciter successit. Potuissimus hinc quidem nostram delineationem hic exhibere: sed maluimus viri integerrimi, & a partium studio liberi, figuram retinere, ut æqui arbitri tanto melius inde judicare queant, utrum diversarius, an Morgagnius & ego verum scriberim. Vid. eadem de re observatio, quam in Ephemerid. Acad. N. C. Cent. VII. & III. inferendam transmissi, quæ ibid. p. 381. legi potest.

His quidem nonnulla, verum consueto, amantissimo suo more & stylo Volbustus variis in scriptis opposuit; atque in eis audacter calumniando, quasi rem suam honesto ac decenti modo gerere non posset, meam sententiam & experimen-

menta convellere allaboravit. Verum sicuti in Apologia & Vindiciis meis ipsum de erroribus plagii, ac mendaciis quamplurimis ita convictum ut hucusque coram orbe literato se ab iis purgare non potuerit, sic vel ex sola maledica subscriptione ratione, qua cum in alios honestissimos viros, tum in me continuo acerbissime debacchari pergit (a), honesti malam ejus relictis agnoscunt. Quare etiam cum inficeto tantum adversario, præsertim cum viri plures præstantissimi, inter quos *Morgagnium* & *WVinsloum* summos anatomicos, *Petitum* Medicum doctissimum *Namurcensem*, *Dn. Reneaume* Academicum *Parisiensem*, itemque *Dn. de St. Yves* *Morandum*, & auctorem, quisquis ille sit, quod compendium meum gallice vertit, atque commentario illustravit, (b) nominasse sufficiat, mihi hi assentiant, me ulterius committere, donec urbano decentique modo forte aliquando scribam nolo. Attamen uno alterove tantum exemplo hi demonstrabo, quam vana ipsius sint argumenta contra me producta (c). Primum ipsi est, "quo-
 ,, globus oculi a parte convexa corneæ usque ad
 ,, centrum oculi semper crescat & augeatur; ergo
 ,, cameram oculi posteriorem majorem esse, quam
 ,, anteriorem." Verum hoc argumentum clare ostendit, quam male ocularius hic oculi fabricam intelligat. Hoc quidem argumentum verum esset, si oculi sphaera cava liquore solum repleta esset, vel ligamentum ciliare longius esset aut remotiorem a cornea situm haberet. At qui hoc cum crystallino, tanquam paries, sive septum camerae posteriori brevissimos limites ponit, sicut ex Tab. nostra IV. fig. 19. (quæ *Clar. Mor-*
ga-

(a) Vid. Censuram ejus amarulentæ plenissimam in *Mémor. Trevolt. An. 1725. mense Martio.*

(b) Titulo: *L' Anatomie d' Heister. 8. a Paris 1724.*

(c) *Journal des Scavans An 1720.*

gagnium auctorem agnoscit) conspici potest, hinc hoc argumento non evincit, quod volebat; sed potius ex vero hoc uveæ ligamenti ciliaris, crystallini, & vitrei situ manifeste cognoscitur, cameram posteriorem non augeri, aut anteriori majorem fieri, quamvis oculus versus centrum crescat. Deinde „*ex puris copia, quæ quandoque, que in hypopio post uveam observatur*,“ sententiam suam stabilire contendit. Verum quales mutationes partium in morbis fiant, & in primis quantum pus alicubi contentum partes præter naturam divellere, expandere, & mutare possit, nemo ignorat: id quod vel ipse adversarius in Memor. Trevol. An. 1725. pag. 406. in maledica sua censura sponte fatetur. Unde constat, quam male ex hoc aliisve morbosis casibus aut operationibus quibusdam chirurgicis naturalis & vera oculi constitutio doceri queat. Ita & reliqua ejus argumenta similis farinæ facile, si vellem, refutare possem. Verum quia compendii ratio non permittit, ut in una controversia nimis diu versemur, hæc & consensus supra laudatorum virorum nobis jam sufficiant, rectoribus judicium relinquentes, cujus sententiam amplecti malint: præsertim si ea, quæ Cl. Winslous hac de re in Memor. Acad. Reg. An. 1721. & Petitus Medicus in eadem Acad. Regia An. 1723. scripserunt, prius legerunt.

(52*) ad pag. 155. HOVIUS in tractatu suo *de De ocul. motu circulari humerum in oculis*, vasa sanguife- lo ania
la minora in oculo, quæ sanguinem rubrum non mad-
amplius vehunt, sed lymphaticum, dudum a versio-
MUTSCHIO descripta atque delineata (a) novo nes a-
nomine donavit, eaque NEURO-LYMPHATI- lia.
CA appellavit. Quam vero ob causam novo &
mutato nomine hic opus sit, & præsertim ta-
li, a

(a) In Epist. problem. Tab. XVI.

li, a nervis desumpto, in vasis, quæ, vel arteriarum, vel venarum propagines sunt, & ab aliis *arteriæ vel venæ lymphaticæ*, prout vel ab his, vel ab illis oriuntur, appellantur, vel vasa *arterioso-lymphatica*, ego certe idoneam rationem non video: & idcirco a nomine tali, quod perverfam ideam lectoribus, ac præsertim tyronibus excitare potest, abstinere malui. Præterea in eodem libro quædam adhuc lectorum uberius considerationi commendamus: ut, quando *tunicam choroideam in quinque tunicas dividendam* esse vult; dubito vero, an in oculo humano hanc divisionem præstare queat: cum sua experimenta ob cadaverum inopiam, ut ipse pag. 58. fatetur, tantum ex brutis desumerit. 2. *Musculosas fibras in processibus ciliaribus, & ligamento ciliari negat* pag. 68. & 101. quia vascula essent. Verum respondeo, ratum esse hodie prudentioribus anatomicis *fibras musculosas esse cavas, si ve vascula*; ideoque ex hac sententia nullæ amplius musculosæ fibræ in corpore essent statuendæ; id quod absurdum esset. Hoc vero vasculosum esse non prorsus repugnat musculosæ naturæ, quæ potissimum in manifesta motus sive contractionis actione consistit. In pupilla vero actio contractionis & dilatationis est manifesta & fibræ, musculosis simillimæ, in processibus ciliaribus conspiciuntur, quæ vasculorum habitum prorsus exuerunt. Ergo merito pro veris musculosis fibris habendæ sunt. Pagina tamen 25. uveæ substantiam appellat *musculo-membranaceam*. 3. Pag. 21. contendit, *vasa adducentia oculorum ab una eademque scaturigine provenire, a ramo scilicet carotidis interno, at non intra cranium admisso, uti NUCK sustinisset, verum oculorum orbitæ impertito*. At sciendum, quod in homine etiam revera e cranio ad oculum excurrant. 4. Pag. 49. ait, *ductum arteriosum Nuckii, e cranio provenien-*

cientem, non esse scaturiginem ductuum aquosorum, quia nimis parvus esset. Respondetur, eum non esse solum scaturiginem, sed per anastomosis unctum cum aliis ramis ad oculum excurrentibus. 5. Pag. 30. *choroideam tunicam cum Mariotto aliisque a pia matre productam esse* perhibet: verum hoc non probat. Nam non solum diversissimæ est naturæ, coloris, figuræ, & habitus; sed etiam certum est, reliquas membranas corporis simul cum pia matre generari, & ortum eum huic non debere. 6. Pag. 45. inquit, *crystallinum e nervis pellucidis constare*. Sed quæritur, cur non potius dicat cum aliis, *ex vasis pellucidis*? 7. Pag. 75. *Gluten in sanguinem sine novo acido restaurari non posse* ait, *illudque acidum nisi in glandulis separari*. Quam vero sententiam nullo modo probavit, nec probare forisquam poterit. 8. Pag. 77. affirmat, *conglomeratas glandulas nullis inferentibus gaudere vasis*: quod vero est contra omnem rationem atque experientiam: si enim nulla inferentia essent vasa, nihil in ipsis secerni posset. 9. Pag. 95. ait, *oculum venosum a ligamento ciliari linearum NB. X, SEPTEMVE mathematicarum distantia abesse*, cum tamen oculus integer vix septem lineas operet, & hic circulus ligamento ciliari sit quam proximus. Unde apparet, eum, quid linea mathematica vocetur, non intelligere. 10. Arterias oculi, *fontes* appellat, variis in locis; sed quid aliud est *novo nomine*, & entia præter necessitatem multiplicare? 11. Pag. 165. *angulum oculi externum, canthum minorem* appellat, id quod contra consuetudinem & ipsos sensus. Taceas jam multas similes hallucinationes. Ceterum in amarulenta sua epistola in meritissimum RUTSCHIIUM perhibet, ac persuadere vult lectoribus, se (hominem Batavum) RUTSCHII scriptor adeo nota & celebria nunquam vidisse, ut

plagia sua defendat. An vero qui, facile h
credet, cum in Hollandia ubique proflent, o
nibus literatis notissima sint, valde dubito.

De ner-
vi opti-
ci in-
sertio-
ne.

(53*) ad pag. 155. Notandum hic esse exit
mamus, quod *nervi optici* licet obiter intue
appareant in oculis ex orbita exemptis, atque
musculis ac pinguedine liberatis, quasi direc
in medium sive centrum partis posterioris oc
inferantur, tamen *oculum non ingradientur in*
co pupillæ e diametro opposito, ut *BRIGSIUS*
luit (a), sed utrique magis prope nasum:
radii ab objectis in ipsos nervos, cum quib
arteriæ ingrediuntur, incidunt, a quibus qu
absorbentur & suffocantur. Pupillæ enim utri
que oculi per pollices fere tres a se invicem
stant; foramina vero cranii, per quæ nervi op
ci orbitas intrant, parum ultra unicum pollice
(b) Sciendum vero est, hunc oculi locum, i
nervi optici eum ingrediuntur, cæcum esse:
quod nobili *MARIOTTI* experimento primu
evictum est (c); hinc multa non viderentur,
directe e regione pupillæ nervi ingrederentur
quod vero incommodum nervi a latere nasi
sertione præcavetur, ut homo talem defectum
oculo non percipiat.

De
quanti-
tate
salivæ.

(54*) ad pag. 156. Quod per hunc ductu
Stenonianum larga salivæ copia, præsertim in
mandendum effluat, variæ observationes chiru
gicæ

(a) Ophthalmographia cap. 3.

(b) Conf. *Boerhaav.* Instit. Med. cap. de Visu, & c
primis *Winslow* in Memor. Acad. Reg. An. 1721. ubi
huc varia alia de oculo dōte pertractat.

(c) *Nouv. Decouvert. touchant la vue*: quod deinde
la Hire differt. de Visu, *Boerhaav.* l. c. *Stancarius* Sch
dis mathem. pag. 38. alique confirmarunt. Ego hoc quoc
experimentum more *Mariotti* sæpe imitatus sum: ver
etiam nova ratione noctu, ope vel unius, vel duarum can
delarum illud institui: ubi legitimo loco ac distantia rep
tis, mox candela disparuit.

gicæ docent. Et primo quidem *Fabricius* ab *A-*
quapendente observavit, (a) in vulneribus gena-
 rum versus aurem, foraminulum angustum vix ocu-
 lis conspicuum, apparere, per quod, potissimum
 ubi patientes mandunt, tantam copiam exire lim-
 bide aquæ, quæ est veluti lacryma ab oculis emis-
 sa; quæ vero, quomodo, & unde effluat, se ne-
 scire fatetur; ductus enim salivales tunc nondum
 erant cogniti. Deinde *Helvetius* affirmat, (b)
 quantitatem hujus liquoris, in hac glandula secre-
 ti, tantam esse, ut, cum miles vulnus gladio in-
 dictum accepisset in gena, quo ductus hic salivalis
 affectus esset, quoties hic cibaret, semper unico,
 oque brevi prandio vel cœna, aliquot mappulas
 (serviettes) saliva per hunc effluente totas imple-
 ret. Similes casus & ego & adhuc alii viderunt.
 Unde constat, quam inepte nonnulli motu ma-
 illæ in manducatione salivæ in glandulis sepa-
 rationem & progressum ad os promoveri ne-
 sent, totumque negotium animæ adscribere
 velint. Conf. & *Nuckii* Sialographia cap. III.
 pag. 64.

(55*) ad fin. pag. 157. Glandulas sublingua-
 les vascula excretoria utrinque ad linguæ late-
 ra obtinere brevissima & angustissima, sibi invi-
 cem parallela, vixque conspicua, nisi premantur,
Steno prius in brutis notavit atque delineavit (c);
 Deinde *Stenonis* verbis, ejus tamen nomine sup-
 presso, ea quoque indicavit *Verheyenus*. (d) Ve-
 rum quia a summis quondam Belgii Anatomicis
 hæc in homine nunquam demonstratas videram,
 osque & alios magni nominis Anatomicos ali-
 ter sentire ac scribere noveram, atque ego ipse
 ea aliquoties frustra investigaveram, ea in bru-

De
 glandu-
 le sub-
 lingua-
 lis du-
 ctibus.

Z

tis

(a) In Chirur. cap. de genarum vulneribus, m. p. 180.

(b) Histor. Acad. Reg. An. 1719 pag. 43.

(c) In Observ. anatom. de Glandul. oris, §. 20. fig. 3.

(d) Anatom. Tract. IV. cap. XX.

tis tantum ita esse putaveram, donec Clar. Mo-
gagnius non modo in literis suis, humanitate a-
que eruditione plenissimis, sed etiam in scriptis
suis doctissimis (a) me certiores reddiderat
dari revera etiam in homine complura utrinque
ejusmodi vascula, quæ ab exterioribus glandula-
rum sublingualium lateribus, non antrorsum, sed
in transversum, recta gingivas versus tenderent
& non magno a glandulis intervallo peculiari quo-
que osculo hiarent, per quod sæpius tenuiores su-
tas immittere potuerit, a quo tempore majori cu-
ra in ipsa inquirere cœpi, atque etiam tandem
inveni. Interea vero harum glandularum ductus
peculiari differtatione prolixius descripsit, & pri-
mus, quantum novi, ex homine delineavit Cla-
VValtherus, Regis Polon. archiater, & professor
Lipsiensis celeberr. (b), eorumque octo repræ-
sentavit. Mense vero Februario anni 1727. in
cadavere virili hos ductus longe plures atque am-
pliores, quam nunquam alias vidi, inveni, atque
sicuti erant in hoc cadavere, ex uno latere, lin-
gua adhuc perspicuitatis gratia cum maxilla in-
feriori naturaliter cohærente, accurate delineari
curavi. Vid. Tab. nostra VII. fig. 33.

De lin-
gue fo-
ramine
cæco e-
jusque
novis
ducti-
bus.

(56*) ad pag. 157. In eodem cadavere, fo-
ramen, cæcum vulgo appellatum, in lingua va-
de amplum & profundum deprehendi, ita, ut
crassum tubulum, qualem alias pro ureteribus
& vesica inflanda adhibere soleo, nullo negotio
immittere potuerim. Cumque per hunc pro du-
ctu, a Vatero indicato, detegendo aerem infla-
rem, pars linguae posterior insigniter quoque in-
tumescebat. Quoniam vero nec sic ejus verum
situm, constitutionem, & progressum cognoscere
valebam, siphone ceraceam materiam rubram
inje-

(a) Adversar. VI. pag. 130.

(b) Exercitat. de Lingua, 4. Lips. An. 1724.

injeci, atque hoc eo quidem successu, ut, postquam foramen cæcum in lingua aperuerim, (vid. Tab. VIII. fig. 34. lit. A.) mox principia duorum notabilium, hucusque non descriptorum, ductuum se offerebant, qui ad lineæ circiter profunditatem sub tegumentis linguæ pergebant; quibus tegumentis caute remotis, ductus hi, alter in sinistro, alter in dextro latere eadem figura, magnitudine, situ, & progressu, sicuti hic exemplar delineati sunt, apparebant; quorum sinister b usque ad tuberculum cc, quod vesicula pellucida erat, liquore salivæ simillimo turbebat, qui liquor, ut mihi videtur, a cera injecta in illum locum repulsus est, ubi cedere nesciens, partem posteriorem hujus ductus ita dilatavit. In dextro d non nisi in principio aliquid ceræ hærebat; qua rursus exempta, statumque tubuli tenuis injectum usque ad e propelle potueram, sic ut a d usque ad e ductus ejusdem substantiæ, ac salivalis *Warthonianus* est, manifestabat; in cujus fine vero nulla vesicula, ut in altero latere, conspiciebatur: qui igitur ductus in hac lingua, quam adhuc in spiritali assero, veri ductus salivales mihi videntur. Quoniam vero in eodem foramine cæco adhuc a oscula lit. gg indicata, eadem magnitudine, hic exhibentur, aderant, deorsum spectantia, æ autem stylum tenuem ultra lineam unam pereramve non admittebant, hoc foramen, sive analem, cum *Collino*, *Morgagnio*, & *Vatero* dum excretorium glandularum lingualium, vel incursum esse judico variorum ductuum, qui glandulosa substantia linguæ salivam in eos ponunt: quos vero ductus, præsertim si maximum illud foramen abest, quemadmodum sæpe contingit, per plura minora oscula se exorare, naturamque in his valde variare existimamus. Quæ ceteroquin adhuc in hac figura notanda,

da, in tabularum explicatione monebimus. Ductus vero a *Coschvitzio* pro salivalibus novis descriptos atque delineatos, & a *Kulmo* (a) repetitos, cum *Du Vernei* (b) aliisque venas ex iudico.

De
glandulis
molaribus.

(57*) ad pag. 157. In hoc ipso subjecto duæ insignes glandulas conglomeratas utrinque una circa dentes molares posteriores maxillæ superioris, inter muscolum buccinatorem & masseterem, ea magnitudine & figura, ut in fig. 3. ffff delineantur, deprehendi, quæ ob situm molares dici possent: in quarum qualibet duo magna oscula, punctis lacrymalibus duplo ampliora, quæ facillime setas crassas, gggg, itemque stylos, quibus in fistula lacrymali utor, ad ductum linearum profunditatem admittebant, perspicue belle conspiciebantur; in sinistra vero adhuc duo vel tria paullo minora foraminula aderant, quæ omnia membranam oris & buccinatorem musculum penetrabant, glandulaque leviter pressa guttulam quodlibet salivæ pellucidæ dabant. Fig. 37. ostendit faciem externam glandulæ sinisteris ex pluribus minoribus, fere ut mori fistus compactam: unde, quod ad compositas seu conglomeratas, ut vocant, pertineat cognoscere potest, quæ vero in hoc cadavere, ubi dentes posteriores deficiebant, cum glandulosa palmaria substantia cohærebat. An hæ glandulæ semper adsint, earumque ductus sive oscula excretoria in aliis quoque adeo sint manifesta, affirmare non audeo, sed ulterius inquirendum est.

De
ductu
mucoso
in pharyngis
fornice.

(58*) ad pag. 157. Cum in eodem cadavere circa tubas Eustachii & musculos columellæ per vestigandos occupatus essem, forte fortunam di-

to im-

(a) In Tabul. anatom. germanice editis Gedam 17 in 8. Tab. XII.

(b) Disquisit. anatom. duct. saliv. novi Coschvitzii Tubing. 1725.

to impingo in supremam pharyngis partem, in locum figuræ 37. b. membranæ illius crassæ, quæ ibi inferiorem partem apophysis magnæ ossis occipitis investit, ubi ex loco a, prope supremam vomeris partem, humorem mucosum, non pelucidum, prodire observo. Cumque postea studio illam regionem ac viciniam premerem, semper similis humor prædibat. Exploraturus, quid hoc foraminis sive ductus in fauces hiantis esset, primo stylum tenue versus anteriora itemque ad latera immittere volebam; verum res non succedebat. Postquam vero eum recta ad posteriora, sive versus magnum occipitis foramen dirigerem, facile ad digiti transversî profunditatem intrabat nimirum usque ad b. Deinde cum cognoscerem, meatum sive canalem hunc tam amplum esse, ut crassiorem stylum admittere posset, talem immisi, qualis in eadem figura f. conspicitur, qui quoque usque ad b. liberrime intrabat. Immisi etiam aerem per tubulum; ubi densam vero substantiam parum vel nihil resistebatur: sensim tamen sensimque satis largam liquidi mucosi copiam exprimere poteram. Perui deinde hunc meatum, eumque ab osculo a ad b, inter substantiam densam glandulosam, quæ cingitur, sub medio apophysis ossis occipitis versus foramen magnum se extendere comperi. Suspicabar primum, annon hic ductus forte morbosus esset in hoc cadavere, aut ulcriculum præter naturam, inprimis quia vir hic, præter alia symptomata, quæ passus est, etiam faucium inflammatione, eo morbo, quo mortuus est, laboraverat, præsertim quia etiam non succurrebat, quod quisquam de ductu tali hoc in loco aliquid scripserit. Postea vero incido in locum Santorini (a), ubi de *pharyngis fornice* agit,

Z. 3

quo

(a) Observat. anatom. pag. 137.

quo hanc fere regionem intelligit, quam hac figura inter narium extrema posteriora, utramque tubam Eustachii, & foramen magnum occipitis repræsentamus. De hac scribit, quod densa crassaque membrana obtegatur, plurimis cum lata glandulis, e quibus spissior mucus destillat. Hanc in leves cavitates, quodam velut ordine compositas, aliquando discretam se offendisse, aliquando in inordinatos loculos diductam, aliquando si cavernosam reperisse, quæ conspicuis osculis, a profundioribus sinubus propemodum tonsillas æmularetur, e quibus primum fuisset mucosum humorem elicere. Hic mucus, sive ex pluribus osculis, sive ex unico, ut ego hic observavi, & quasi communi proveniat, in cujus canalem vicina glandulosa substantia sese exoneret, (qua in re analogia inter canalem sive foramen illud linguæ & hunc canalem intercedere conjicio) pro faucibus lubricandis, vocis suavitate, ac cibis facilius per gulam detrudendis inservire videtur. In statu præter naturam autem, si redundat, ex his fontibus illam proluviem, quam sic affecti e capite destillare indicant, & frequenti excreatione rejiciunt, maxime provenire, cum Santorini judico.

De du-
ctu e
nari-
bus ad
pala-
tum.

(59*) ad pag. 165. In ultimis, quæ secui cadaveribus magno studio in ductum hunc, Ste nonis, ut vocant, a naribus in os, post dentes incisores inquisivi. Verum quo manifestior esset in sceleti capite, eo obscurior mihi apparet in cadaveribus. Rugas & foveolas quidem varias post dentes incisores semper deprehendo; sed nullum ductum aut canalem ad nasum; neque stylo tenuissimo, qui neque feta puncta lacrymalia facile ingreditur, detegere potui. Palati membrana rugosa ibidem postea resecta, stylus quidem in canalem osseum juxta membranam, quæ per hunc canalem exporrigitur, per breve

spa-

spatium intrabat; verum in nasum non penetra-
bat. Ita viceversa nec a naso ad os aperturam
reperire potui, quæ vel tenuissimum stylum aut
setam transmisisset. Quare membranam hanc,
quæ satis valida est, *ligamentum* quasi *esse suspi-*
cor, quod membranam palati ossibus necit &
firmat, ne a durioribus aut asperioribus alimen-
tis, aliisve injuriis a palati ossibus facile avella-
tur, unde gravia alias symptomata oriri pos-
sent.

(60*) ad pag. 168. Cl. RIVINUS hoc fora-
men, quod nonnulli *hiatum Rivini* appellant, sta-
tuit in ea parte tympani, ubi *chorda* sita est,
& manubrium mallei capitulo suo jungitur: si-
cut locum hunc designat & figura illustrat ipse
RIVINUS (a) itemque Cl. TEICHMETERUS, di-
cipulus & Auditor quondam RIVINI, Anatom.
am Professor Jenens. celeb. amicus & fautor sin-
gulariter colendus. (b) Alii hoc foramen alio in
loco, alioque modo describunt: & quidem inter
recentissimos scriptores anatomicos CHESEL-
DENUS affirmat, membranam tympani eo in
loco, ubi circulus osseus, cui in infantibus hæc
tympani membrana innascitur, integer non est,
non tantum apertam esse, in quantum circulus il-
le deficit (c). Eam tamen aperturam in diver-
sis hominibus variam esse fatetur: & in quibus-
dam eam adeo patere, ut ignem candelæ, pres-
sione aeris ex ore clauso *per tubam Eustachianam*
in aurem externam, extinguere potuerint: seque
vidisse virum, qui fumum tabaci, integri tubuli
tabacalis ore sensim attractum, per aures rursus
emiserit; atque hunc virum optimo auditu gavisum
esse.

Z 4

De hia-
tu Ri-
vini in
mem-
brana
tympa-
ni.

- (a) Dissertat. de Auditus vitiiis, fig. 1. & 2. lit. b.
(b) in Anthropologia sua fig. 13.
(c) In Anatom. sua primæ editionis cap. de Aure. In
titra vero hujus libri editione exiguum tantum hoc loci
fuisse aperturam, eamque *valvula* esse testam.

esse. In cadavere virili se membranæ hujus c
midium apertum deprehendisse; virum tamen
non fuisse surdum. De alio refert, fide tamen
Dn. S. *Andree*, quod ei totum tympanum ulce
re destructum, atque ossicula auditus ejecta fu
rint, & tamen auditum non sublatum esse. Sc
haud meminit, hoc in una, an in utraque fu
rit aure: si enim hæ læsiones in una tantum fu
runt, altera adhuc audire potuerunt. Mihi con
tra notum est, auditum lapsu horum ossiculorum
omnino sublatum esse. Ceterum & *Munnicks* (a)
& *Valsalva* (b) asseverant, se quoque foramen
Rivinianum aliquando vidisse; licet posterior
hunc locum indicare videatur, quam *Rivinus*.

Quod ad me attinet, lubens fateor, me neque
illam aperturam certo videre, neque reperiri
potuisse; licet in quamplurimis humanis & be
stiarum auribus, magna industria, variisque ex
perimentis, in illas inquisiverim. Asservo etiam
adhuc tales membranas ex cadaveribus humanis
in situ naturali constitutas: quæ vero integerr
ma sunt, nullamque vel minimam aperturam
neque in loco a *Rivino*, neque a *Cbeseldeno* in
dicato, in eis deprehendere possum. Novi et
iam, Cl. *RUTSCHIIUM* & *RAVIUM*, exercitatis
mos quondam anatomicos, aperturam talem in
tympani membrana sæpius, sed frustra, investi
gasse.

Vidi quidem quoque jam dudum hominem,
haud pridem adhuc *Helmstadii* militem, qui fa
tum tabaci lex ore per aures transmittere potue
runt; verum hic ex ulcere auris, ille ex verber
ibus vehementibus, quæ puer acceperat, su
sus factus erat: idcirco suspicandum, ipsorum
tympani membranas ruptas fuisse. Nullum ve
ro ad-

(a) Lib. de Re Anatomica.

(b) De Aure humana.

ro adhuc, auditu valentem, qui hoc præstare posset, invenire potui: licet multi fuerint, etiam sæpe inter Medicinæ studiosos in usum illius exercitissimi, qui hujus experimenti gratia hoc sæpius, omni conatu, tentaverint. Certum hinc esse existimo, *hunc meatum sive hiatum, si detur, non in omnibus adesse*; verum potius in plerisque abesse: alias plures repertum iri, qui illud perficere possent. Interea tamen, quia quidam (qui tamen paucissimi sunt) id præstare valent, uti nonnulli scriptores testantur; *illum hiatum non omnino negandum esse censeo*. Attamen optandum est, ut Anatomici adhuc diligentius in hanc rem inquirent, donec veritas & constitutio ejus melius pateat.

Percepi quidem ab Auditoribus quibusdam R. I. NI, clarissimum hunc virum hiatum illum demonstrare solere setæ porcinæ appellatione ad locum supra indicatum, ejusque per membranam tympani transmissione; oculis vero eum observare haud posse. Tentavi quidem idem experimentum eadem methodo, setæque transmissio quoque successit. Verum semper dubius hæsi, et adhuc hæreo, utrum seta per naturalem meam transierit; an potius per tam tenuem membranam novam aperturam fecerit: experimentum enim sine notabili quadam pressione mihi non successit; quali etiam aliis in locis membranam tympani perforare poteram.

Idem prorsus, quamplurimis experimentis hunc finem institutis, convictus mecum sentit laudatus Cl. *WALTHERUS*, dissertatione docta de *membrana tympani*. (a) E contrario celeb. *TELMAYERUS* existentiam hujus hiatus perpetuam non solum vindicandam, verum etiam ejus facilem inveniendi rationem, in aure vitulina, no-

(a) Quæ Lipsiæ prodit An. 1725. 4.

vo scripto, novaque figura docendam nuper sibi sumsit. (a) Attamen nondum mihi contigit adesse felix, ut tam facile stylum, sicut ille asseverat, transmittere potuissem. Ex adverso observare mihi videor, locum hujus hiatus in figuris *Teichmeyer* & *Rivini* non unum eundemque indicari. Quam enim ille in *Anthropologia* dedit figuram, cum *Rivini* convenit, dum hiatus in area, ut vocant, majore tympani repræsentatur. In figura VII. vero, quæ *Vindiciis* addita est, in area minori exhibetur. Deinde si hiatus hic semper, vel saltem sæpe adesset in homine, quæro, cur non multi fumum tabaci vel aerem per nares efflare queant: cum tamen hi homines sint adeo rari, imo rarissimi. Plures habeo rationes, quæ contra perpetuam hujus hiatus existentiam pugnant, quas vero hic proferre nimis prolixum foret.

De offi-
culis
auditus.

(61*) ad pag. 168. *Occasione numeri officulorum auditus* notandum hic adhuc esse putamus, CL. *TEICHMETERUM* in laudata modo *Anthropologia* sex officula in unaquaque aure numerare, & præter illa quatuor, vulgo recenseri solita, adhuc duo alia ex vitulis describere, figuraque 14 & 15 ea repræsentare. Horum primum, *lenticulare* ab ipso vocatum, malleo & incudi instar officuli sesamoidei interpositum, iisque per ligamenta junctum esse, ad articulationem hanc firmandam, ad instar patellæ, affirmat. Alterum sive sextum officulum ad finem tendinis musculi stapedis hære, musculumque hunc, non in caput stapedis, ut vulgo perhibetur, sed officulo huic *ovatae figure* stapedis *lateraliter* annexo inferi: hocque jam a *VESLINGIO*; alterum verum a nemine adhuc observatum esse.

Illud,

(a) *Vindiciæ* quorundam inventorum suorum anatomicorum, *lenæ* 1727.

Illud, quod lateri stapedis adhæret, in vitulis facile reperitur, atque id non solum *Bilsius* (a) & *COVPERUS* (b) jamdudum delinearunt; verum illud etiam semper meis Auditoribus demonstravi. Quia vero in homine nullum horum adhuc reperi, ea hucusque inter officula auditus misi. *SCHELHAMMERUS* quidem in brutis etiam ejusmodi officula observavit (c), numquam vero in homine. Quid denique de *quarto officulo*, *orbiculari* dicto; sentiendum sit, jam supra 68. indicavi. Si enim epiphyfes pro peculiari-
us ossibus numerare velimus, tunc os femoris non unum esset os, sed quinque constitueret.

Teichmejerus nuper his adhuc novum, tanquam optimum officulum addidit, *triangulare* ob figuram ipsi dictum, quod quoque in vitulis se repperisse docet, & quidem in pariete, ut ait, sinusitatis ossis mastoidei, cui crus incudis brevis & crassius, tanquam basi sive hypomochlio sisteret (d): monetque simul, hoc os difficile, & non nisi in costis organis deprehendi, & loco moveri posse. *DOUGLAS* denique etiam de alio adhuc officulo auris loquitur (e), quod nonnulli in tendine musculi mallei, quem *inter-
m Eustachii* vocant, observarunt. Hoc vero tantum extremum a longo illo canali, cui inhæret, ruptum esse putat, quod tendini illi forte forma subinde adhæreret. Ceterum quod *Alex. CHILLINUS* primus de mallei & incudis ossibus scripserit, licet forte inventor non fuerit, monet *Cl. MORGAGNIUS*, (f) quia alii vulgo iis, iisque recentioribus inventionem tribuunt.

(62*)

(a) In specim. anatom. ubi auditus organi anatomem ex-
cet, mihi pag. 17.

(b) Myotom. reform. fig. X.

(c) De Auditu, pag. 44. & seq.

(d) In Vindiciis modo citatis, pag. 22.

(e) Myographia, pag. 27.

(f) Epist. anat. l. n. 92.

De Si-
moncel-
lil di-
tribu-
tione
nervi
audito-
rii.

(62^{*}) ad pag. 170. Quia liber hic, in quo singularis hic nervi auditorii reptatus describitur his in regionibus, & forte multis in aliis, extra Italiam, rarus est, imo & a MANGETO adhuc in Theatro anatomico omissus est, hinc Libroribus curiosis, eisque, qui desiderio forte faveant in hanc rem uberius inquirendi, integræ descriptionem, latine utcunque versam, hic adjungere, & quia adhuc spatium aliquod Tab. II. aderat, figuram quoque sub numero 21. addere placuit.

Titulus libri est, LETTRES DE G. DESNOYES Professeur d' Anatomie & de Chirurgie de l' Academie de Bologne : & de MR. GUGLIELMINI, Professeur de Medecine & de Mathematique a Padoue, de l' Academie Royale des Sciences, & d' autres Savans, sur differentes nouvelles decouvertes. A Rome MDCCVI. in 8. In quo pag. 260. MASTICHELLIUS, Medicus Romanus, in sequenti modo nervum auditorium describit. Per nervorum auditorium, qui e medulla oblonga proveniunt, ingrediuntur foramen ossis petrosi; postquam portio dura a molli recessit, hæc per exiguum foramen, quod linea centralis cochleæ format, transit, & inde per exiguum foramen exitum, quod a basi recta sursum ascendit. Postea in parte superiori non solum parva illa foramina, sed haud conspicua, quæ VALSALVA indicavit, repertiuntur; verum adhuc meatus quidam, in quem seta immitti potest, per quem via libera datur portioni molli, formam filamentum adeptæ, quæ accipitur in principio sicut in centro suo, atque in progressu prolongatur, se ita inflectit, sicut in circumferentia quadam, & per cavitates spirales cochleæ de qua jam diximus. Postquam vero descendit ad finem basis, transit per parvum foramen in vestibulum. Hic vero hæc substantia mollis & nervum muco quasi quodam involvitur, & diversis inflexio-

tionibus sensim progreditur ad arcus usque labyrinthi; ubi assumens iterum formam filamenti molliis & nervei, mox intrat orificium angustum minimi canalıs, & transeundo per hujus cavitatem credit per proprium orificium parvi canalıs; & postquam transit per hanc cavitatem, egreditur inde magno orificio ejusdem arcus. Hinc ingreditur orificium proprium parvi canalıs; & egreditur rursus ex orificio communi hujus arcus, per quem de novo intrat in canalem magnum, & egreditur iterum ex orificio proprio, tandemque ex osse petroso exit per unum foraminum illorum, quæ transversim in vestibulum hiant, atque in cranium reverendo, se in cerebrum insinuat; ubi vero dum penetrat, in ramos se expandit, seque multis exivis ramulis jungit, sicuti alias parvæ ramificationes venosæ atque arteriosæ, in dura matre, in cerebri superficie superiori, & circa glandulam pituitariam. Ut vero circuitus hujus nervi facilius intelligi queat, en adjectam figuram, (nobis hic Tab. II. fig. 21.) quæ eum seorsim ab ossibus liberatum exhibet: ut inde videri queat, quomodo per has cavitates transeat. Hæc est descriptio hujus nervi, cujus mirabilem circuitum SIMONCELLIUM, Chirurgum & anatomicum Romanum, detexisse perhibet MASTICHELIIUS; in quo præcipue demonstrare volunt, nervi auditorii portionem mollem per cavitates cochleæ & labyrinthi neque in forma membranæ, (ut vulgaris est opinio,) neque in forma Zonarum, quemadmodum VALSALVA vult,) excurrere, verum in forma filamenti nervei, mollis, quod tandem ad cerebrum revertitur. Præterea vero tribuit, SIMONCELLIUM hanc aliasque curiosas observationes de aure brevi peculiari libro editurum, figurasque jam æri incisas esse. Quod tamen, licet jam An. 1705. promissum sit, hactenus, quantum novi, nondum factum est.

Def-

Descriptio quidem hujus nervi sine dubio multis obscura videbitur, licet magnam in ea Gallico vertenda adhibuerim industriam; verum in Gallico quoque adeo obscura est, ut patet cos esse existimem, qui mentem scribentis recte intelligere queant. Denique notamus *Camerrarium* in Dissert. Taurinensi X. hanc *Simoncelli* inventionem impugnasse: quæ propterea, si libet, evolvi potest.

De tuni-
cis
arte-
riarum.

(63*) ad pag. 171. In præcedenti hujus libelli editione tres tantum, ut olim numerarunt, descripsi arteriarum tunicas: posterioribus vero inquisitionibus reperi, quinque minimum in arteriis numerandas esse, quæ in majoribus arteriis & præsertim trunco arteriæ magnæ, satis manifestæ ac distinctæ sunt; facileque deprehendere possunt ordine, quo illas descripsi. In extrema multa conspiciuntur vasa sanguifera; altera ex multis plexibus retiformibus constat, & in varias lamellas dividi potest: quam tamen o homogeneam substantiam tantum pro unica numero. Tertia est tenax & firma membrana, a *tendineam* substantiam accedens: qua ablata, tunica densa, crassa, ex fibris manifestis muscularibus quamplurimis, circuli vel annuli in modum arterias ambientibus, composita, quæ quoque ob crassitudinem in diversas lamellas facile dividua est. Quinta denique & intima, fibris annularibus carneis subiecta, *nervæa* appellatur. Quod vero ad *muscularem* speciatim attinet, in diario quodam, quod quondam Halæ lingua germanica, titulo Bibliothecæ miscellanæ (vermischte Bibliothec) prodibat, in recensione compendii mei Auctores illius tunicam muscularem, partim auctoritate *Pechlini* & *Schelhammeri*, partim propterea negare voluerunt, quia requisita muscoli hic abessent, & quandoque arteriæ ossæ fierent; id quod contra naturam musculi-

alorum esset. *Schelhammerus* insuper putavit, arterias non vi, aut tunica musculari, sed *sola* *posarum subsidentiâ* constringi. *Analect. anat. Dissert. IX. & X.*

Verum cum intestinis aliisque partibus fibræ is longe tenuiores tunicam muscularem constituent, & pro musculari habeantur, atque motus & constrictio intestinorum huic intestinorum unicæ ab omnibus anatomicis, & quidem merito adscribatur; miror, quare arteriis, in quibus hæ fibræ carneæ annulares longe sunt manifestiores ac crassiores, variasque satis notabilibus subrubicundas lamellas, quod unicuique quotidie ostendere possum, constituunt, quæque longe manifestiorem ac fortiozem in propellendo sanguine constrictionis vim & motum exerunt, muscularem tunicam, ac requisitum musculi, quod in manifesta fibrosa substantia, & constrictionis vi ac motu consistit) denegare queant. Denique etiam nec hoc verum esse, quod pars musculosæ in osseam substantiam mutari nequeant, (præter ossicula sesamoidea, quæ hinc inde & in principio & in fine variorum musculorum sæpe deprehenduntur) ipsa dura mater, & recentiorum anatomicorum iudicio muscularis est, imo ipsa intestina, in quibus subinde ea substantia reperitur, satis evincunt. Deque auctoritati *Pechlini & Schelhammeri*, loco *aliorum*, auctoritatem *Morgagnii* summi anatomici oppono: qui in *Advert. II. Animal. dv. 38.* tunicam muscularem arteriarum non solum statuit, sed etiam ejus fibras annulares, contra *Mangeti* spirales, defendit. Adeoque *summe jure arteriis tunica muscularis tribui potest*; de re etiam conferri potest *LANCISIUS* de *pag. 95.* *DOUGLASSIUS* contra in *Dissert. Peritonæo* arterias tantum ex sola & unica tunica musculari constare vult, exterioresque reli-

reliquas tantum a tunica cellulari communi provenire existimat pag. 26.

De arteria
magne
divisione.

(64*) ad pag. 171. Multi quidem Anatomii & Physiologi dividunt *Arteriam magnam in truncum ejus ascendentem & descendentem*, eodem modo, uti vena cava dividitur. Verum alio modo se habet hæc arteria in homine. (a) Nam postquam tres circiter digitos transversos unius trunco surrexit, arcus in modum inflectitur retrorsum & simul deorsum pergit per thoracem atque abdomen: qui vero arcus a basi cordis donec descendat ex Morgagnii annotatione (b) septem circiter digitos transversos implet, vocaturque a loco inflexionis, versus inferiora *truncus aortæ descendens*, unde omnes arterie partium inferiorum. Ex arcus vero superior parte in homine tres usitatissime insignes rami sursum ascendant, quorum dexter deinde, modo citius, modo remotius a trunco, in subclaviam & carotidem dextram dividitur, medius vero carotidem sinistram, & tertium subclaviam sinistram constituit: quæ postea per totum caput & brachia distribuuntur. Aliquando, quod rarum est, *quatuor ramos ascendentes in femini cadavere reperi*: quorum duo extremi utraque subclaviam, duo medii vero binas carotides constituerunt: quod cor vasis his cera repletis adhuc in spiritu asservo (c). Rarissime vero unquam, *duo tantum rami, ascendentes in homine reperiuntur*, multo minus unus; quapropter aorta in truncum ascendentem & descendentem dividi nequit. In canibus quidem, vitulis, aliisque

(a) Vid. optima ejus delineatio in *Drakio Anthropol.* Tab. XX.

(b) Vid. *Michelott. de Separat. fluid.* pag. 104.

(c) Quatuor etiam ramos notavit ac descripsit ill. *B. gerus*, in *Act. Erudit. An.* 1698. pag. 295. qui vero a me differunt.

que bestiis plerumque unus insignis ramus ascendens observatur, unde error ille ortum traxisse videtur: cui tamen plerumque adhuc minor quidam ramus ascendens vicinus est. Neque *Cantii* nova horum vasorum delineatio (a) cum statu ordinario maximèque consueto convenit; cum duos quasi tantum ramos ascendentes exhibeat: alterum eumque priorem, solito majorem, (ex quo deinde subclavia dextra & duæ carotides) alterum a priori quam remotissimum, qui subclaviam sinistram constituit. Ego contra in omnibus, quæ a multis annis hujus distributionis causa examinavi, cadaveribus nullum cum hac delineatione conveniens deprehendi. Nam ramus, qui carotidem sinistram constituit, ut plurimum distinctissimo principio, ac fere in medio, inter primum & tertium prodire solet. Quare figuras *Verheyeni*, *Ruschi* (b), & *Drakii* (c) accuratiores iudico: licet hic divisionem subclaviæ & carotidis dextræ trunco nimis vicinam delineaverit. Attamen non quatuor exhibuit ramos, ut *Nicolai* vult (d), sed tantum tres. Carotidem enim dextram ex subclavia provenire, & ex figura *Drakii*, & ex ejus explicatione quam manifestissime agnosco.

(65*) ad pag. 171. *Cantius* libro sæpius citato, Tabulæ I. figuræ 2. explicatione, omnes anatomicorum de arteriarum carotidum divisionibus & distributionibus carpit figuras, & pro imperfectis declarat, aliamque novam substituit, quam forte perfectam credidit. Verum quantum & hæc a perfectione adhuc absit, facile illi agnoscent, qui vel leviter in vasis ope ceræ relendis exercitati sunt: illi enim norunt, ha-

De carotidum divisionibus.

A a

rum

(a) Impet. Anatomic. Tab. IV.

(b) Thesaur. anatom. IV. Tab. III.

(c) Anthropolog. Tab. XX.

(d) Dissert. de Direct. vasorum, pag. 24.

rum arteriarum distributiones per tempora faciem longe ulterius progredi, atque finem non habere, ubi ille fines fecit; verum temporale longe lateque per totam supremam capitis partem reticulatis anastomosibus distribui, atque cum arteriis alterius lateris coire. Ita & ea arteria, quæ genam ascendit, & quasi circa medium ejus minimis ramusculis terminaretur, delineatur, minime ibi finitur; sed hujus arterie insignis ramus per totam malam oblique versus oculi canthum majorem ascendit, partim orbitam ingreditur, iisque in regionibus multis partibus prospicit, partim ad frontem abit. Alius ejusdem arteriæ ramus notabilis, prius subdignus, per labra pergit, & arteriæ alterius lateris per anastomosisi jungitur: quæ arteriæ in cuspide labri leporini vel carcinomatis labri incisæ magno satis impetu sanguinem fundunt; quæ vero labra secundum *Cantii* figuram nullos arteriarum ramos haberent. Tacemus, ne nimis huiusmodi prolixi simus, alios hujus figuræ defectus, variasque eas variationes, quas circa primam carotidis divisionem sæpe observavimus, ab ea quæ a *Cantio* sistitur, longe diversas. Hic enim neque in arte vasa replendi satis exercitatus fuisse videtur; alias hæc faciei vasa melius repleta essent; neque forte sæpius hæc vasa replevit; aliter carotidis externæ & internæ situm atque flexiones non ita semper se habere, ut scribit, sine dubio monuisset. Quandoque enim, ut a *Drakio* delineatæ sunt, quandoque vero alia ratione flexæ deprehenduntur: quod illi facile invenient, qui has arterias sæpius apta cera idoneisque siphonibus implebunt.

De arteriis
vertebrali-
bus.

(66*) ad pag. 172. Arterias vertebrales a sulci claviis oriundas, per foramina, quæ apophyibus vertebrarum colli insculptæ sunt, ad cranium ascendere, omnes, quantum memini, docent,

cent, qui de his arteriis scripserunt, anatomici: atque sic per hæc omnium vertebrarum colli foramina has arterias transire tacite innuere videntur. Ego vero, quod adhuc a nullo notatum novi, in quamplurimis cadaveribus, in quibus arterias cera replevi, constanter deprehendi, has arterias non in infima vel septima colli vertebra, verum in sexta sive penultima foramina hæc ingredi; venas autem vertebræ e septimæ demum vertebræ foraminibus prodire. Quod eum in finem ab effectore corporis nostri factum videtur, ne, si arteria & vena per unum idemque foramen transirent, arteria dum valde dilatatur, venam comprimeret, atque sic progressum sanguinis in hac impediret. Quam ob causam etiam in cranio arteriæ & venæ præcipuæ non per idem foramen, sed per diversa transeunt.

(66**) ad pag. 173. An. 1729. in cadavere feminino, in quo arterias totius corporis cera repleveram, hoc inprimis notatu dignum indicavi, quod arteria axillaris dextra, statim ubi axillam deseruerat, atque ad brachium perenerat, mox in duos ejusdem magnitudinis ingnes ramos brachiales divisa esset: quorum alter per internum brachii latus versus cubitum, ut alias ex consueta naturæ lege fieri solet, pergebat, ibique postea easdem divisiones, eundemque per cubitum & manum progressum ac distributionem, ut alias, quando unicæ tantum arteriæ brachialis truncus adest, habebat; alter vero mox infra articulum humeri super muscolum bicipitem transibat, & in externo brachii latere, juxta bicipitem usque ad os radii, ac inde secundum hujus situm ad carpum & pollicem manus descendebat, arteriamque primariam, quæ in carpo apud ægros explorari solet Medicis, constituabat. Postea prope pollicem

De arteria brachiali.

varie divisus per anastomoses cum prioris in manu ramis jungebatur, qui deinde simul per manum & digitos, ut alias, ubi unica tantum arteria brachialis adest, fieri solet, distribuebantur. Inprimis vero notandum, quod ramus internus in brachio in interiori bicipitis latere alter vero in externo ejusdem latere ad cubitum descenderit, atque ambo demum in manu rursus manifestis ramulis fuerint conjuncti. Quales usus in chirurgica disciplina ex his in vulneribus Brachialis arteriæ periculosis, itemque in anevrysmatibus brachii curandis, deduci possint brevitatibus causa silentio hic prætermitto: quæ vero proluxius legi possunt in dissertatione, qua titulo observationum Medicarum An. 1730. Candidatus tunc Medicinæ D. Mæbius Helmstädt publicavit, pag. 18. atque solum hic monemus nunquam ob vulnus brachialis arteriæ brachium esse amputandum, ut alias sæpe factum est a chirurgis, antequam certe cognoverint, ligatura arteriæ brachium servari non posse.

De arteriis
œsophagicis.

(67*) ad pag. 173. *Arterias œsophagi* a paucis notatas atque indicatas esse, jam dudum monui: Nicolai (a) non nisi Ruyschium citat atque Drakium, qui parvulam arteriam ex aorta angulam abientem notaverit. Ego vero non semel, sed sæpius, duas, imo tres tales arterias distinctis principiis ex arteria magna oriundas vidi ac demonstravi, quæ cera repletæ erant.

De venis
vertebrales
in cranium.

(68*) ad pag. 175. *Venas Vertebrales ad cranium non ascendere*, neque sinus laterales adire, cum Villisio & Fallopio contra Vesalium, Riddleum & me modo laudatus Nicolai contendit. (b) Hoc verum esse concedo in illis cadaveribus in quibus foramina illa sive canales postapophysiales condyloideas ossis occipitis, (de quibus S. 20 dixi)

(a) Dissert. de Direct. vasor. p. 64.

(b) Ibidem p. 4.

dixi) sicut sæpius esse solet , clausa five coalita sunt . Quoniam vero hæc foramina in multis non clausa , sed aperta sunt , & in sinus laterales manifeste desinunt , in hisce cadaveribus , præsertim si per sinum duræ matris longitudinalem reliqui ejus sinus , & venæ inde provenientes , bene repleti sunt , per hæc foramina five canales venas vertebrales cranium ingredi , & in sinus laterales , prope exitum eorum e cranio , e inferere vidi . Qui huic experimento apta inveniet cadavera , & meo more procedet , hanc communicationem sine dubio inveniet . Insuper b iis , qui hanc venarum vertebraliū cum sinubus lateralibus , per canales indicatos , communicationem negant , rogo , ut alium horum animalium cranii usum ostendant .

(69*) ad pag. 176. Valvulæ hujus insignis prope cor in venæ cavæ trunco inferiori , (de qua iam pag. 176. nonnulla dixi) primam mentionem fecisse invenio *Cheseldenum* , in anatomes sua prima editione , quæ Londini Anno 1713. prodit , pag. 90. qui & ejus aliqualem delineationem cum publico Tab. IX. communicavit ; quam vero *Douglassio* adscribit , eamque *valvulam nobilem cavæ ascendantis* , (quo nomine *cavam inferiorem* hic intelligit) appellat . Sed in tertia hujus libri editione hanc tabulam , in qua hæc valvula delineata est , nescio quam ob causam , rursus omisit . Ad hanc vero valvulam designandam forte *Eustachii* Tab. VIII. fig. VI. quæ in opusculis ejus anatomicis An. 1565. Veterinariis impressis , curaque *Boerhaavii* An. 1707. Lugduni Batavorum recusus , exhibetur , *Douglassio* occasionem dedit : sed *Eustachius* eam non valvulam , sed *membranam* solum , *artificii & adirationis plenam* , appellat , quæ foramini venæ cavæ a jecore ascendantis , quamprimum hæc in atram auriculam degenerat , præfecta esset , di-

de val-
vula
Eustachii.

midiam partem, eamque anteriorem illius occuparet, & deinceps reticulum efformaret. (a) Dusu vero illius nihil addit. (b) Sed *Lancisius* in *Eustachii* tabulis, quæ deperditæ credebantur, atque Anno 1714. Romæ ab ipso editæ sunt, & speciatim in Tab. XVI., fig. III. explicatione hanc membranam quoque *valvulam* appellat, qua impedire credit, ne sanguis a jugularibus per superiorem cavam descendens nimio impetu arietet cum sanguine per cavam inferiorem ascendente. *Vvinslous* vero omnium optime hanc valvulam & descripsit & explanavit (c), eique *valvulæ reticulatæ Eustachii* nomen imposuit. Deinde elegantem ejus figuram lunatam atque reticulatam, situm, ac connexionem accuratius quam antea factum est, litteris consignavit: notavitque, ejus cavam partem sursum, convexam vero deorsum spectare. Præterea ostendit, eam investigando non anteriorem, sed posteriorem cavæ partem incidendam esse, alias eam non facile reperiri. Denique notavit, eam sæpius in adultis, ubi foramen ovale clausum, abesse; in infantibus vero, præsertim recens natis, & ubi alias foramen ovale apertum, optime conspicitur ac demonstrari posse: in primis si vasi aquæ pleno immittatur. Tandem, ut alia, quæ notata digna in docta hac dissertatione enarravit, brevitatæ causa præteream, docuit, eam ipsam non solum usum præstare, quem *Lancisius* ei assignavit; verum etiam, cum primis in fœtu nascendo (ubi maxime spectabilis) impedire, ne sanguis ex auricula dextra, aut vena cava superio-

(a) In lib. de vena sine pari adhuc paullo prolixiorem hujus membranæ descriptionem dedit.

(b) *Baubin* in theatr. anatom. append. Tab. VIII. fig. 1. eandem *Eustachii* figuram exhibet, sed usum quoque hujus membranæ silet, neque adhuc valvulam eam appellat.

(c) In Histor. Acad. Reg. An. 1717.

periori in cavam inferiorem remeare possit : quibus vero de rebus *Vvinslous* uberius legi meretur : qui etiam eodem loco de usu foraminis ovalis & membranæ huic oppositæ, quam contra vulgarem sententiam cum *Meryo* valvulam esse negat, varia profert, quæ uberiori inquisitione digna sunt.

(70*) ad pag. 178. Nervos vel ex medulla cerebri oblongata, vel ex spinali oriri, Anatomici consentiunt ; verum ex quibus speciatim medullæ partibus aut locis proveniant, valde discrepant : quemadmodum ex *Vvillifio* & *Vvieusse-rio* de Nervis, *Duverneo* de organo auditus Tab. XI. *Ridleo* de cerebro, *Morgagnio* & *Santorino* variis ex locis, aliisque videri potest. Quod autem non tam erroribus nonnullorum auctorum, ut facile quis suspicari posset, quam naturæ varianti potissimum adscribendum esse censeo : quæ in origine, distributione, & plexibus multorum nervorum, ut rectissime *Morgagnius* sentit (a), incerta & varia est. *Santorinus* quoque, subtilissimus nervorum perscrutator, postquam in veris eorum originibus detegendis multum operæ impendit, atque digna de iis proposuit, tandem tamen fatetur (b), origines nervorum cerebri non constantes esse, sed variare. At speciatim de vero nervi intercostalis principio ex recentioribus anatomici præstantissimi dissentiunt. Plerique cum *Vvillifio* ex pari quinto, & sexto simul eum deducunt, atque certos furculos huic, illi, alios adscribunt. *Eustachius*, ut ex tabulis ejus constat, ex solo sexto eum accersit : cum quo maxime consentit *Morgagnius* : qui nunc unico, nunc duobus, nunc tribus furculis, ejus exitum a sexto, nunquam vero satis luculenter

De ortu
nervorum
in-
certo,

& spe-
ciatim
interco-
stalis.

A a 4

a quin-

(a) Adversar. anat. II. p. 75. 76. & Advers. VI. variis in locis.

(b) Observat. anatom. pag. 63. ad 67.

a quinto se vidisse affirmat. (a) *Lancisus* hunc nervum, neque a quinto, neque a sexto pari deducit; sed peculiarem ac distinctum exortum a protuberantiis scilicet cerebri, ubi cum pedunculis glandulæ pinealis adnectuntur, ipsi tribuit. (b) *Covvperus* de certa & constanti origine ejusdem nervi nihil affirmare voluit. (c) *Santorinus* tamen rursus a pari quinto, & sexto cum *Vieussenio*, & *Ridleo* ortum ejus se vidisse testatur. (d) Ego quoque eum nunc ex sexto, nunc ex sexto, & quinto simul prodiisse observavi, quæ omnia originem ejus variare satis evincere videntur: cujus tamen variæ ac diversæ observationis tam nervorum cerebri in universum, quam speciatim intercostalis, etiam aliqua causa esse potest summa exilitas & mollities horum nervorum prope exortum, ob quam, dum cerebrum eximitur, & præparatur, facillime rumpi, distrahi, aut alio modo lædi possunt.

De pari
cerebri
decimo.

(71*) ad pag. 180. *Vvillifsum*, qui primus decem cerebri paria nervorum numeravit, omnes fere Medici & Anatomici recentiores hucusque secuti sunt. Mihi vero jam dudum visum est, decimum sive ultimum ejus par immerito ad nervos cerebri relatum esse: primo, quia non a cerebro, aut medulla oblongata oritur, sed a spinali medulla: quæ vel sola ratio, si alia deficerent, sufficere posset, ut Anatomici illud mecum e numero nervorum cerebri eximerent, & ad medullæ spinalis, cujus vera & genuina soboles est, nervos transferrent. Accedit deinde, quod hoc par non per foramen quoddam capitis sive cranii, quemadmodum cerebri reliqua, transeat: imo ne quidem inter cranium &

pri-

(a) Advers. anatom. VI. pag. 30.

(b) *Morgagn.* Advers. V. pag. 105.

(c) Ut *Morgagnius* monet Advers. VI. p. 30.

(d) Observat. anatom. pag. 66.

primam colli vertebram, ut *Vvillifus*, alique
um sequentes voluerunt; verum inter primam
emum, ut ego saltem observavi, & secundam
colli vertebram: nullum enim unquam nervum
inter cranium & primam vertebram prodeuntem
manifeste conspiciere potui; ipseque *Vvillifus*,
bi de paris hujus exitu differit, tam dubitan-
ter de illo loquitur, ut merito inde suspican-
um, ipsum hunc nervum inter occiput & pri-
am vertebram exeuntem luculenter haud vi-
sse: & idcirco, quia ejus ortus & egressus om-
no est extra cranii limites, nullo modo pro
ervo cerebri, sed pro spinalis medullæ primo
aberi debet. Doctissimus, mihiq; amicissimus
Morgagnius concedit quidem, hoc par non e me-
lla cerebri oblongata, sed ex spinali oriri,
que per cranii foramina exire (a), differre
tem in eo a spinalibus reliquis cum *Ridley*
firmat, quod non, ut hi, antico & postico
iatur principio: & propterea illud spinalibus
n accensendum esse arbitratur. Verum *San-*
tinus non solum mecum sensit (b); sed accu-
tissimis etiam inquisitionibus se recepisse asse-
rat, illud, sicuti ceteri nervi spinales, tam e
iori, quam posteriori medullæ spinalis facie ori-
: hinc quia sic omnia spinalium nervorum,
lla vere cerebri requisita obtinet, merito et-
n ad spinalis medullæ illud referendum esse
nseo.

(72*) ad p. 204. Cum in uvula ejusque mus- *Demus-*
lis examinandis occupatus essem, sæpius & ul- *culo ce-*
nis inquisitionibus perpetuo observavi, e radi- *rato-*
apophysis tenuis processuum pterygoideorum, *staphi-*
quam *Santorinus* haud inepte *corniculum* horum *lino.*
processuum appellat) seriem fibrarum carnea-
m, satis conspicuarum, oriri, quæ conjunctæ
exi-

(a) Adversar. anatom. VI. pag. 30. 40.

(b) Observat. anatom. pag. 69.

exiguum musculus constituitur, cujus tendinis expansio definit in velum palatinum, versus vulæ partem superiorem, quam una cum aliis musculis sursum trahere valet. Si & ab alia exigua hæc musculosa pars pro musculo agnoscatur, quemadmodum revera esse videtur, *rato-staphilinus* vocari posset, eumque aliquo modo Tab. VIII. fig. 38. littera ll. indicavimus licet a cælatore satis bene non sit expressus.

De mus-
culis
interco-
stali-
bus.

(73*) ad pag. 208. Quadraginta quatuor musculos intercostales perperam numerari cum *De-lincurtio* sustinet *Schelhammerus*. (a) „ Fibræ „ enim intercostales, ait, non ita dispositas esse, ut musculos seorsim exhibere queant; sed permixtas esse, ut decussatim inter se discurrant. Alterum enim horum ordinem a costæ superioris parte inferiore externa ad costæ inferioris partem superiorem internam oblique decurrere; alterum contrario modo a costæ superioris parte inferiori interna versus inferioris partem superiorem externam interdum oblique. Hujus fabricæ autem rationem esse, quod non tantum sursum; sed etiam retrorsum costæ trahendæ erant, quo thorax amplior fieret. Atque hoc modo thoracem follem exhibere, qualis nullus exstaret, nisi quædam, nec ab artifice quoquam fabricari posset. Itaque tantum XXII. intercostales numerat: quibus solis cum subclaviis elevationem thoracis adscribit. *Gouey* vero contendit, omnes musculos intercostales non nisi unicum constituisse musculum, qui in plures tantum ventres distributus esset (b): quod singulari experimento probare vult, quo unum latus thoracis, vel e homine, vel alio animali resectum, coquit, donec nec carnes ossa relinquere queant: ita enim tum

(a) *Analect. anatom. dissert. IX. N. 46.*

(b) *Veritable Chirurgie, pag. 189.*

am hoc extensum carneum, ut partem continuam, a costis detrahi posse docet: quod iis forte aud displicebit, qui musculos multiplicare non nant.

(74^{*}) ad pag. 215. S. 337. Musculorum lumbricalium quatuor ut plurimum in quavis manubesse solent, quorum singulis singulo digito, & supra indicavimus, inseritur; attamen subinde, ut in aliis, ita & hic varietas observatur. Prehendi enim An. 1730. *quinque in una manu*, ab eadem origine, tendinibus nimirum musculi profundi in manu, unico principio proveisse, quorum primus in latus externum digiti indicis pollicem respiciens, secundus in latus externum digiti medii, tertius in latus internum ejusdem digiti, quartus in latus externum digiti annularis, V. in latus internum annularis inferebatur. Quatuor posteriores in primam phalanga jungebantur tendinibus interofforum; primus vero tendine suo peculiari per latus externum digiti indicis excurrebat, & in extrema demum hujus digiti phalanga finiebatur. Præterea notavi, *digitum minimum ab his lumbricalibus hoc in cadavere nullum obtinuisse musculum*, ut alias fieri solet: contra digitus medius, & annularis quilibet duplici musculo lumbricali gaudebat, index verotantum unico. Circa usum horum musculorum moneo, cum vulgo tantum pro flexoribus, & quidem primæ phalangæ haberi soleant, eos 1. quando uni solum latri digiti, ut vulgo fit, inferuntur, & quidem plurimum pollicem respicienti, *eos etiam adducere posse ad pollicem*, atque sic interoffeos iungere; 2. quando ad extremam usque phalangam currunt, eos non solum primam, verum etiam reliquas phalangas movere; 3. quando duo digito utrinque inferuntur, eos non solum extensionem hujus digiti multum promovere, ejus-

De musculis lumbricalibus profundo & sublimi.

que

que vim augere posse, præsertim si hoc in du-
bus digitis mediis unius manus, ut hic factum
est, contigit: verum etiam eos ad digitos fac-
lius citiusque & adducendos, & abducendos a
invicem multum facere posse; id quod Musculus
ad digitos citius elegantiusque movendos ma-
gnam aptitudinem præ aliis conciliare potest.
Denique notamus, musculos *lumbricales proprios*
unum tantum esse musculum, in quatuor vel quinque
que caudas desinentem; dum unico tantum prin-
cipio, eodem fere modo, ut sublimis, & pro-
fundus incipit: circa quos vero ultimos muscu-
los, *sublimem & profundum* adhuc monemus
quod tendines eorum in manu sæpissime *tendines*
fibris inter se hinc inde connectantur; imo & non
nulli harum fibrarum musculi profundi in pri-
mam digitorum phalangam inserantur, atque
& his movendis famulentur.

De mu-
sculis
interos-
seis
Wins-
lowi sen-
tentia.

(75 *) ad pag. 216. S. 337. Haud sine ratio-
ne Clariss. Winslous monet (a) plerosque An-
atomicos musculos interosseos non satis accurate
propterea tradidisse, quia hi in myologia demon-
stranda ut plurimum postremi sint, ubi Anatomice
ci, diuturni laboris tunc pertæsi, ad finem pro-
perent, atque sic hos musculos (quod sæpe
verissimum est) raro debita cura perscrutentur
sed obiter, & quasi per transennam tantum
stendant atque indicent: quemadmodum etiam
ipse Covvperus, diligentissimus alias musculorum
perscrutator, satis jejune ac imperfecte eos ac-
scribit: atque hinc factum esse, ut eorumque hanc
accurate a plerisque traditi fuerint, adeoque me-
liorem eorum descriptionem, quæ hic sequitur
Winslous suppeditavit. Divisionem eorum in ex-
ternos & internos, numerumque senarium pro-
bat; verum ratione insertionis, & usus cum vul-
gari

(a) Memor. Acad. Reg. An. 1720. p. 114.

rari descriptione non convenit. Nonnullos enim, it, affirmare omnes externos esse abductores; internos vero adductores: alios contrarium de his statuere. *Winslous* vero contendit, externorum duos priores, (indici scilicet maxime vicinos) unico digito medio utrinque inferi, ad ipsum adducendum, & abducendum, tertium vero annulari digito datum esse, eumque abducere, atque sic ostendit, interosseos externos non nisi duobus digitis (medio scilicet & annulari) inservire.

Internorum vero primum, indici; alterum, annulari; ac tertium minimo digito committi: ut omnes hos digitos abducerent. (a) Unde apparet, interosseos internos, ex *Winsloi* sententia, digito medio non famulari, sed solum reliquis tribus.

Ad eundem fere modum, sed prolixius, nobis anatomicus, & speciatim subtilissimus musculorum sector, *Jacobus Douglas*, in sæpius laudata sua *Myographia* (b), hos sex musculos lingua Anglicana describit. Quia vero hic liber ex Britanniam raruserat, cum tertia vice commendandum hoc ederem, nec a *Winsloo* multisque aliis anatomicis tunc adhuc visus videbatur, eius descriptionem breviter, quantum potero, latine versam hic annectere volui: quæ tamen jam

*Sententia
Douglasii.*

(a) Quomodo vero interosseus internus, si situm considero, digitum minimum abducere possit, (abducere enim anatomicis hic est, a pollice removere sive abducere) ego his non perspicio. Monuit me *Cl. Winslous* hoc abducere vitium esse typographicum editionis Amstelodamensis; in editione Parisiensi, quam non vidi, adducere scriptum esset, quod itaque & hic lectores monere volo, quia sensus manifestus & perspicuus est. Attamen non omnes interni sunt adductores, sed solum secundus & tertius. Tab. I. fig. II. E. & F. primus vero D. indicem a pollice abducit.

(b) Quæ jam Londini A. 1707. prodit in 8.

jam etiam in versione totius libri, quæ A. 17 Lugd. Bat. prodit, legi potest.

„ Recte eos dividi, ait, in externos & internos. Externos replere spatium totum (sive spatia) ossium metatarsi in dorso manus: internos vero, quibus nomen interosseorum minus, esse competeret, oriri ex anteriori parte ossis metacarpi, quæ volam respicit, eosque unice vola manus, non in dorso ejus conspicuos esse, cum contra externi utrinque appareant. *Primum interosseum internum* oriri partim tendineum, partim carneum, a tota parte anteriori ossis metacarpi indicis, inter caput & condylum ejus, & a parte superiori ossis metacarpi digiti medii, atque inferi ei latere indicis, quod digito medio proximum. Alterum, eumque *externorum primum*, ortum habere a parte maxima lateris externi ossis metacarpi, quod medium digitum sustinet, & aliquo modo tendinem ab ejus parte interiori, proxime sub capitulo ejus, inde per latus medii, quod indicem spectat, se extendere. (a) *Tertium, externorum secundum*, per alterum digiti medii latus porrigi, atque implere hoc spatium, quod inter ossa metacarpi huius & annularis digiti, ex quibus oritur, interiacet, implere. *Quartum, internorum secundum*, ad latus digiti annularis, quod medium digitum respicit, pertinere, oriundum a tota facie anteriori ossis illius metacarpi, cui annularis insistit. *Quintum, externorum tertium*, per alterum huius digiti latus excurrere, & interstitium, inter ossa metacarpi annularis & auricularis, in quibus ortum habet, replere. *Sextum, atque internorum tertium*, extendi per illud digiti auricularis

(a) Magis perspicua & facilis forte fuisset Auctoris descriptio, si prius omnes internos, & deinde externos descripsisset, aut vice versa: ordinem vero ejus hic mutare nolui.

s latus, quod annularem spectat, atque partim tendineum, partim carneum, a tota illius ossis metacarpi facie anteriori originem trahere.

Omnes hos musculos utriusque generis transverse monet sub ligamento quodam transverso cartilagineo, & tunc quemlibet duos formare tendines: horum alter mox superiori, & laterali parti primi internodii inferatur, alterum vero valde ampliari, ita ut maximam partem primæ juncturæ, cui tendo extensoris adhæret, tegat; postea eum paullo angustiores rursus fieri, si appropinquet ad secundum internodium, ubi ultimo nominatus musculus finiatur, atque oblique secundum longitudinem hujus ossis excurrere, & que ipsum in parte superiori articuli extremi, postquam prius cum socio suo alterius lateris se junxerit, finire.

Quod ad usum ex mente *Douglasii* attinet, peritus; si tendines longi agant, ultimum articulum extendi, atque sic eos supplere vicem extensoris magni, qui hic deficeret; sin vero breves, digitos ad latera moveri, id est, vel ad pollicem adduci, vel ab eo abduci. Hactenus *Douglasii* horum musculorum descriptio, cum qua *Winsloii* & nostræ posteriores observationes plurimum conveniunt.

Ubi tamen adhuc monere volo, interossea externa primum Tab. IX. fig. 1. A esse adductorem digiti medii, alterum B abductorem eodem digiti, & tertium C abductorem annularis: e contrario internorum primum indicis esse abductorem Tab. IX. fig. 1. D; alterum E, abductorem annularis, ac tertium F, adductorem auricularis. Præter hos usus vero dum interossei simul agunt cum sublimi & profundo, actionem digitorum promovere, sed si agunt cum extensore communi, digitorum extensionem augere, imo & læso extensore communi, eos alii.

aliquo modo extendere possunt; sin vero quibet solus agit, unum digitum ad alterum adducere vel abducere potest.

*Stock-
husii
senten-
tia.*

Quod Clar. *Stokhusius*, ut in tertia editio pag. 319. significavi, tres externos & sex internos interosseos stabilire voluerit, neque cum *Douglasii* aut *Winsloi*, neque cum nostris ultimis observationibus convenit; videturque mihi, sum partes illas externorum, quæ in manu peculiare musculi apparent, pro distinctis musculis habuisse, quæ tamen revera tantum partem externorum sunt, ut in antecedentibus satis indicatum est.

(76*) ad §. 351. & 352. Quintum extensor digitorum pedis longi tendinem §. 352. a non indicatum, nonnulli & cum primis etiam *Cl. Douglassius* hic omittit, & pro peculiari musculo habet: quorsum vero sit referendus, quantum ego recordor, non indicat. Quando igitur peculiari musculo sit habendus, quemadmodum hoc apte fieri potest, referendus erit ad flexores pedis; eique nomen dari potest *peronæi lici majoris* sive *longi*: nam oritur a fibulæ medio supra peronæo aulico vulgari sive minori ligamento interosseo, & subinde in duos vel tres tendines dividi solet, qui in os metatarsi extremum sive quintum inferuntur, atque pedem sustinent. Attamen sæpissime cum extensore longi sive communi digitorum satis arte cohæret in principio, ut pro parte ejus a multis fuerit habitus. *Vesalius* quidem Lib. II. Cap. IX. ut *Cruvperus* Myotom. pag. 219. indicat, eum pro musculo pedis agnovit; attamen eum ad extensorem communem longum retulit, & inde separat noluit.

*De renibus
vesiculis.*

(77*) ad pag. 236. Ad celebrem observationem Cl. *LITTRII* (a), de renibus fœtus vulgari.

(a) In Acad. Reg. Scient. An. 1705. descripta.

culosis, ex quibus multi renum substantiam, in statu secundam naturam, vesiculosam esse certe probatam ac demonstratam esse credunt, præter ea, quæ pag. cit. 236. & seqq. jam diximus, adhuc sequentia hic monemus.

1. Eos renes quasi monstrosos fuisse, & a statu naturali quam alienissimos, ex hoc etiam patere existimamus, quod ureteres non solum prope renes, ad pollicis latitudinem prorsus solidi sive coaliti; sed etiam ipsius pelvis parietes concreverint deprehensi: id quod statum prorsus præter naturam, inusitatum, atque extraordinarium fuisse aperte demonstrat.

2. Licet LITTRIUS octo conclusiones sive sequelas ex hac observatione deduxerit, ad glandulosam renum substantiam probandam: unam tamen, eamque præcipuam, consequentiam omis-
 sisse mihi visum est; quæ ex hac observatione rectius forte elici poterit, quam reliquæ omnes. Nimirum, fœtum humanum urinæ excretionem in utero, ideoque & tunica allantoide non adeo absolute indigere, sicut multi putarunt. Si enim hic cœtus sine urinæ excretionem ad perfectionem pervenire potuit, (fuit enim fœtus novem mensum, & justo tempore, partu difficili, in quo mortuus est, exclusus,) cur non etiam in aliis fieri poterit? Pelvim enim & ureteres adeo solidos & coalitos fuisse affirmat LITTRIUS, ut nullum liquidum subtilissimum, neque aerem, neque flatum, multo minus, ut ipse confitetur, urinam, tanquam liquidum crassius, transmittere potuerit. Ideoque ex his nulla urina ad vesicam, sedum ad urachum & allantoidem vel pervenit, vel pervenire potuit. Sed existimat LITTRIUS, (a) ex vesiculis horum renum, liquido urinæ simili repletis, probari, secretionem urinæ in fœtu
 B b fieri:

(a) Vid. Hist. Acad. Reg. 1718. pag. 40.

feri: adeoque foetum vel mejere urinam in allantoidem, vel eam per urachum in allantoidem demittere. Neutrum vero horum inde sequi existimo. Ratum quidem esse opinor, aliquam quidem secretionem fieri in renibus foetus; verum an hæc adeo larga sit, ut urina in vesica, ureteribus, & pelvi contineri omnis nequeat, nondum demonstratum est. Si ex adverso consideramus renes a LITTRIO delineatos, facile judicare licet, omnem liquidi, in vesiculis his renalibus contenti, copiam unciam unam non excessisse; nihil vero plus in hoc foetu secretum esse, coalitus pelvis atque ureterum manifeste evincit. Cum vero foetus humanus facile majorem adhuc copiam urinæ in vesica, satis pro magnitudine corporis magna, ureteribus, & pelvi utraque continere queat, atque ille foetus ad perfectionem, sine ullo alio vitio in corpore præter illud in renibus, pervenit, & tamen urinæ in allantoidem excretio facta non est, constare liquido inde posse opinor, hanc excretionem in allantoidem in aliis foetibus quoque non absolute esse necessariam. Hinc, donec urachus in foetu humano longe frequentius reperiatur pervius, & tunica allantois certius clariusque demonstretur, quam adhuc factum est, eam in foetu humano, ut partem ordinariam, non admitrendam esse censeo. Vias enim, quæcumque illæ fuerint, per quas in hoc foetu LITTRII omnis, excepta pauca, ea copia, quæ in vesiculis renalibus erat, excerni potuit urina, etiam in aliis foetibus urinæ exitum concedere posse non est dubitandum. Deum enim ab urinæ onere quod in vaccis profecto ingense est, feminas, ut pote duobus tantum pedibus incedentes, liberare, & urinam cum sanguine per arterias umbilicales ad sanguinem & renes matris transmittere sive remittere voluisse, ne gravidæ ob-

ven-

ventrem alias nimis magnum & protuberantem
 am facile cadant, aut procidant, mihi præter
 modo dictam rationem, etiam ex coalitu illo u-
 eterum, si non absolute demonstratum, tamen
 valde verisimile esse videtur. (a) Denique non
 omnia, quæ LITTRIUS de his renibus scripsit,
 tam clare atque perspicue in eis apparuisse, si-
 cuti ab autore loco prædicto repræsentata sunt,
 ex Cl. FONTENELLII, Academiæ Regiæ Scien-
 tarum a secretis, monito sive epicrisi constare
 potest; dum scribit (b), *Quam tumidi sæpe disten-*
etiam fuerint illi renes, in quibus D. LITTRIUS
observationes has suas fecit; tamen maximam par-
tem rerum singularium, quas in eis notavit, non
si microscopio detegere potuit. A MATERO vero
observatio notabilis ex adulto refertur (c), ubi
tam substantiam renum vesiculosam deprehen-
t: quæ longe majoris mihi momenti videtur,
quam Littriana.

(a) Ita quoque sentire cognovi *Molinettum* dissert. anatom.
 tholog. lib. VI. cap. 7. p. 304.

(b) Hist. Acad. Reg. Scientiar. An. 1705. pag. 58. & 59.
 at. Amstelodamens.

(c) Colleg. anatom. pag. 73.

M O N I T A Q U Æ D A M

circa Splanchnologiam Garengéoti

Chirurgi Parisiensis.

CUM Compendii hujus quarta editio jam magna ex parte Altorfii impressa esset, a manus meas pervenit liber Anatomicus Gallicus conscriptus, editusque a Chirurgo, alias diligenter, & in observationibus aliorum colligendis haud minus perindustrio, cui Garengéot nomen, Titulo *Splanchnologie, ou L'Anatomie des viscères avec des figures originales, tirées d'après les cadavres &c.* a Paris 1728. in 12. cumque hunc libellum evolverem, mox præter spem in varia loca, ubi author rudi ac indecenti ratione mihi, quia tamen ipsum nunquam læsi, alii que magnis viris insultavit, (a) variasque levissimas hallucinationes, si modo tales vocandæ sunt, tam acri ac mordaci scribendi ratione mihi expressè probrat, quasi errores maximi momenti commisisssem. Agnovisse quidem ipse videtur, cum haec scriberet, se rudius quam par est, æquique rerum arbitri probare possint, me aggredi: attamen ut petulantiam suam excuset, me Verheyen quoque durius tractasse perhibet, sed nunquam id probat. Ego vero hic prolixius me cavillatione & falsa accusatione hac purgare nolo, quia ipsi auctores Diarii Gallici Parisini, qui antea mei amici non erant, me jam dudum cum interprete illo Gallus, qui compendii hujus editionem II. Anno 1724. Parisiis gallice edidisset, ab hoc imputato crimine liberum pronuntiant.

(a) Quam ob rationem diu ejus distributio & venditio ut percepit, Parisiis prohibita fuit.

ciarunt, meque neque Verheyenum, neque ullum alium offendisse affirmarunt (a).

Unde apparet contra veritatem, adeoque magis animo hæc a Garengéoto dicta esse, eumque sic parum juris me tam inique aggrediendi habuisse.

Quoniam vero tam immodeste mecum egit, qui ipsum nunquam offendi, sed potius in Chirurgia mea, jam quartum edita, sæpius laudavi, dum multa præstantiorum Chirurgorum inventa & observationes, quæ alias facile perirent, notavit & edidit, pauca circa librum hunc ipsius, quem & thraſonico fere modo extollit, monebo: si enim omnes ejus errores hic commissos indicare & debita censura perstringere quis vellet, magnus liber conscribendus esset, itaque tantum nonnullos indicabo, & a falsis quibusdam accusationibus me purgabo,

Primo in præfatione alibique multis in locis vehementer gloriatur de multis novis suis inventis & emendationibus errorum anatomicorum

Bb 3

om-

(a) Confer. Journal des Scavans An. 1725. mense Julio, ubi ita scribunt: *Le Traducteur ménage peu Messieurs Verheyen & Heister; il fait entendre, que le livre du premier est plein de fautes, & que dans celui de l'autre il y a de la passion. Il va même jusqu'à dire que le procédé de M. Heister l'égard de M. Verheyen est peu seant à un homme judicieux & modéré. Il ajoute, que cet Auteur s'est laissé aller à des Emportemens ridicules.* Cependant on ne trouve dans le livre de M. Heister rien d'offensant contre personne. Ce n'est point, comme le veut persuader le Traducteur, pour crier Verheyen, que M. Heister a composé sa Préface; c'est seulement pour perfectionner les Oeuvres de cet Anatomiste, c'est pour avertir les Etudiants en Médecine de ne pas croire, que cet Auteur a négligé, de ce qu'il a ignoré, & de ce qui a été découvert après sa mort. M. Heister dit, que Verheyen a fait honneur à l'Anatomie, il s'applique à lui rendre justice, & à lui conserver toute l'estime, que lui est due; mais en même tems il tâche de se mettre à couvert du soupçon injuste de n'avoir fait que ce que Verheyen a fait.

omnium eiam recentissimorum, nullo sæpe excepto, & quomodo hæc non ab aliis nec ex libris, sed ex solo naturæ libro desumerit, cum alii plerique recentiores tantum ab aliis libris suos descripserint. Attamen ut in Chirurgia sua tanquam compiler, quod alii nobiles Chirurgi præstiterunt ac invenerunt, fere tantum descripsit, paucas vero vel nullas operationes magni momenti a se peractas; ita & hanc anatomiam partim ex meo compendio, partim a meo discipulis, qui a me Parisios abierunt, cum quibus amicitiam coluit, hausit; partim a præstantioribus anatomicis Parisiensibus, uti Cel. V. Winslow aliique forte brevi probabunt, desumpsit atque pro suis inventis & observationibus edidit.

Quod ex meo compendio didicerit & in suum librum multa transtulerit, inde suspicari licet quod cum errores quosdam mihi exprobraret, errores editionis secundæ mei compendii maximam partem aggreditur, quos ego ipse in tertia editione, quæ circa principium Anni 1727. adeoque diu ante splanchnologiam ipsius prostabat meo studio ac labore correxeram. Hic vero temulans, ac si tertiam compendii mei editionem non vidisset, (cum tamen Anno 1727. jam abire de Parisiis prostraret) varia tanquam errores a se primum deprehensos redarguit, quos ego diu antea ipse correxeram, exemplo originis musculorum abdominis aliorumque. Quæ an non ipsæ pro plagio sint imputanda, aliis dijudicandum relinquam.

Deinde de ingenti errorum copia, qui adhuc in recentissimis scriptoribus anatomicis essent ipsumque ad novam anatomiam edendam impulissent (*le grand nombre des fautes, qui sont dans les ouvrages, qu'on nous a donné jusqu'ici*) conquiretur, paucos vero alicujus momenti producit. Præterea quod recentissimi auctores anatomici

mici (ubi nullum excipit) scripta sua in musæo confecerint, nec eadavera inciderint, sed alter alterum tantum descripserit, se vero solum (ut gloriatur) eadavera incidisse. Quam injuriosius vero sit in tot tantosque ævi nostri anatomicos Ruyschium, du Vernejum, Valsalvam, Covvperum, Lancisium, Morgagnium, VVinsloun, Douglassium, Cheseldenum, Santorinum, Cantium, Albinum, VValtherum, me, aliosque, qui ingentem cadaverum numerum secuerunt, quilibet, qui hos viros eorumve scripta novit, fatis cognoscit, hujusque cavillatoris maledictionem atque ostentationem abunde intelligit.

Quando igitur ingens magnorum illorum errorum copia est ostendenda, pauci revera sunt, quos profert, qui alicujus essent momenti, qui vel ad theoriam vel praxin medicam aut chirurgicam illustrandam aut emendandam aliquid faciant, & qui non in compendii mei editione tertia jam emendati fuissent; aut quos indicat, vel errores non sunt, vel saltem tam exigui, ut ab eorum ignoratione nullum damnum in arte Medica aut Chirurgica sit metuendum. Ita & inter additamenta ejus multas res quam levissimas producit, ut verbi gratia, peritonæi quædam productiones, quibus intestina & viscera abdominis hinc inde connectuntur; quas quidem ego & sine dubio antea alii recentissimi anatomici haud ignorarunt; verum ob levitatem rei, magnamque earum varietatem in variis cadaveribus nihil de iis dicere voluerunt. Nam quis adeo stultus erit, qui credat, omnes anatomicos recentiores, qui tam sæpe intestina & viscera abdominis examinarunt, & ex cadaveribus rescuerunt, eas productiones vel ligamenta peritonæi non vidisse: cum manifestissima sint, & necessario rescanda, quando viscera auferre volumus. E contrario loco levissimorum additamen-

torum aut emendationum, quas profert, & quas (ut forte brevi tempus & anatome a Cl. *Vinslovio* exspectanda docebunt) ab aliis, tanquam auctoribus, provenerunt, gravissimos novos errores, suo Marte productos, committit, qui sua gravitate longe superant levissima ejus addita-
menta aut emendationes; quemadmodum nonnullos mox proferemus, priusquam indicavero quod etiam *figuras recentiorum anatomicorum in universum*, nullo etiam excepto, contemnat, suas vero thrasonico prorsus modo (*en veritable Gascon*) ad cælum usque extollat; cum tamen multi errores iique enormes & anatomico non concedendi in eis deprehendantur, qui in vilissimis etiam figuris evitati partesque rectius ab aliis exhibitæ sunt.

Accedit, quæd, quemadmodum quæ bona & nova scribit, vel ex ore & demonstrationibus præstantiorum Anatomicorum Parisiensium, quos, ut audio, continuo & laudabili alias conatu audit, præsertim Cl. *Vinsloi*, vel ex meo compendio anatomico hauserit, ita & figuras suas bonas, ut ipse fatetur, ab alio obtinuit, & quidem a D. *Stockhusio*, Medico nunc Magdeburgensi, in vicinia nostra præstantissimo, Germano, & discipulo quondam meo, qui veram partium constitutionem, situm, & fabricam prius apud me vidit & didicit (id quod *Garengeot* astute silet). Unde manifestum est, quam parum de iis ipsi gloriandum, & cui e contrario honor & gloria, quæ ex bonis figuris proveniunt, jure debeatur.

Attamen quam accurate etiam hæ figuræ delineatæ fuerint (novi enim, quod D. *Stockhusius* artem delineandi accuratissime calluerit) tam enormes tamen errores chalcographi & Chirur-
gi nostri vitio post abitum *Stockhusii* ex Gallia commissi sunt, quos ne observare quidem valuit

Garengeot: dum neque eos corrigi curaverit, neque in descriptione aut explicatione indicaverit. Hinc quam accuratus sit in suis inquisitionibus & observationibus (id quod tamen sæpe stat) facile judicari licet, aperteque ostendit, cum hos errores non agnovisse, vel eos, quod inde est, approbasse, ut exemplis nunc nonnullis probabo.

In omnibus figuris, ubi peritonæum indicatum, ut Tab. VI. VII. X. ita exhibetur ac si ex his robustis muscularibus, quæ in musculorum lineatione tam robustæ & crassæ non pingunt, constaret. Deinde eas ita exhibet, ac si ab umbilico, tanquam centro, ut radii circuli ad ambitum excurrerent; id quod vero in cadaveribus, vel in libro naturæ, ut vulgo loqui amatur, quod tantopere se perscrutatum esse sæpe gloriatur, nunquam ita reperitur, nullumque librum anatomicum novi, in quo peritonæum non melius delineatum exhibeatur, quam in Garengeoti: dum ut tyrones norunt, pellucida est membrana, in qua vel nullæ fibræ, vel saltem eas eorum cursus observantur.

In præfatione præterea perhibet, quod omnes testes in situ naturali melius repræsentet, quam fecerint: & speciatim pag. 163. affirmat, ad Tab. V. *venas & arterias umbilicales ita exhibeat*; id quod tamen falsissimum, quemmodum quilibet primo intuitu cognoscet, præsertim quia funiculo alligato ex situ naturali rectæ a pictore de industria sistuntur, quod vecavillator pro situ naturali venditat. Unde tantum accuratatione & judicio valeat in vero partium determinando, facile intelligitur.

Unus vero omnium errorum anatomicorum primus, qui unquam in figuris commissi sunt, Tab. X. fig. 2. conspicitur, ubi ureteres ambo exhibentur, ac si in partem anteriorem & superio-

periolem vesicæ infererentur; cum tamen semper in partem posteriorem & inferiorem vesicæ ingrediantur, quemadmodum quivis tyro chirurgiæ aut anatomix novit; ceterique anatomici semper repræsentarunt, lectoremque hujus erroris ne quidem admonet. Verum tunc quamplurimis encomiis suas super omnibus figuris reliquas ita extollit, ut nihil supra; ceterum tamen verissimum sit hanc insertionem urinarum nusquam pejus, sed ubique longe melius exhiberi.

Quamobrem etiam miror, quod nonnulli Chirurgorum illorum, a quibus encomia, libro præmissa, emendicavit, ipsius figuras promissæ tantopere laudaverint, nullusque ingentes huiusmodi errores vel observaverit vel indicaverit.

Porro in præfatione jactabundus asseverat, *in hoc libro non de vulgaribus omnibusque rebus agere velle; sed tantum de illis, quas non cognitas esse credat.* Mox tamen pag. 5. cit: *nous sommes obligez de convenir, que l'homme est composé des parties solides & des parties fluides.* Ex quibus constat, Ipsum credere, nihil vulgare, sed rem minus cognitam esse, quod homo constet ex partibus solidis & fluidis; ceterum tamen hoc semper nihil fuit notius aut vulgari-
tius. Atque ejusmodi res tot in hoc libro occurrunt, ut quis integrum libellum scribere posset, si vulgares omnes ejusmodi res notare et perstringere vellet, quæ pro novis & minus cognitis, dum vulgaria tradere non vult, scribit.

Deinde pag. 9. perhibet, *ipsius descriptionem vasorum lymphaticorum eorumque cursus diversum esse a descriptionibus reliquorum scriptorum:* tamen ego quidem nihil notatu dignum deprehendi, quod non vel ipse, vel alii jam deduxerimus.

Pag. 10. & pag. 11. *vasa secretoria & vesiculae glandularum* omnes intus indutas esse villosa substantia (*d'une espece de duvet*) : id quod vero in libro naturæ, unde suas observationes omnes desumisse sæpius jactat, demonstrare non poterit. Ut enim vesiculæ glandularum, saltem a plerisque demonstrari non possunt, prout in Splanchnologia mea jam dudum evici, & plerique anatomici experientia convicti hodie affirmant; a multo minus villosa substantia in eis ostendi potest. Verum Garengéot potius hic agit, quod anatomicis recentioribus vehementer exprobrat; mirum scribit aut describit, (*il copie*) quod illi hac de re jam dudum ex ingenio scripserunt, nunquam viderunt, neque adhuc in libro naturæ demonstrari potuit. Unde manifestum est, quod incerta, dubia, & falsa, quæ alii jam scripserunt, hic ab ipsis vel eorum fide descripsit, licet ea non viderit, nec demonstrare valeat.

Pag. 15. affirmat, *ungues pedum* ad ambulandum inservire, *pilosque* parvos tubos esse insentes, quod vero non probat, sed rursus ex aliis tantum descripsit: ita *quod pili sub cute proveant*, ego aliique jam dudum scripsimus, aliarum multa similia.

Pag. vero 16. postquam partes simplices, eas vulgo *similares* appellant, descripsit, & inter has etiam, pilos, ungues, ossa, medullam c. retulit, tandem pergit, *quod omnes expositas partes similes conjunctim omnis generis parconficerent, quæ viscera dicerentur*.

Sed scire vellem, ad quod viscus constituentium pili, ungues, medulla, & ossa concurrant? quod ad artus componendos faciant, novi; quod vero ad conficienda viscera naturaliter concurrunt, anatomicis adhuc ignotum est, atque magicis inventis chirurgi nostri adscribendum erit,

erit, quæ, quia non sunt, etiam demonstrare nequeunt.

Pag. 17. In *divisione trunci* sequitur ac describit (quod adeo detestatur in aliis) methodus vulgarem anatomicorum, qua illum in tres civitates tantum dividunt, abdomen scilicet, thoracem, & caput, collumque prorsus omittit: ut vero jam diu, consentientibus eruditis, monuit illam vulgarem trunci divisionem mancā & imperfectam, adeoque malam esse; quia collum sic excluditur, quæ notabilem trunci partem eamque quartam merito constituit: quemadmodum non solum gravissimi anatomici, (a) Virorum & liber naturæ, in quo facile a quolibet etiam ex vulgo ac sine artificio demonstrari potest, optime mecum consentiunt: nam collum sine confusione neque ad caput, neque ad thoracem commode referri potest.

Pag. 18. *Ex medulla oblongata cerebri novem paria nervorum in cranio provenire docet*, quod hoc ejus esset inventum, aut primo ab ipso notatum: cum jam dudum ego, & forte primus contra vulgarem anatomicorum sententiam, quæ post *Willisium* scripserunt, & decem cerebri nervos esse docuerunt, sustinuerim, novem tantum cerebri seu medullæ oblongatæ in cranio esse nervos, ubi vero me silet, & pro sua inventionem venditare videtur.

Pag. 28. Ita & inter nova sua inventa refert cum alii hoc non doceant, *quod rotula os sit foramina cordis præditum*. Qui vero librum naturæ inspicit, parum cordiforme in hoc esse deprehendit, veteresque anatomici a figura, quam in ea agnoverunt, rotunda illam potius rotulam dixisse verisimile est.

Ibidem sustinet *digitorum pedum ossa in quorum*
digi-

(a) Conf. compend. anatom. nostr. N. 264.

igito esse tria, ut in manu; cum tamen in virili ætate & senibus non solum in pollice, verum & in digito minimo, imo & in huic prommo in libro naturæ sæpe tantum duo & rari tria ossa distincta reperiuntur.

Pag. 30. & 34. *negat corpus reticulare subcutaneum Malpighii*, illudque imaginarium esse proferat. Verum non solum in recentibus cadaveribus, sed etiam in præparatis meis hoc semper ostendere possum.

Pag. 50. Contendit, maximam partem anatomicorum velle, *corpus reticulare hoc in Æthiops album esse*, quod vero falsum est: quia plures anatomici ab hoc colorem Æthiopum nigrum deducunt, & ut videre est in comp. anatom. eo N. 197. Præterea Cl. D. TREVVIUS, medicus Norimbergensis, in commerc. litterar. universal. An. 1731. pag. 141. non solum hoc corpus reticulare novis observationibus confirmat, verum & Cingarorum sive Ægyptiorum colorem fuscum, quemadmodum nigrum Æthiopi inde manifeste deducendum esse evincit.

Pag. 56. *cuticulam & ungues a cute sine diuturnâ maceratione separari non posse existimat*; adeoque hanc methodum inter nova ejus, dum vulgaria proponere non vult, referre velle videtur. eorum methodo a me N. 196. indicata, aqua licet fervida, intra momentum temporis ferri possunt; id quod tantus anatomicus, qui verba sua censura in omnes recentiores anatomicos invehitur, scire, vel saltem non dissimulare deberet: quia hæc methodus prompta, alia vero quam ipse ut novam forte & pecuniarem proponit, valde diuturna ac tædiosa est. Ibidem *ventrem esse affirmat*, ubi cutis in corpore sit valde tenuis: quæ tamen in palpebris & exiputio longe est tenuior, quam in abdomine. nec hoc verum est, quod hoc affirmat, cu-

tem in ventre multo esse duriores, quam omnibus aliis corporis in locis.

Glandulas cutis miliares negat pag. 59. qui primus esset, qui hoc observasset, & hoc in compendio meo nunquam legisset. Unde appareat ipsum hanc sententiam, meo nomine suppressam ex meo libro hausisse.

Quamplurima adhuc essent monenda, imo Academia stabulum expurgandum, si omnes chirurghi nostri lapsus proferre & refellere vellem; & negotio autem expediendo nunc non vacat. Unicum tamen silentio prætermittere non possum, quod inter præcipua sua inventa refert, imo forte pro præcipuo habet, atque Academia Regiæ scientiarum Parisiis jam An. 1726. tanquam rem novam magnique momenti, in qua omnes anatomici hucusque erraverint, multa cum jactatione & ostentatione obtulit, & de qua adhuc in hoc libro pag. 384. nimis, quam par est, magnifice loquitur; quod tamen inventum re vel valde exiguum est, vel prorsus nullum. Consistit autem in eo, quod *Arteriæ intercostales dextrarum vel trium costarum superiorum non a subclaviis arteriis, sed ex trunco aortæ descendentes proveniant*; adeoque costas superiores arterias suas non a subclaviis, sed ex ipso trunco aortæ descendentes accipere. Quamvis vero ego negare nolum, hoc quandoque & forte sæpius accidere, quia natura in vasorum minorum distributione ut vel tyrones Anatomes non ignorant, vehementer variare solet; tamen non solum certe asseverare possum, me sæpissime superiores arterias intercostales ex subclaviis, ut omnes antiqui anatomici scripserunt, & sine dubio multi ex illis viderunt, prodeuntes observasse; verum & præstantissimus subtilissimusque Lipsiensium Anatomicus August. Frid. Waltherus occasione hujus novæ Garengoti sententiæ summo studio quæ-

que

in has arterias inquisivit; eas vero non ut
Garengéot perhibet, invenit, sed ut ego aliique
stantissimi anatomici eas descripsimus, ex
claviis prodeuntes notavit: quemadmodum
peculiari *exercitatione de vasis vertebralibus*,
An. 1730. edita, perspicue descripsit, at-
gravem simul huius Chirurgi dictatoriam
suram, qua omnes tam veteres, quam recen-
tes anatomicos magni erroris alto supercilio
usat, dum pag. 398. ait; *Parmi plusieurs er-
rs, que j' ai remarquées dans les livres d'A-
omie tant anciens que modernes, la naissance
arteres vertebrales est une des plus conside-
es &c.* ex libro naturæ refutavit p. 3. & 4.
tque hæc hac vice, licet quamplurimi adhuc
rsint, loco speciminum errorum huius chi-
gi sufficere possunt. Diu sane dubius hæsi,
m quicquam ejus insultationibus regerere vel
ondere, an generoso contemptu eas negligere
lebeam: quia prudentes facile ejus alios la-
endi petulantiam cognoscerent: attamen ne
s sibi sapiens videatur, aut impune hoc sibi
e existimet, ut alios bene meritos atque ad-
bene merentes viros tam temere laceffat,
deat, ac contemnat, nonnulli amicorum
etiam existimationis & nominis servandi
sa, ut nonnulla tantum responderem, sua-
nt; id quod tandem etiam hic effeci. Quod
ro imposterum non modestius se geret, pro-
non deerunt, qui acriori lixivio caput ipsi
unt. Nunquam me infallibilem credidi,
o minus rem anatomicam omnino a me ab-
am, exhaustam, aut ad umbilicum dedu-
esse credidi, ut falso mihi tribuere vide-
sed potius probe gnarus fui, multa in ea
e corrigenda, emendanda, & supplenda su-
te. Neque etiam unquam ægre tuli, quan-
ri docti & honesti vel errorem aliquem a
me.

me commissum, vel aliquid adhuc addendum quod vel novum esset vel antiquum, privatis litteris aut publicis scriptis decenti modo me indicarunt; sed potius grato animo hunc faciem rem erga me & bonum publicum agnovi, novas compendii mei editiones, si facto per examine in cadaveribus verum id esse deprehendi, intuli, auctoresque illius laudavi. Cuius vero tam amarulento, mordaci, ac sarcastico scribendi genere utitur in eos, qui bene meruerunt & a quibus nunquam læsus fuit, ut Garengi facit, male agunt, atque merito gravi reprehensione digni sunt. Quare in fine tandem ipsi commendando verba gallica D. VERNAGE, Censoris Regii Parisiensis, quæ leguntur in ejus Testimonio D. Chevalieri libro (a) de usu & differentiis Venæsectionis præmissis, quæ ita se habent: *En écrivant le but doit être d'éclaircir les doutes & découvrir la vérité; & non pas de briser par des ironies piquantes.*

(a) Cui titulus, *Reflexions critiques sur le Traité de l'usage des différentes saignées, principalement de celle du pied* à Paris 1730. 12.

E X P L I C A T I O

TABULARUM ET FIGURARUM.

Placuit compendio huic anatomico figuras aliquot addere observationum anatomicarum ovarum, quæ in aliis Anatomicis, si duas forte excipias, nondum occurrunt; ceteræ vero ex nostris sunt observationibus.

E X P L I C A T I O

T A B U L Æ P R I M Æ.

fig. 1. Demonstrat *Malleum* ossiculorum auditus, perspicuitatis causa naturali paullo majorem, ex homine, cum apophysi sive *processu*, ut vulgo vocant, *Raviano*.

a, Est capitulum mallei.

b, Ejus manubrium.

c, Apophysis minor.

d, *Apophysis Folii*, vulgo dicta *Raviana*, sive longissima.

Item malleus mox adjungitur, microscopio deinceps, ut omnia clarius in conspectum prodeant: ubi literæ majusculæ *A B C D* idem indicant, quod in figura minori.

Notandum vero hic esse censemus, hanc *apophysin*, sive *processum Ravianum*, nobis ita sæpe apparuisse, ac si verum os non esset. Nam flexilis & elasticus sæpe est, quemadmodum & alii ostendunt, ut spinæ piscium sunt tenuiores; ita, si in apice aliquo modo prematur, paululum flectatur & cedat; sin vero a pressione restitatur, apexque relaxetur, apophysis hæc in pristinum statum se restituat: qualem flexibilem cultatem in aliis ossibus veris, si costas exci-

pias, non facile offendimus. Deinde eum receptum, imo quandoque jam aliquo modo induratum, acu circa apicem in varias fibrillas, sicut capilli in apice sæpe finduntur, sive ut tendinem paullo induratum, dividere potui; id quod primum apud Clar. RUYSCHIIUM vidi: sic, ut tendinis quasi indurati illius muscoli, qui illi inferitur, sive spinæ piscis quandoque magis obstatineat naturam, quam veri ossis. Quosdam tales processus, quos microscopio examinavi, circa angulum *E*, cartilagineos esse deprehendi; reliquum vero ab hoc angulo *E*, ad *D*, magis rursus osseum, & quasi peculiare os sive epiphysis esset, inveni: hincque forte fieri credo, quod tam facile in extractione mallei abrumperetur: ita ut hucusque multi præstantissimi Anatomici, præsertim illi, qui speciatim de Auditui & Auræ humana nostris temporibus egerunt, ut *Duverney*, *Schelhammerus*, *Valsalva*, & *Vieujsens*, imo & *Mangetus* in magno suo theatro anatomico, hanc apophysin (vel, si placet, epiphysin) prætermiserint, aut non invenerint. Hoc vero tanto magis mirandum, quia non solum a *Cæcilio Folio*, equite, in schediasmate quod inscribitur, *Nova auris internæ delineatio* & *Venetis An. 1645.* impressum est, (quod vero post compendii mei alteram editionem primum vidi) descriptus atque delineatus, licet forte non satis accurate, cernitur; verum etiam in *Bartholini Anatom. Reform.* pag. 713. exhibitur. Nullum tamen adhuc vidi, quod cum horum delineationibus recte conveniret.

Quoniam præterea primæ meæ de hoc figura perspicuitatis causa naturali factæ sunt majores eadem tabula 1. fig. 1. * alium adhuc malleum cum hoc processu. ex infante recens nato, magnitudine, ut in his est, naturali, diverso situ bis repræsentari curavi, ubi hujus processus Fo-

iani verus situs, figura, ac simul aliqua varietas apparet.

Fig. 2. Exhibet *ossis femoris partem inferiorem*, cum duobus ossiculis sesamoideis, ab aliis anatomicis, quantum memini, nondum delineatis.

A, denotat os femoris.

B, condylum internum.

C, condylum externum.

D, *Os sesamoideum majus*, in fovea notabili condyli externi; quod vero in alio cadavere longe majus vidi.

E, *ossiculum sesamoideum minus*, in condylo interno; quod non nisi rarissime, prius vero frequentius reperitur.

Fig. 3. Denotat *ossiculum sesamoideum majus*, seorsim, ex fovea sua condyli externi exitum.

Fig. 4. Demonstrat *ossiculum minus* condyli interni.

Fig. 5. Indicat *ossa digiti auricularis*.

A, est os metacarpi, cui auricularis insistit.

B, prima hujus digiti phalanga, sive nodus.

C, os sesamoideum; quod inter juncturam ossis metacarpi & digiti auricularis sæpissime reperitur: quod non raro majus, quam hic repræsentatur, tendini muscoli abductoris hujus digiti inhærens, offenditur.

Fig. 6. Ostendit *partem dextram ventriculi humani, flatu extensi & exsiccati*, cum *valvula*, sive membrana ampla, circulari; quæ in dextro ejus orificio, *Pylorus* dicto, sæpe reperitur.

A, A, Pars dextra ventriculi flatu exsiccati.

B, B, B Pars intestini duodeni aperti & reclinati.

C, D, *valvula pylori*, sive membrana circularis,

laris, pylorum intus ambiens, in naturali situ, prout in hoc cadavere sese obtulit, satis ampla.

E, Apertura in ventriculum.

Ex hac figura patet primo, *pylorum non habere situm horizontalem*, sicuti vulgo a VVILLISIO in Pharmac. rationali, VERHEYEN in Anatomia sua, aliisque repræsentatur, sed obliquum; & quidem sic collocatum, ut a latere dextro C, oblique deorsum versus latus sinistrum D, descendat. Deinde, *quod pylorus non solum ex serie fibrarum circularium, orificium huius ventriculi ambientium constet*, ut vulgo describitur; sed plerumque ex satis ampla membrana duas, & quandoque tres lineas lata: unde fit ut orificium hoc bene impleat, egressumque rerum crassiorum, e ventriculo, magis remotur. Sciendum tamen hanc membranam pyloricam sive valvulam non in omnibus hominibus tantam amplam reperiri; verum in quibusdam minorem, & vix unicam lineam mathematicam tantam esse. E contrario vero, eas quoque non raro dari *ad huc ampliores*; asservoque ventriculum in quo talem habet magnitudinem & figuram, uti litera F & G repræsentatur: ubi regio C angustior; regio F, vero, quæ superior, amplior existit.

Denique monemus, similem figuram, quam cum Ephemerid. Naturæ Curios. Cent. communicavimus, culpa Chalcographi inversa ibi fuisse repræsentatam. Tab. II. fig. 4. pag. 158.

EXPLICATIO

TABULÆ SECUNDÆ.

Fig. 7. Exhibet portionem intestini ilei, cæci & coli, cum valvula coli Baubini. Exhibemus

mus quidem jam varias hujus valvulæ delineationes in Dissertat. nostra de *valvula coli*, præsertim duas diversitates notabiles ibidem Tab. II. fig. I. & II. repræsentavimus; alteram scilicet, ubi partes hæ omnes sunt amplissimæ, alteram vero, ubi angustissimæ. At hic exhibemus unam, quæ medio modo se habet & prout frequentius reperitur: ut sic, non obstantibus hisce varietatibus, cognoscatur, *dari revera semper valvulam coli Baubini*, ad finem ilei, eamque non esse fictam aut suppositam, ut *Cl. Bianchus* in Mangeti Theatro anatomico orbi literato persuadere voluit.

AA Est *intestinum ileum*, oblique, ut plerumque solet, ad crassum ascendens, & in sinistrum hujus parietem se insinuans.

B Intestinum cæcum.

C Processus ejus vermiformis, sursum reflexus.

DDDD Pars cæci & coli aperta, ut interiora conspici queant.

E Apertura valvulæ, sive intestini ilei in crassa.

G Valvulæ pars superior.

F Valvulæ pars inferior.

HH Membranae utrinque valvulam hanc (vel rectius valvulas has) sustentantes, quæ *ligamenta vel frenula ejus* appellari possunt.

III. Variæ valvulæ conniventes coli.

fig. 8. Ostendit *VASA LACTEA*, quomodo ea bis in cadaveribus humanis reperi. Conf. quæ de iis Nota (14*) dicta sunt.

AAA Pars intestini jejuni, cum rugis vel plicis suis leviter transparentibus.

BBB Copiosissimæ *radices vasorum lacteorum*; quæ longe plures hic in cadaveribus apparebant, quam pictor repræsentare potuit,

tuit, aut in canibus vulgo apparere solent, multas anastomoses conficientes.

CCCC Eorum reptatus quoque longe frequentior per mesenterium, frequentissimis anastomosis inter se communicantes, & partim in mesenterii glandulas se insinuant, partim glandulas transgredientes.

DDDD Majores hic inde glandulæ mesenterii: præter quas plures hinc inde minores aderant.

Fig. 21. Quam ob spatii commoditatem huc collocavimus, indicat *distributionem Nervi auditorii per labyrinthum*, prout in Epistola **NOVESII** sistitur pag. 208. Vid. Nota nostra (62*)

A, Nervus auditorius.

B, Ejus per cochleam in forma filamenti distributione.

C, Progressus per vestibulum.

D, Gyri per tres canales semicirculares.

E, Extremitas ad cerebrum rediens, & per illud multis ramulis distributa.

EXPLICATIO

TABULÆ TERTIÆ.

Fig. 9. Triplex sistit schema *tortuosi cursus* & *valvularum ductus biliaris cystici*, cum parte vesiculæ fellis, prout in diversis cadaveribus eum observavi.

AA Pars est vesiculæ fellis aperta.

B Exitus in ductum cysticum valde tortuosus.

C Ductus cysticus, instar funiculi contortus intus *valvulas spinales* obtinens.

Fig. 9. D Aliam ejusmodi demonstrat vesiculam fellis.

E Ejus

E Ejus exitus & inflexio quasi sigmoidea.

FF Ductus cysticus apertus, *valvulas spinales*, alio modo conformatas, ostendens, quam in figura priori.

Fig. 9. *G*, Rursus alia exhibetur vesicula: quæ *HH* Varias intus obtinet cellulas, & membranula transversas, rectas, obliquas; omnes tamen pro transitu bilis perforatas sive patentes: quæ quidem flatum, sed non stylum ad vesiculam admittebant. Conf. Nota (18*)

Neglectæ hætenus sunt a plerisque anatomicis hæ valvulæ; sed credo, si semper inquirantur, eas frequentissime observari, quia in plerisque cadaveribus, quæ a multis nunc annis dissecai, aliquid valvulosum, sed semper cum aliqua diversitate, ibi offendi. Idem nunc testatur *Bianchus* in *Historia hepatica nova*, qui has valvulas olim negaverit.

Fig. 10. Ostendit unam *Tubarum Fallopiarum* uteri, ex *DRAKII Anthropologia*, cujus vasa *mercurio* & *flatu* repleta erant; ad demonstrandum illorum progressum in altera alarum vespertilionum, una cum distributione reticulari venarum in parietibus tubæ, ejusque expansionum sive fimbriarum: quibus hæ partes in orgasmo venereo distenduntur, eriguntur, aptæque redduntur ad amplectendum ovarium sui lateris, tam pro semine masculino ab utero ad ovarium conducendo, quam ad ovum imprægnatum ex ovario ad uterum transmittendum.

A Pars est hujus tubæ, utero proxima,

B Extremitas ejus altera, quæ aliquo modo rursus angustior fit, antequam fimbrias suas emittit.

CC Fimbriæ, sive expansiones membranaceæ distentæ.

D Orificium hujus extremi distentum.

E Ala vespertilionis hujus lateris.

F Venæ & arteriæ ejus ab hypogastricis.

G Vasa, mirabile cavernosum sive reticulatum corpus in parietibus Tubæ conficientia.

Fig. II. Ostendit quoque **TUBAM FALLOPIANAM**, cujus venas mercurio in dissectione quadam publica quondam replevis in qua vero earum distributio longe alia & pulchrior apparuit, quam a **DRAKIO** delineata est.

A Est pars tubæ, utero proxima, filo ligata quia alias Mercurius ad uterum & vasa hypogastrica rueret, atque perfectam tubæ expletionem impediret.

B Extremitas altera: in qua

CC Fimbriæ, sive expansiones membranaceæ ad extrema ultima vasis minimis, conspicuis tamen, repletissimæ; quæ vero pictore tam pulchre omnia exprimi non potuerunt, quam visui se exhibuerunt.

D Osculum hujus extremi:

E Ala vespertilionis sive ligamentum inter tubam, & ovarium: quod primo aspectu vasis mercurio plenis erat refertissimum quæ vero rursus, donec pictor accerseretur, ex parte deplebantur; quia mercurius per foraminulum quoddam effluebat.

F Vena, cui mercurius injectus erat, a spermatICA uteri orta.

G Ejus divisiones majores.

HH Ramus insignis, cum tuba uteri quasi parallelus incedens, fere ut venæ intestinorum in mesenterio: ex quo ramo parallelo

II Rami plurimi tubam, fere ut vasa in intestinis adeuntes, eamque tam copiosis ramulis replentes, ut tota fere tuba ex meris vasculis confecta videretur: nam tam copiosa erant, ut vasa, quæ a RUYSCHIO in pia matre, corde, aliisque partibus, maxime vasculosis, variis in scriptis suis, repræsentantur; quæ tamen tubæ hætenus ab auctoribus fere absque vasis delineatæ sunt. Inde vero mirum non est, has partes, in orgasmo venereo, a copioso sanguine, in hæc vasa irruente, distendi & erigi posse: cum etiam ipso flatu aliqua ratione erigi queant.

g. 12. Demonstrat *hepar fœtus recens nati.*

AAA Hepatis ambitus.

BBB Pars hepatis ima, in qua variæ inæqualitates.

C Vesicula fellis.

D Vena umbilicalis, ab umbilico ad hepar unico trunco progrediens.

EE Sinus venæ portæ, in quem solum vena umbilicalis, aliter ac *Verhegen* scribit, uno trunco se inserit.

F Truncus venæ portæ resectus.

G Rami præcipui sinus venæ portæ per hepar distributi, hepate leviter abrafo demum conspicui.

H Truncus venæ cavæ.

II *Canalis venosus sive ductus venosus*, e regione ingressus venæ umbilicalis, ex sinu venæ portæ egrediens, & in venam cavam se inferens; qui in utero magnam, imo forte maximam sanguinis partem, per venam umbilicalem ad hepar fœtus allatam, ampla via in venam cavam & cor recta transfert; qui vero postea, fœtu nato, sensim concrevit. Hic canalis in Bianchi

chi Historia hepatica non delineatus peritur.

K Locus introitus venæ umbilicalis in solum finum venæ portæ, unico extremo, nonduplici, uti male a VERHEYENO aliisque nonnullis perhibetur.

Fig. 13. *Diaphragma* exhibet a parte inferiori, scilicet positu, quò in corpore situm est, quod propterea rursus ad corpus humanum recens delineari curavi, quia in altera editione a pictore male exaratum fuerat, & que etiam figuræ VERHEYENI & MALLGETI illud inversum, sive a parte superiori tantum repræsentant: quo lectores, præpue tyrones, facile falli possunt.

AAAA Diaphragmatis musculus superior, fibris carneis crassis e sterno & costarum cartilaginibus proveniens: quarum fibræ versus partem tendineam, quasi radii ad centrum excurrunt.

B B Musculus inferior, quasi duplex.

C Tendo ejus dexter & longior.

D Tendo sinister & brevior.

EE Pars tendinea, sive centrum tendineum, cui superius pericardium adhæret: in qua fibræ tendineæ, observante Santorino, ruboris gratia, decussantur, & mirabiliter sibi invicem intexuntur.

F Foramen ellipticum transversum, in parte tendinea, per quod vena cava transit.

G Foramen oblongum in parte carnea, per quod œsophagus ventriculum adit.

H Locus sive interstitium inter duo capita musculi inferioris, ubi *Arteria magna* ethorace in abdomen descendit; *Ductus venæ thoracicus* & sæpe *vena azygos* ex abdomine in thoracem ascendunt.

I Pars quædam carnea, quæ hic erat in tendinea

K Ap.

K Appendices duæ musculosæ, quæ in variis variant, & modo adsunt, modo desunt.

EXPLICATIO

TABULÆ QUARTÆ.

Fig. 14. Repræsentat GLANDULAM THYMI ex fœtu humano recens nato.

AA est Cor, pericardio involutum, cui thymus magna parte adhæret.

BB Glandula thymus, prout in hoc fœtu se habebat; bifida quasi in inferiori, trifida vero in superiori parte. Cujus partes inferiores, *aa*, adhærent superiori parti pericardii; pars media, *bb*, trunco aortæ; partes vero superiores, *ccc*, principio ramorum aortæ ascendentium incumbunt.

CCC Rami tres ascendentes aortæ.

Fig. 15. Varietatem hujus glandulæ ex alio fœtu ostendit: quales adhuc plurimas afferre possem: nam æque figura, quam magnitudine, in quovis fere infante variat.

AA Pars superior cordis pericardio involuti.

BB Glandula Thymus, superius in duas partes divisa, *aa*, inferius leviter tantum sinuata, *b*.

CCC Rami ascendentes, ut in præcedenti.

Conferatur §. 256. & §. 387.

Fig. 16. Exhibet CEREBELLUM HUMANUM: in quo divisiones ejus in lamellas sive lobulos ab aliis, quantum novi, non descriptos pulchre demonstrantur.

aaaa Indicatur cerebellum humanum, in medio perpendiculariter & in æquales partes sectum.

BBB In-

BBB Interior substantia corticalis & medullaris.

ccc Tractus medullares, non adeo crassi, neque adeo breves, ut vulgo a multis delineantur.

ddd Divisiones corticalis substantiæ prius in lobos majores, qui vero mox in plures minores, & tandem *minimos lobulos* ubique pulchre dividuntur; ita, ut quilibet lobe major suum peculiarem habeat ramum medullarem, & quilibet lobus minor, imo minimus, suum ramulum medullaris substantiæ, quorum quilibet ab altero distinctus, omnes tamen tandem rursus prope medullam oblongatam, quasi in unum truncum coeunt. Hæ divisiones & lobuli litteris indicari non possunt, sed ex figuræ consideratione facilius patebunt.

ee Medulla oblongata.

ff Principium spinalis medullæ.

Quomodo vero ope spiritus vini præparari, in conspectum optime produci debeat hæc fabrica, olim in *Ephem. Nat. Curios.* Centur. V. pag. 157. prolixius docuimus.

Fig. 17. Ostendit **CEREBELLUM VITULINUM**; in medio quoque verticaliter dissectum, cum partibus quibusdam annexis, in eo lobuli cerebelli, quomodo in vitulose habent, quoque videri queant.

aaaaaa Demonstrat majores & præcipuos lobulos cerebelli hujus.

bbbbbb Præcipuas divisiones lobulorum cerebelli, quos vulgo pro una eademque continua substantia habuerunt.

cc Tractus medullares præcipui, unde minores, tamquam ramuli arborum innumeri procedunt.

dd Crura cerebri resecta.

e Rima

e Rima ad infundibulum.

f Glandula pinealis.

gg Nates.

hh Testes.

ii *Ventriculus quartus* cerebri, sive calamus scriptorius, in cujus medio, *crena*; in parte superiori

K *Anus*, sive orificium ad *Aquæductum Sylvii*.

g. 18. Proponit OCULUM SUILLUM recentem, frigore congelatum, & verticaliter dissectum, ut situs trium ita dictorum humorum oculi & tunicæ uveæ rite conspici queat.

a a Membrana cornea.

bbbb Scleroticæ, nec non subjunctæ choroideæ & retinæ, ambitus.

c Membrana uveæ, in cujus medio pupilla.

dd Ligamentum ciliare, juxta humorem crystallinum insertum.

eee Humor vitreus, partem posteriorem oculi occupans.

f Humor crystallinus, in sinus vitrei, a ligamento ciliari quasi suspensus, & membranula inclusus.

g Humor aqueus, inter crystallinum & tunicam corneam; ubi conspicitur, copiam humoris aquei inter corneam & uveam, sive in anteriori humoris aquei camera, longe majorem esse, quam in posteriori, sive inter uveam & crystallinum; ubi pars longe minima, & vix tenuissima lamella, observari potest.

g. 19. Demonstrateadem, sed ex OCULO HUMANO; in quo adhuc plus humoris aquei ante uveam, quam post uveam conspicitur. Ceterum nulla notabilis differentia quam quod crystallinus f in homine longe sit minor, quam in porcis, canibus, vitulis, ovibus, lepo-

leporibus, aliisque omnibus bestiis, quæ hujus causâ dissectimus. Conf. quæ de hoc argumento Nota (15*) dicta sunt.

Fig. 20. Exhibet LINGUAM HUMANAM

cum tribus ejus tegumentis, quæ, si rectè memini, nusquam adhuc delineata sunt. (

AAAA Superficies superior linguæ, in qua eminentiæ papillares capitatæ & pyramidales undique in conspectum prodeunt.

B Tunicæ exterioris frustum separatum a reliquis, & reclinatum, in qua papillæ nervæ innumeræ in conspectum prodeunt, interiori ejus superficiei adhærentes.

CC Tunica secunda linguæ, *corpus reticulare Malpighii* dicta; per cujus foramina papillæ nervæ ex tertia ad primam sive extimam transeunt.

D *Corpus reticulare*, a subiecto tertio involucro separatum & reclinatum.

EE Membrana, sive *corpus papillare nervosum*, in quo innumeræ papillæ eminent quæ ex hoc corpore, per membranam reticularem, ad tunicam extimam transeunt.

FF *Glandulæ linguales*, ut & papillæ anterioribus longe majores, in posteriori linguæ parte conspicuæ: nunc plures, nunc pauciores.

G Foramen, quod in posteriori linguæ parte sæpe occurrit, figuræ incertæ & dubiæ: modo rotundum, quandoque triangulare, alia ovale, de quo vide plura Nota (56*)

Fig. 21. Jam in Tabulæ secundæ explicatione exposita est.

(a) Reperi postea, quod apud Bourdonum T. V. fig. 12 hæc jam delineata sint; sed magnitudine naturali majora.

E X P L I C A T I O

T A B U L Æ Q U I N T Æ.

g. 22. Ostendit membrum genitale virile a facie superiori; cujus venæ & substantia cavernosa, singulari & eleganti modo, argento vivo ita a me repletæ sunt, ut egregie & melius in conspectum prodeant, quam eas antea unquam vidi, aut delineatas usquam reperi: quod membrum adhuc ita preparatum asservo.

A Venæ penis truncus, in quem mercurium, pertusa prius valvula ejus, immisi.

B B Venæ hujus circa penis medium in ramos duos insignes divisio.

C Uberior horum in plures ramos notabiles, & tandem in quamplurimos ramulos minimos, prope coronam penis, distributio.

D Elegantissimus vasculorum subtilissimorum & copiosissimorum, ex minimis ramulis ortorum, inextricabilis & mirabilis cursus per totam glandis superficiem, tortuosis & flexuosis gyris, ad intestinulorum aut vasculorum seminalium in testiculis similitudinem, quæ adeo numerosa sunt, ut tota glandis superficies ex meris minutissimis vasculis constare videatur.

ee Vasa quædam minora, majora, & maxima, multis in locis scandentia, amplectentia, sive superequantia.

Finis urethræ, per quam urina exit.

Funiculus, quo post expletionem penis pars posterior constricta est, ne mercurius facile effluat.

Pars penis posterior resecta.

Fig.

Fig. 23. Repræsentat ejusdem penis faciem inferiorem : in qua , quomodo venæ , mercurio repletæ , tam mirabili reptatu , atque tam multis amplexibus , conjunctionibus , sive anastomosis , per hanc , & in primis etiam super urethram discurrant , apparet ; quarum multæ longe subtiliores sunt & copiosiores in ipso objecto , quod jam ultra quinquennium asservo , præsertim circa frænulum & coronam , quam a pictore & sculptore , sine confusione producenda , exhiberi potuerunt .

A Frænulum penis , copiosissimis minutissimisque vasculis pilum tenuitate superantibus instructum .

BB Corona & cervix penis , vasculis omnibus subtilissimis abundantes .

CC Glandis tota pars inferior , sicuti superior ubique vasculis valde exiguis , mirabiliter tortuosis , repletissima .

DD Urethra protuberans ; cujus corpus cavosum mercurio plenum eam ita extendit cum vasis plurimis eam ambientibus .

EE Corpora duo penis cavernosa , urethra in medio continentia , argento vivo quoque repleta ; quæ una cum urethra vasorum majorum , multas flexiones , ambages , amplexus , & anastomoses facientium , magnâ copia cinguntur , omnia mercurio impleta .

F Finis urethræ .

G Funiculus , quo penis ligatus .

H Pars penis posterior resecta .

Hoc pulcherrimæ repletionis experimentum quoties in aliis penis iterare volui ; sed nullo tam bene succedere voluit , quam in hoc quia mercurius per venam dorsî immixtus , iter urinæ mox rursus effluebat . Unde ve-

communicatio hujus itineris cum venis penis cognosci, & præter alia contagii veneriæ modus inde intelligi potest.

E X P L I C A T I O T A B U L Æ S E X T Æ.

Fig. 24. Repræsentat *testiculum humanum*, cujus vasa seminalia more *Ruyschiano* a me resoluta sunt.

A Tunicam testiculi albugineam denotat a vasculis seminalibus separatam & reflexam.

BB Vascula testiculi seminalia resoluta, quæ genituram conficiunt, atque instar capillamentorum fere dependent: ex quibus interiorem testis substantiam totam constare, hic videri potest.

Fig. 25. Peculiarem *testiculi cujusdam humani compositionem*, sicuti a me *Helmstadii*, in cadavere publice inciso, olim reperta est.

A Arteria aorta descendens.

B Vena cava inferior.

CC Venæ emulgentes.

D Ortus arteriarum spermaticarum ex trunco aortæ.

e Vena spermatica dextra, e trunco venæ cavæ.

f Vena spermatica sinistra, ex emulgente sinistra.

g Vena & arteria spermatica dextra sibi invicem implicatæ consueto modo ad testiculum abeuntes.

h Testiculus dexter, &

ii Epidydimis e scroto-exemta.

kl Vas deferens sive ejaculatorium; quæ tria omnia, hoc latere, consueto & naturali more se habebant.

m Testiculus sinister, qui non in scroto, sed

in abdomine hæsit, eo in loco, ubi alia vasa spermatica abdomine egrediuntur, a tero longe minor, & sine epididymide. Con-
Nota (26).

n o Epididymis in hoc cadavere a testiculo maximam partem separata; nam ad *n* tantum adhærebat testiculo, reliqua pars per locum vasis spermaticis alias consueta, per musculos scilicet abdominis ex abdomine egrediebatur, & ad scrotum usque se extendebat sic ut locus *o*, quæ pars ejus inferior fuit in superiori scroti parte hæreret. Inde ver-

p Ductus sive vas deferens, quasi ex testiculo e scroto veniret) rursus ascendebat ad abdomen, sub testiculo *m* pergebat, ad

q Emergebat, & deinde more solito a litera

r Ad vesiculam seminalem sui lateris progrediebatur.

R Est locus, ubi vasa spermatica dividebantur, & pars

s Ad testiculum, pars vero

t Ad epididymidem abibat.

Cognoscimus ex hoc lusu naturæ, quam ingeniose & pulchre natura hujus testiculi structuram fabricaverit. Nihil in eo deficit, sed partes, quæ alias conjunctæ esse solent, ut epididymis & testiculus, separatæ & quasi arte a se invicem resolutæ erant.

Cumque alias testiculus in scroto naturaliter esse consuevit, natura vero per errorem eum in abdomen posuit, voluit tamen, ut pars aliqua ejusdem, nimirum epididymis, cum vasis ejaculatorii parte, extra abdomen versus locum consuetum abiret: atque sic, licet hæc testiculi fabrica non sit consueta & naturalis, hac tamen ratione omnes testiculi naturalis functiones & usus præstare potuit, ac si naturali prorsus modo factus esset. Persuademur etiam hac fabrica-
cer-

tertius, genituram ex testibus per epididymides ad vasa deferentia pervenire.

fig. 26. *a a a* denotat *vesiculam seminalem* dextram, apertam, recentem, non siccata, at elotam, ut non solum variæ ejus cellulæ, verum etiam *facies interna reticulata*, a *Santorino* in observ. anatom. pag. 291. descripta, in conspectum prodeat.

b b b *Facies interna reticulata*, (tanquam corpus reticulare) quæ fere ut interior facies vesiculæ felleæ a *Ruyschio* delineata; quibus in cellulis sive reticulis genitura virilis forte majorem perfectionem acquirit. Pulchrior vero in ipso objecto apparet, quam a pictore & chalcographo exhiberi potuit.

fig. 27. *Fœtus est humanus*, abortu ex muliere, tertio mense gravida, rejectus, membranis suis, quasi in ovo adhuc pulcherrime inclusus, ac liquori suo consueto innatans; omnia in naturalis magnitudine, ut a me asservatur.

A *Fœtus humanus*, capite crasso, oculis magnis, protuberantibus, nigris, sicut plerumque hoc in statu esse solent, per liquorem & tunicas pellucas, sicut situs est, apparens.

B B B *Tunica exterior chorii*, valde vasculosa, vasculis instar radicularum undique dependentibus, copiosissimis, ab aliis, quod sciam, nondum delineatis, ornata; ubi notanda

CCC *Tunicarum fœtus pellucidarum pars*, a quibus vasculosa a me ex parte separata sive detracta est, ut una cum fœtu in liquore suo ambiente conspici possit: nam sciendum, maximam partem hujus ovi humani tunica tali vasculosa, vasculis fluctuantibus, ut pictæ sunt, & dependentibus fuisse instructam.

DD Funiculus umbilicalis rudi modo adhuc apparens.

Fig. 27.* *aaaa* Ovulum a muliere per quatuordecim circiter, ut credit, hebdomades gravida magna uteri hæmorrhagia & doloribus rejectum; quod fere pellucidum, multisque vasculis sive radiculis chorii, tanquam velutis, in ambitu ornatum, in quo

b Corpusculum apparet, embryonem adhuc informem repræsentans, quod quoque adhuc asservo.

Fig. 28. *aaaa* Est pars ani & intestini recti aperta.

bb Inæquales eminentiæ & rugæ in exteriora ani, ubi venæ lividæ tumentes in hoc cadavere apparebant.

ccc margo, qui a litt. *cc* ad litt. *aa* inferiores instar fimbriæ erat, ubi sphincter & intestinum rectum colore & consistentia, plerumque fieri solet, differebant.

ddd Oscula minima quamplurima circa intestini recti finem, cum multis glandulis subrotundis, ut in hoc cadavere apparebant.

eee Oscula quædam majora setam admittentia, infra fimbriam recti, ubi sphincter situm est, prout in hoc cadavere videnda erant, quorum duorum setæ immissæ.

EXPLICATIO

TABULÆ SEPTIMÆ.

Fig. 29. Ostendit *intestinum ileum*, *colon*, *cæcum* cum *processu vermiformi*, quomodo se sæpius habeant in infante recens nato, flatu distenta & exsiccata.

AA Pars intestini ilei, ejusque in latus sinistrum parietem coli ingressus.

BB

BB Pars intestini coli.

C Intestinum cœcum, ejusque in processum vermiformem peculiaris & diversa, quam in adultis, mutatio: in infantibus enim hoc cœcum sensim sensimque angustatur in processum hunc, conici quasi figura; cum in adultis id alia fiat ratione, & cylindricus fere sit.

DE Processus vermiformis in hoc infante singulari modo inflexus: primum enim a C sub ileo transibat & ascendebat ad D. Deinde vero supra ileum iterum reflectebatur, & descendebat ad E.

g. 30. Eadem intestina a parte posteriori, ut cœci mutatio in processum vermiformem, quomodo in infantibus plerumque se habeat, clarius conspici queat.

AA Intestinum ileum cum ejus in colon ingressu.

BB Colon.

C Cœcum.

D Initium processus vermiformis.

EE Singularis hujus flexus circa ileum.

g. 31. Processum quemdam vermiformem separatim ex adulto, peculiaribus flexionibus, & quasi gyris donatum, exhibet; qui simul solito longior erat.

A Principium ejus a cœco resectum.

B Finis sursum spectans.

C Singulares flexiones.

g. 32. Sinum longitudinalem duræ matris cum lateralibus exhibet, quibus sinus peculiatis transversus in hoc cadavere interjectus erat.

A Sinus longitudinalis pars aperta.

B Locus, ubi accurate in duos æquales laterales, (quod sæpius ita non contingit) dividebatur in hoc cadavere.

C Initium duorum lateralium.

D d 3

DD La-

DD Laterales in progressu suo resecti.

E Sinus quidam transversus, duobus lateralibus communicationem præstans, per quem

F Stylus crassus facile transmittebatur.

Hujus sinus transversi hiatus in dextro sinu amplior erat, quam in sinistro. Conf. Not. (48)

Fig. 33. Repræsentat linguam cum maxilla inferiori adhuc cohærentem, & in illa osculoductuum salivalium glandulæ sublingualis sicut in hoc erant cadavere.

AA Lingua ad latus sinistrum reclinata.

bbb Oscula ductuum salivalium glandulæ sublingualis, quorum septem in hoc latere occurrebant.

cccc Setæ his osculis immissæ.

DD Duo muscoli elevatores labri inferioris. In sinistro hujus linguæ latere horum osculorum primum & anterius tam amplum erat, non solum setam, sed tenuem tubulum immittere, atque per hunc flatum injicere potuerim; reliquorum vero osculorum duo vtriusque tantum apparebant minora. Conf. Not. (55*)

EXPLICATIO

TABULÆ OCTAVÆ.

Fig. 34. Lingua sistitur humana, ubi in foramine, cæco alias dicto, duo notabiles ductus salivales a me observati sunt. Conf. p. 140 & Nota (56*)

A Foramen illud cæcum, quod in hoc cadavere valde amplum erat, jam apertum.

b Ductus alter salivalis, & quidem sinister versus radicem linguæ abiens, cera rubra repletus.

cc Vesicula in fine hujus ductus, saliva distenta.

d Prin-

d Principium alterius ductus in latere sinistro; qui quidem cera repletus non erat; instar ductus tamen non solum a reliqua linguæ substantia, tractu albicante, distinguebatur; verum etiam subtili tubulo flatu distendi poterat.

e Locus, ubi hic ductus disparebat.

ff Situs & progressus horum ductuum; ubi notandum, eos non in superficie linguæ hæsisse, sed ad linguæ profunditatem sub linguæ involucris, quæ hic remota sunt, sitos fuisse.

Præterea notamus osculorum *b* & *d* singularem fuisse fabricam; nam ut valvulæ vel carunculæ se habebant, quæ collapsæ apparebant. Si vero flatus ope tubuli certa ratione inferiora versus pellebatur, aperiebantur, sequæ, ut hic delineata sunt, exhibebant.

gg Adhuc tria alia oscula sive foraminula, quæ in majori erant, indicant; unum in parte anteriori; alterum in latere dextro; alterum in sinistro: quæ quidem setam per breve spatium oblique admittebant; verum an ulterius progredierentur, deprehendere non potui. Unde videtur, hoc foramen, quando adest, communem quasi ductum variorum ductulorum salivalium ex lingua esse, in quibus vero natura non constans est, sed sæpe ludit & variat.

b Epiglottis.

i Ejus ligamentum anterius.

k Musculosæ fibræ, quæ ex linguæ substantia in ligamentum hoc, tanquam in tendinem, inferebantur; quæ ad epiglottidem elevandam, quando adsunt, (nam semper non patent) inservire, & pro musculo epiglottidis, nomine *glosso-epiglottidei*, haberi possunt.

ll Officula duo minima ossis hyoidis.

mm Apices cornuum ossis hyoidis.

nn Variæ glandulæ & papillæ in linguæ superficie circa medium.

o Linguæ apex deorsum flexus.

Fig. 35. Demonstrat ductus hos seorsim, e lingua quasi exemptos, cum foramine cæco hic non dissecto, tanquam ductu communiorum.

A Foramen hoc linguæ cæcum, quod valde amplum, & canalem in hoc cadavere, sicut hic est, tres circiter lineas longum conficiebat, atque tubulum crassum facile admittere.

BB Duo ductus salivales novi in illud deficientes, ea magnitudine & figura, sicut in hoc cadavere erant.

CC Fines horum ductuum, aut quorum saltem ulteriorem progressum invenire non licuit.

D Locus, ubi sinister in vesiculam pellucidam expandebatur, quæ liquido pellucido, subviscido, salivæ simillimo, replebatur; quod a cera, vi injecta, illuc compulsum esse videtur.

Fig. 36. Exhibet varia in palato, juxta palatum, & in labro superiori considerata.

aa Palati pars anterior, in qua nulla oscula hic apparebant.

bb Palati pars posterior, valde glandulosa; ubi in hoc cadavere quamplurima oscula excretoria manifestissima apparebant; quorum nonnulla setam crassam, & stylum tenuem, ad duarum triumve linearum profunditatem, non recta, sed paullo oblique versus posteriora admittebant; quæ alias tam magna rarius occurrunt.

c In loco, qui respondet canalibus illis Stenonia-

nianis, in capite osseo, post dentes incisores, conspicuis, & ad nasum desinentibus, nulla hic erat apertura, nullus transitus ad nares patebat. Vid. Nota (59*)

DDD Labrum superius reflexum, ut interiora pateant.

ddd Glandulae ejus lenticulares & miliares, sicut in hoc cadavere, remota tunica oris interna, apparebant, ad secundum usque dentem molarem utrinque se extendentes.

Ligamentum labri superioris.

ff Dux glandulae conglomeratae in hoc cadavere observatae, cum osculis aliquot excretoriis, ab aliis, quantum scio, non descriptis. Conf. pag. 160. & Nota (57*)

ggg Setae & styli osculis his ad duarum linearum profunditatem immissi.

Pars hujus glandulae, ubi adhuc duo ampla oscula apparebant, quae pressa guttulas salivae, instar roris emittebant.

37. Alteram harum glandularum, & quidem sinistram, a facie exteriori exhibet: unde eam ad conglomeratarum genus pertinere conspicitur.

38. *Varia circa fauces & uvulam* repraesentat, in capite & maxilla superiori a parte inferiori inspectis.

Est ductus ille in fornice, sive suprema faucium parte, sub processu anteriori ossis occipitis situs, p. 157. indicatus & N. (58*) uberius pro ductu mucoso descriptus.

Ejus sub ossis occipitis apophysi versus foramen magnum occipitis extensio, quinque minimum linearum.

Tuba sinistra Eustachiana, cum apertura sua longitudinali obliqua, & cartilagineo limbo aperturam hanc cingente, quemadmodum si paul-

si paullo oblique a regione aliquo modo composita inspicitur, apparet.

d *Tuba Eustachiana dextra*, quomodo eodem spectatoris situ se ostendit; ubi non in officium ejus inspicere, sed limbi sive orationis faciem posteriorem & anteriorem tantum videre possumus.

e *Progressus utriusque hujus tubæ obliquus versus aurem*

f *Hamulus*, musculus tubæ incumbens a quo modo ad latus trahens, ut tuba *Eustachii* hujus lateris tanto melius in conspectu prodeat.

g *Musculi salpingo-staphilini*, in partem posteriorem uvulæ inserti, qui eam retrahunt.

h *Pterygostaphilini musculi*, super corniculam sive apophysin styloideam in interioris laryngis processum pterygoideum, quasi per tracheam reflexi, & in anteriorem veli palati partem inserti. Hos uvulæ musculos esse negat *Morgagnius Adv. II. p. 35.* quia (ut ait) *illorum tendines in ipsam extremam osseam palati oram infigantur.* Mihi vero videtur, partem quidem huic ossi, partem vero etiam membranae palatinæ, ut §. 326. proposui inseri.

i *Apophyses illæ tenues in pterygoideis*, quæ haud incongruo vocabulo cornicula appellantur *Santorinus.*

K *Uvula ad palatum reflexa*, & in ejus medio separata membrana palati glandulosa *musculus uvulæ azygos Morgagnii*, sicut hoc cadavere se ostendebat.

l *Musculus uvulæ cerato-staphilinus*, leviter adumbratus. Vid. Nota (72*)

m *Duxæ aperturæ posteriores narium*, quæ modo in fauces hiant.

n Septi nasi pars posterior, quam vomer conficit.

o o Duo capitula ossis occipitis, quæ supremæ vertebræ articulantur, & post hæc

p Foramen magnum occipitis.

q q Aures aliquo modo apparentes.

eliquas partes, de quibus hic non agitur, characteribus notare supervacuum esse censuimus.

fig. 39. *Os vomeris*, sive vomer, quod a *Sanctorino* non pro peculiari osse, sed pro parte ethmoidis tantum habetur, seorsim hic, ac distinctum ostenditur e puero 13. annos nato: in quo distinctissimum erat ab ethmoideo. In adultioribus vero cum ethmoideo in unum concrescit.

a a Vomer, ex duobus lamellis sive parietibus ossibus distinctis constans.

b Cavea, cum oris reclinatis, quæ apophysin ossis sphenoidei per gomphosin recipit, ut alveolus maxillæ dentem: unde hæc duo ossa per gomphosin jungi dicuntur.

c c Interstitium in tota facie superiori, inter duas lamellas, cui septi nasi pars, quæ ab ethmoideo osse provenit, inseritur.

d d Pars inferior, ad similitudinem vomeris acuta, quæ palati ossibus, ubi inter se coeunt, adnascitur.

e e Lamella sive paries vomeris dexter, cui in altero latere sinister opponitur.

EXPLICATIO

TABULÆ NONÆ.

g. I. Musculos interosseos manus externos, & quidem solum partem eorum externam, quia interna hic videri nequit, exhibet.

A Est

A Est musculus primus interosseus externus *ab* ejus duo distincta principia externa, & superficie externa utriusque ossis metacarpi indicis & medii digiti oriunda. *c* Linea utrorumque fibrarum opposito tractu coeunt; *d* tendo, qui interiori lateri digiti medii, huius est, quod indicem respicit, inseritur.

B Est alter interosseus externus, uti se in dorso manus ostendit: *c* est ejus tendo; quem in externum medii digiti latus immittit. hinc hi duo muscoli uni huic digito famulantur; prior *A*, ut eum ad pollicem adducat; posterior *B*, ut eum a pollice abducatur.

C Tertius est interosseus externus; *f-g* duplici ejus principium, ex duplici osse & oppositis tractibus venientibus fibris: quæ postea in unum musculum coeunt, cujus tendo lateri digiti annularis, quod auriculare respicit, insertus, digitum hunc a medio & pollice abducit.

D Est pars adductoris indicis.

E Pars abductoris digiti auricularis.

F Tendo musculi radialis externi.

G Tendo cubitalis s. ulnaris externi.

Fig. II. Ostenditur, quomodo muscoli interossei externi fig. I. modo descripti, in vola manus sese habeant, ibidemque & oriantur & inferantur; ac deinde quomodo etiam interossei interni hic sint constituti.

A A a Est musculus interosseus externus primus, & speciatim ejus pars interior (nam exterior præcedenti figura indicata est.)

B B b Interossei externi secundi pars interior.

C c Interossei externi tertii pars interior.

D d Interosseus internus primus cum tendine.

E e Interosseus internus secundus.

F f Interosseus internus tertius.

G Est

G Est hamulus, quo cutis *H* paulum retrahitur, ut interosseus internus tertius melius videri queat.

Ceterum, quod muscutorum interosseorum doctrina hucusque valde confusa fuerit apud anatomicos, inde facile cognosci potest, dum interosseorum manus *Spigelius* & *Bucretius* in explicatione tabularum *Casseri* octo numeraverint; *Brovnius*, octo; *Mangetus* modo octo, modo sex; *Bartbolinus* quidem sex, sed eos omnes abductores esse scribit; *Verheyenus* quoque sex, sed omnes internos adductores, externos vero abductores esse vult, seque mutuo interfecare in formam crucis putat. *Verslingius*, ejusque commentator *Blasius* verum numerum horum muscutorum ignorasse videntur, quia numerum non indicant.

I N D E X I

A U C T O R U M.

- A** Chillinus (Alex.) 286. 289. 291. 294. 300.
 pag. 333.
 Alberti (Salom.) 315.
 Albinus 2. 75. 279. 280.
 281.
 Alghifius 97.
 Almelveen 282.
 St. Andreæ 273. 330.
 Andryus 39. 45. 226.
 Anellus 303. 304.
 ab Aquapendente 2.
 200. 316. 323.
 Arantius 144. 294.
 Aristoteles 136. 168. 292.
 Aselius 2. 77. 78.
B Aglivus 139.
 Bajerus 290.
 Bartholinus (Caspar) 2.
 Bartholinus (Tom.) 2. 18.
 81. 82. 103. 156. 219. 271.
 281. 315.
 Bartholinus (Caspari nepos) 2.
 Bartisch 315.
 Bauhin. 2. 23. 74. 287.
 315. 344.
 Baylius 304.
 Bellingerus 122. 307.
 Bellinus 2. 88. 239.
 Bergerus 143. 186. 244.
 273. 338.
 Bernovillus 186.
 Bianchus 2. 152. 222. 261.
286. 289. 291. 294. 300.
 Bidloo 2. 140. 142. 159.
 193. 219. 237. 247. 256.
 256. 284. 286. 316.
 Billius 333.
 Blasius 1. 2. 287.
 Blegny 105. 315.
 Boerhaave 18. 92. 161.
 184. 186. 193. 242. 264.
 264. 265. 266. 268. 279.
 296. 322. 343.
 Bohnius 2. 85. 287. 291.
 Bonetus 4.
 Borellus 186. 188.
 Bourdonus 2. 45. 47. 315.
 Brendelius 106. 107.
 Briggs 315. 322.
 Brunnerus 2. 73. 253. 271.
 Burggrav 184.
 Bussièrè 304. 308.
C Abrolius 294.
 Calvus 304.
 Camerarius 143. 304. 330.
 Cantius 2. 24. 41. 47. 191.
 196. 202. 204. 248. 282.
 312. 339. 340.
 Cartesius 314. 315.
 Casserius 2. 189. 193. 200.
 208. 315.
 Celsus 7. 108. 124. 125.
 154. 159.
 Charletonus 81.
 Chefelden 2. 46. 67. 69.
 77. 86.

77. 86. 90. 92. 115. 177.
 96. 207. 210. 219. 222.
 26. 276. 288. 295. 297.
 29. 330. 343.
 irac 61. 275.
 ricus 253.
 terus 2. 136.
 e 291.
 linus 1. 157. 161. 325.
 umbus 2. 23. 26. 129.
 92.
 inors 21. 37.
 chvitz 90. 157. 162.
 26.
 rtial 304.
 vperus 2. 38. 66. 95. 98.
 4. 132. 134. 158. 186.
 89. 190. 194. 195. 196.
 7. 200. 201. 202. 203.
 5. 206. 213. 217. 218.
 9. 220. 226. 228. 229.
 5. 272. 275. 284. 297.
 4. 310. 311. 333. 346.
 0. 354.
 rianus 304.
 Ekerus 237.
 Des Noves 105. 170.
 4.
 enter 298.
 ingius 304.
 nerbroeck 2. 301.
 ais 2. 298. 303.
 art 126.
 de Mayran 314.
 las 2. 46. 193. 195.
 1. 202. 204. 207. 208.
 1. 220. 222. 227. 333.
 1. 343. 351. 353. 354.
 kius 2. 23. 77. 91.

98. 108. 149. 164. 168.
 175. 189. 197. 219. 226.
 272. 284. 302. 338. 339.
 340. 342.

E Lsholizius 304.

E Erasistratus 292.

Ettmuller 105.

Eustachius 2. 77. 79. 88.

130. 168. 169. 176. 178.

189. 191. 197. 210. 312.

343. 344. 345.

F Abry 315.

F Fallopius 2. 21. 108.

159. 192. 226. 272. 278.

282. 342.

Fantonus 2. 105. 253.

Folius 18. 282.

Fontenelle 357.

Fracassatus 162.

Freind 301.

G Agliardus 2. 12.

G Galenus 2. 3. 21. 53.

78. 152. 192. 197. 292.

308. 310.

Garengot 2. 69. 358.

Glissonius 2. 81. 83. 286.

287.

Gœlicke 2. 105.

Govey 129. 228. 301. 348.

Graafius 2. 91. 99. 100. 107.

295. 298. 301.

Grassius 301.

Grevv 74.

Guillemeau 38.

Guintherius Anderna-

cus 295.

H Amberger 133.

H du Hamel 304.

Harderus 255.

Har-

- Harris 92.
 Hartſæcker 315.
 Harveus 2. 12.
 Haverus 2. 12. 15.
 Heinrici 105.
 Helvetius 278. 280. 281.
 310. 323.
 Hemſterhuſius 81.
 Henningerus 80. 284.
 Herophilus 139.
 Heucherus 295.
 Highmorus 2. 23. 92. 287.
 315.
 Hiſſcherus 105.
 Hippocrates 53. 130. 240.
 244. 246. 255. 282. 292.
 de la Hire 322.
 Hoffmannus (Caſp.) 2.
 292.
 Hoffmannus (Frid.) 105.
 307.
 Hoffmannus (Maur.) 82.
 Hoffmannus (Jo. Maur.)
 2. 21. 71. 82. 291.
 Hornius 2. 82. 271. 301.
 Horſtius 315.
 Hovius 2. 153. 154. 320.
I Ngraſſias 2.
 Jolivius 81.
 Juſſieu 163.
K Eilius 2.
 Keplerus 315.
 Kerkringius 2. 12. 73. 116.
 301.
L Amius 301.
 Lanciſius 133. 143.
 175. 180. 310. 337. 344.
 346.
 Laurembergius 2.
 Laurentius 2.
 Lealis 92. 94. 295. 2.
 Leeuvvenhœck 58.
 92. 182. 244. 302.
 Liſterus 292. 308.
 Littrius 96. 98. 129. 1.
 149. 201. 233. 236. 2.
 257. 275. 300. 303. 3.
 355. 356. 357.
 Lovverus 2. 80. 132. 1.
 188. 310. 311.
 Lyſerus 2. 29.
M Ajerus 309. 35.
 Malpighius 2.
 59. 60. 84. 88. 107. 1.
 142. 162. 234. 239. 2.
 268. 273. 277. 278. 2.
 294. 301.
 Mangetus 2. 65. 210. 2.
 303. 305. 334. 337.
 Marchettus 2. 271.
 Mariottus 314. 316. 3.
 Maſſichellius 170. 3.
 335.
 Mauriceau 298.
 Mead 186.
 Meeckren 315.
 Meibomius 21. 151. 2.
 Meryus 233. 305. 307. 3.
 Michelottus 237. 239. 2.
 261. 264. 265. 311. 33.
 Mœbius 342.
 Molinettus 357.
 Morandus 318.
 Morgagnius 2. 20. 23.
 38. 47. 65. 74. 83. 89.
 96. 97. 100. 103. 104. 1.
 107. 118. 127. 132. 1.
 140. 144. 148. 152. 1.
 159

159. 161. 164. 168. 174. 175.
 176. 179. 184. 186. 190. 191.
 196. 199. 200. 201. 202. 204.
 210. 217. 219. 220. 222. 226.
 240. 248. 250. 253. 254. 256.
 260. 268. 273. 275. 277. 278.
 282. 284. 286. 287. 289.
 294. 295. 297. 301. 306. 310.
 312. 313. 314. 317. 318. 324.
 325. 333. 337. 338. 345. 346.
 347.
 ottius 284. 302.
 unnick 272. 330.
 uraltus 309.
 usgravius 284.
N Aboth 105.
 Nedham 2.
 evvton. 315.
 icolai 264. 295. 311. 314.
 339. 342.
 igrisfolius 302.
 oguez 2. 261.
 uckius 2. 68. 118. 124. 158.
 283. 286. 320. 323.
R Ribatius 136.
 Ortlobius 2. 139. 148.
 291.
A Acchionus 2. 138. 247.
 Paitonus 301. 302. 304.
 lfin. 2. 17. 23. 164. 291.
 narollus 99.
 ræus 38.
 uli 201.
 vius 2.
 chlinus 281. 336.
 cquetus 2. 79.
 titus 39. 226. 307. 318. 319.
 yerus 2. 76. 235. 253.
 ancus 287. 288.

Platerus 99. 315.
 Plazzonus 99.
 Plinius 58.
 Poliniere 315.
 Poupartius 67. 274.
 Pozzus 288.
 Purcellius 292.
R Aius 243.
 Rau 91. 270. 271. 330.
 Rauholt 112. 237. 257. 306.
 315.
 Redius 253.
 Reneaume 318.
 Rhodius 99.
 Ridlejus 2. 139. 142. 146. 147.
 172. 181. 342. 345. 346. 347.
 Riolanus 2. 136. 154. 211. 219.
 220. 226. 272. 295. 298. 304.
 Rivinus 156. 168. 278. 313.
 329. 332.
 Rolfinck 2. 282.
 Rudbeck 2. 81. 285. 286.
 Ruffus 107.
 Ruyfchius 2. 12. 26. 37. 39.
 45. 47. 54. 58. 59. 60. 61. 72.
 74. 75. 76. 77. 79. 85. 86. 88.
 89. 92. 96. 97. 105. 108. 110.
 116. 123. 125. 136. 138. 139.
 141. 143. 146. 151. 153. 155.
 156. 159. 161. 162. 164. 165.
 167. 168. 173. 235. 237. 244.
 245. 247. 250. 257. 258. 260.
 264. 265. 273. 274. 278. 279.
 281. 291. 294. 300. 314. 319.
 321. 330. 339. 342.
S Alzmannus 180. 284. 306.
 Santorinus 2. 20. 24. 27.
 29. 38. 59. 67. 68. 73. 94. 96.
 97. 100. 101. 104. 105. 107.

126. 134. 141. 142. 148. 164.
 165. 181. 190. 193. 195. 196.
 197. 199. 200. 201. 202. 204.
 218. 219. 220. 222. 223. 247.
 278. 279. 298. 301. 302. 304.
 309. 328. 345. 346. 347.
 Saviard 304.
 Sbaralea 301.
 Scheinerus 315.
 Schelhammerus 2. 34. 42. 43.
 46. 78. 86. 88. 135. 145. 167.
 184. 186. 192. 219. 233. 245.
 275. 287. 291. 292. 295. 333.
 336. 337. 348.
 Schneiderus 2. 17. 164.
 Schraderus 63. 295.
 Schulzius 272. 301. 311.
 Severinus 1. 2.
 Simoncellius 170. 334. 335.
 336.
 Slevogt 165.
 Spigelius 2. 114. 277.
 Stancarius 322.
 Steno 2. 29. 60. 106. 152. 156.
 162. 188. 208. 259. 274. 301.
 323.
 Stephanus 2. 315.
 Stockhusius 334. 362.
 Straussius 304.
 Svammerdam 2. 298.
 Sylvester 308.
 Sylvius 144. 200.
TAconus 288.
Tauvrius 308. 315.
 Teichmejerus 295. 329. 332.
 333.
 Terraneus 97. 98. 102. 255.
 256.
 Thebesius 129. 132.
- Tilingius 304.
 Tournefort 242. 275.
 Trevv 270. 271. 272. 367.
 Tulpus 99.
 Tyfo 95. 255.
VAlentini 1.
Valsalva 2. 19. 166. 16
 169. 193. 201. 203. 250. 29
 330. 335.
 Vallisnerius 92. 106. 107. 23
 293. 295. 301. 302. 304.
 Valverde 2. 315.
 Varolius 2. 140. 146. 282. 31.
 Vaterus 104. 105. 257. 29
 301. 324. 325.
 Vercellonius 2. 135. 248. 25
 254. 260. 273. 313.
 Verheyen 2. 65. 85. 105. 11
 132. 134. 152. 208. 210. 24
 251. 259. 271. 290. 291. 30
 315. 323. 339.
 Du Verneus 2. 55. 69. 166.
 169. 181. 193. 194. 275. 30
 304. 304. 345.
 Du Vernoy 194. 326.
 Vesalius 2. 23. 31. 33. 45. 130
 144. 176. 189. 214. 220. 22
 226. 252. 271. 272. 275. 281
 298. 312. 315. 343. 354.
 Veslingius 2. 332.
 Vestus 287.
 Vidius 2. 315.
 Vidussius 302.
 Vieussenius 2. 132. 139. 142
 143. 146. 148. 182. 193
 194. 244. 303. 305. 343
 346.
 Virgilius 7.
 Voglius 299. 302. 303.
- Vva-

Index I. Auctorum.

405

W Agnerus 305. 315.
 Vvalæus 83.
 vallifius 186.
 valtherus 172. 173. 190.
 193. 197. 219. 220. 324.
 331. 368.
 varthonus 2. 77. 119. 156.
 294.
 vedelius (Jo. Adolph.)
 285.
 velschius 156. 168.
 vidmannus 160.
 an der VViel 38.
 vierus 298.
 villifius 2. 142. 145. 146.

178. 182. 278. 280. 342.
 345. 346. 347.
V vinslous 2. 21. 24. 31. 37.
 47. 115. 120. 123. 131. 153.
 154. 188. 191. 204. 207.
 211. 213. 218. 223. 277.
 308. 312. 318. 319. 322.
 344. 345. 350. 351. 353.
 354. 362.
 Vvirsungus 82.
 Vvium 284.
 Vvolhusius 317.
 de St. Yves 314. 318.
Z Ahn. 315.
 Zellerus 90.

INDEX II.

RERUM PRÆCIPUARUM.

- A** Bdominis partes seu regiones externæ 7. contenta 68. musculi 66. tegumenta s. partes continentes 65.
 Abortus 114.
 Acetabulum 15. quid constituat 38.
 Achillis tendo 49. 226.
 Actio musculi 185. diversæ de eo sententiæ 186.
 Adami pomum 7. 126.
 Adenologia 56. 231.
 Adeps in homine non datur 64.
 Adiposa membrana *ib.* varia. *ib.*
 Adiposi ductus 70. 277.
 Adnata tunica 152.
 Æthiopum cuticula nigra 57. nigritiei causa 59.
 Ala 7. vespertilionum 106.
 Albuginea tunica 152.
 Allantoides membrana 109.
 Alveoli dentium 25.
 Amphiarthrosis 53.
 Amygdalæ 160.
 Anatome quid 1.
 Anatomes subjectum, objectum, media 1. finis 3. instrumenta 5. *seqq.* divisio 4. utilitates multæ *ib.*
 Anatomia comparativa 1. forensis 3. medica *ib.* præctica 4. theologica, philosophica, physica 3. 4.
 Anatomici scriptores optimi 2. recentissimi *in præf.*
 Anconæus processus 42.
 Angiologia 56. 170.
 Anguli oculi. 151.
 Animæ cogitantis sedes 1.
 Annulus pro transitu processus peritonæi 66.
 Anthelix 166.
 Antitragus *ibid.*
 Antrum Highmori 23.
 Anus 75. ejus elevator & sphincter *ibid.* musculi diverse ab auctoribus descripti 221.
 Anus cerebri 144.
 Aniscalptor musculus 21.
 Aorta 171. ejus arcus *ib.* rami ascendentes *ibid.*
 Apex cordis 130. linguis 160. unguis 62.
 Aponevrosi 9. 185.
 Apophysis ossis 13. ejus nomina *ib.* synonyma usus *ibid.*
 Apophysis condyloides coronoides *ib.* jugalis mamillaris s. mastoidea *ib.* nasalis superior & inferior 23. palatina 16.

trofa 17. pterygoidea 20.
Raviana dicta mallei 18.
styloidea 17. 20. zygomat-
tica 17.

ppendiculæ adiposæ co-
li 74.

ppendix ossis 14. vermi-
formis 74.

quæductus Fallopii 19.
28. 169. Nuckii 153. Syl-
vii 144.

queus humor oculi 154.
ejus verus situs *ibid.*

rachnoides tunica cere-
bri 140. 147. medullæ spi-
nalis 149. oculi 155.

rcus aortæ 171.

reola mammæ 118.

rteria quid 8. ejus stru-
ctura 171. figura *ib.* muscu-
laris tunica defensa 336.

337.

rteriæ adiposæ 174.

rteria aorta 121. 171. 172.

173. ejus divisio 171 338.
aspera 125. 127. atrabila-

riæ 174. axillaris 172. bra-

chialis 173. 341. bronchia-

lis 125. 173. carotis inter-

na & externa 134. 171. 172.

339. internarum ingres-

sus 147. cum vertebralibus

anastomoses 146. caroti-

dum divisio 339. cervica-

lis 172. cœliaca 173. ejus

rami *ib.* coronaria cordis

130. 171. cruralis externa

& interna 174. cubitæa

173. cysticæ gemellæ 173.

diaphragmatica superior

& inferior 172. 173. duode-

na *ib.* duræ matris 138. c-

mulgentes 174. epigastrica

ib. epiploica dextra & si-

nistra 173. gastrica dextra

& sinistra *ibid.* gastro-epi-

ploica *ib.* hæmorrhoidalis

externa, & interna 174.

hepatica 173. hypogastri-

ca 174. iliaca *ib.* interco-

stales superiores 172. infe-

riores 173. intestinorum

cum venis communicant

280. lumbaris 174. magna

f. aorta 171. 338. mamma-

ria 172. mediastina *ibid.*

mesenterica superior &

inferior 174. musculares

colli 172. œsophagææ 173.

342. pancreatica 173. po-

plitæa 174. pudenda *ibid.*

pulmonalis 130. 171. cur-

amplior vena 280. ra-

diæa 173. renalis 174. sa-

cra *ib.* scapularis externa

& interna 172. spermatica

174. ejus exortus 295. spi-

nalis 172. splenica 173.

subclavia 172. suralis 174.

thoracica f. mammaria

externa 172. tibialis 174.

trachea 125. 127. vertebra-

lis 172. 340. umbilicalis

174. quousque cava ma-

neat 69.

Arteriosus canalis 115. 133.

Arthrodia 53.

Arthron *ibid.*

- Articulationes fœtus 116.
 Articuli ossium 15. 52.
 Articululus 53.
 Artus superiores & inferiores 7.
 Arytænoides cartilaginee 31. 126.
 Aselii pancreas 77.
 Aspera arteria 125. 127.
 Astragalus 49.
 Atlas 33. ejus ligamentum semicirculare *ibid.*
 Atrabiliaria capsulae 88. 253. in fœtu majores 89.
 Auditorius meatus 17. 28. 166. nervus 169. ejus canalis 19. 169.
 Auditus organum 166. 169. os orbiculare 18. ossicula 18. 168. 332.
 Avium oviductus 108.
 Aures 166.
 Auricula *ib.* ejus pinna *ib.*
 Auriculæ cordis 131. dextra amplior sinistra 310.
 Auricularis digiti musculus 218.
 Axilla 7.
 Axillaris vertebra 34.
 Axis 33.
 Azygos musculus uvulæ 204. vena 175.
B Alanus 96.
 Bartholini prostatae 103.
 Basilare os 19.
 Bicorne os 30. 158.
 Bilis 84. ejus itus & reditus per ductum cysticum defensus 290.
 Brachium 7. ejus os 41. arteria 173. musculi 211.
 Bregma 17. ejus ossa *ib.*
 Brevia vasa 72. 177.
 Bronchia 125. 127. eorum arteria 125. 173. vena 125. 175. 310. glandulae 128.
 Brunneri glandulae 73.
 Bucca 7. ejus glandulae 158. 248.
 Bulbus oculi 152. pili 6. urethrae 97.
Cæcum intestinum 74.
 Calamus scriptorius 147. ejus crena *ibid.*
 Calcaneum 49.
 Calcis os *ibid.*
 Callosum corpus 143.
 Calvaria 17.
 Camera oculi duplex 151. 151.
 Canalis arteriosus 115. 130. nasalis 30. 152. nervi auditorii 19. 169. semicircularis. *ib.* venosus 82. 111. 115.
 Canthi oculi 151.
 Capilli 61.
 Capsula Glissonii 83. similis cum pericardio continua 309.
 Capsula atrabiliaria 88. 253.
 Caput 7. 15. 136. ejus partes continentales 137. continentia *ib.* 138.
 Caput musculi 185. gallinæ 94.
 Cardia 71.
 Caro 9. quadrata 215.

- arotides arteriæ 146. 171.
 339.
 arpus 7. 43. ejus musculi
 214.
 artilago 10. 56. arytænoi-
 des 31. 126. cricoides *ib.* en-
 siformis 37. thyroides 31.
 127. Xiphoides 37.
 artilagines laryngis 126.
 aliquando offescunt 31.
 nasi 163.
 aruncula lacrymalis 25.
 152.
 aruncule myrtiformes 101.
 auda musculi 185.
 audæ f. coccygis os 35.
 avernosa corpora penis 96.
 avernosum corpus tubæ
 Fallopiæ 107.
 avernulæ ossium 15. ossis
 ethmoidei 164.
 avitas tympani 18. 168.
 avitates ossium 15. 16.
 erebellum 144. ejus crura
 145. 146. pedunculi *ib.* pro-
 cessus vermiformis 145.
 protuberantiæ orbicula-
 res 146.
 erebrum 138. stricte di-
 ctum 142. totum glandu-
 la magna forte non in-
 epte diceretur 246.
 erebri anus 144.
 erebri corticalis substan-
 tia non est glandulosa 244.
 diaphragma 143. hemi-
 phæria 142. membranæ
 138. nates 144. nervorum
 paria 146. substantia 142.
 testes 144. valvula magna
 144. 145. ventriculi 143.
 144. anteriores aliquando
 glaciæ pleni reperti *ib.*
 Cerebri vulva 144. usus 147.
 Cervix 7.
 Cervicis uteri ostiola & ve-
 siculæ 105.
 Ceruminosæ glandulæ 167.
 Cerumen *ib.*
 Chorda Achillis 226. tym-
 pani 168. 178.
 Chordæ Villisii 139.
 Choroidea tunica 153. visus
 primarium organon se-
 cundum quosdam 314.
 Choroideus plexus 144.
 Chorion 109.
 Chyli cisterna 79. recepta-
 culum *ib.*
 Chylifera vasa 78.
 Chyliferus ductus 79.
 Chylopœa viscera 57.
 Cilia 151.
 Ciliare ligamentum 153.
 Ciliares processus *ib.*
 Circulatio pinguedinis 64.
 sanguinis in fœtu 133.
 Circulus arteriosus & ve-
 nosus in oculo 153.
 Cisterna chyli 79.
 Clavicula 40.
 Claustum palati 159.
 Clitoris 99.
 Coccygis os 35. musculi 222.
 Cochlea 19. 169.
 Colis 95.
 Collum 7. 135.
 Colli vertebra 32. musculi 205.

- Colon** intestinum 74. ejus
 valvula *ib.* valvulae con-
 niventes 75. ligamenta
 tria 74. appendiculæ adi-
 posæ *ib.*
Columella 159.
Concha 166.
Condylodes processus 25.
Conjunctiva tunica 152.
Cor 129. perpetuum mobile
 133. quale in fœtu 115.
 ejus arteriæ coronariæ
 130. 171. auriculæ 131.
 310. columnæ carnes 131.
 fibræ rectæ 311. lacertuli
 131. motus 133. septum
 131. tuberculum Lovveri
 negatur 131. 310. valvulae
 132. venæ coronariæ 130.
 earum orificia 132. ven-
 triculi 130. 131. horum
 dexter amplior sinistro
 310.
Coracoides processus 40.
Cornea tunica 152.
Coronale os 16.
Coronoides processus 25. 42.
Corporis humani externæ
 appellationes & divisio
 6. 7. tegumenta commu-
 nia 56.
Corpora cavernosa penis 96.
 sphæroidea morbosa non
 arguunt glandulas 234.
 276. striata 144.
Corpus callosum 143.
Corpus cavernosum orifi-
 cium vaginæ ambiens 101.
Highmori 92. luteum ova-
 rii 107. pampiniforme
 pyramidale *ib.* reticula
 Malpighii 58. 59. hu-
 color in Æthiope *ib.* V
 salvæ 166.
Corpuscula globosa cervi
 uteri 105.
Corticalis cerebri substa-
 tia non est glandulosa 2.
Costæ 36.
Cotyle 15.
Cotyledones 110.
Cranium 16. 138. ejus fur-
 ræ 21. ejus musculi
 ossium in fœtu conditi
 21. 115.
Cremaster musculus 92.
Crenacalami scriptorii 1.
Cribriforme os 20.
Cricoides cartilago 31. 1.
Crista galli 20.
Crista ulnæ 42.
Crus 7. 47.
Crura cerebelli 146. medu-
 llæ oblongatæ *ib.*
Crystallinus humor 154. ejus
 verus situs 315.
Cubitus 7. 41. ejus muscu-
 li 212.
Cuboides os 49.
Cuneiforme os 19.
Cuneiformia ossa tarsi 49.
Cutanæ glandulæ 60. p-
 pillæ 170.
Cutanei folliculi 61.
Cutaneum reticulum 58.
Cuticula 57.
Cuticula Æthiopum nigra
 57.

- Cutis 59. fulci s. lineæ 58.
 Cystica bilis 86.
 Cystica vasa 85.
 Cysticus ductus 84. 85.
 Cystis fellea 84.
D Artus 91.
 Dentēs 25. 26. fœtus 116.
 Diaphragma 123. 208. ejus
 arteriæ 172. 173.
 Diaphragma cerebri 143.
 Diaphysis ossis 13.
 Diarthrosis 53.
 Didymi 91.
 Differentiæ inter fœtum &
 adultum 114. ossium inno-
 minatorum utritusque se-
 xus 39. ossium 12.
 Digiti manuum 44. eorum
 musculi 215. auricularis
 digiti musculi 218. pedum
 50. eorum musculi 227.
 minimi dig. ped. muscu-
 li 230.
 Digitorum musculi multum
 variant 217.
 Diploe 16.
 Diverticula Nuckii 68.
 Divisio sceleti 15.
 Os forsum 7. ejus spina 31. hu-
 jus divisio *ib.* vertebræ 32.
 musculi 210.
 Os forsum manus 7. 44. pedis
 48.
 Ductus adiposi 70. 277. Bar-
 tholinianus 156. cholido-
 chus communis 84. chyli-
 ferus 79. cysticus 84. 85.
 cyst-hepatici Bianchi 288.
 Eustachii 18. 28. 168. ex-
 cretorius quid 10. pan-
 creatis 82. hujus inventor
ib. excretorii novi Vercel-
 lonii 135. 314. ex naso ad
 os, an apertus 165. 328.
 hepatico-cysticus 84. an
 in homine detur 287. he-
 paticus 84. lactiferi 118.
 Ductus Rivinianus 156. sali-
 valis Coschvitzianus est
 vena 326. Stenonianus 156.
 323. sub osse occipitis in
 pharyngis fornice muco-
 sus 157. 326. thoracicus 78.
 79. eum demonstrandi me-
 thodi 80. finem tegit val-
 vula semilunaris *ib.* cujus
 usus controversus 285.
 Vvarthonianus 156.
 Ductum lacrymalium ori-
 ficia 165.
 Duodenum intestinum 73.
 Duodena arteria 173.
 Dura mater 27. 139. 147. ejus
 processus 139. arteriæ 138.
 sinus 139. 147. 313.
E Levatores ani 75.
 Embryo 108.
 Eminentia pyramidales Vi-
 eussenii 146. olivares ejus-
 dem *ib.*
 Enarthrosis 53.
 Ensiformis cartilago 37.
 Epidermis 57.
 Epididymides 92. peculiari-
 ter constituti descriptio
 295.
 Epigastrica regio 7.
 Epiglottis 126.

Epiphyſis offis 14.
 Epiphyſium numerus 52. u-
 ſus in adultis 14. in infan-
 tibus *ib.*
 Epiploon 69. parvum Vvins-
 loi 277.
 Epistrophæus 33.
 Ethmoides os 20. ejus ca-
 vernulæ 164.
 Eustachii tuba 18. 28. 168.
 Excavationes nafaes 23.
 palatinæ *ib.*
 Excretorius ductus 10. pan-
 creatis 82. hujus inven-
 tor *ib.*
 Extremitates corporis 7. 39.
 45.
F Acies 7. 150.
 Falciformis processus
 139.
 Fallopii aquæductus 19. 28.
 Fallopiantæ tubæ 107. 302.
 Farciminalis membranæ 109.
 Fascia lata 223. 224.
 Fellea cyſtis 84.
 Fellea veſica 69. 84.
 Felleæ radices 84. 85.
 Femur 7. 45. 46. ejus muſc.
 223.
 Fenestra ovalis 18. 168. ro-
 tunda *ib.*
 Fibra 8. ejus differentiæ. *ib.*
 Fibre carnee ventriculi 278.
 cordis rectæ 311. muſculo-
 ſæ diverſitas 188.
 Fibula 47. 48.
 Fiſtula ſpiralis 125.
 Fluidæ partes 10.
 Fœtus 108. ejus membranæ

ib. ſitus in utero 113. ex-
 tra uterum reperti 30.
 articulationes. 116. offi-
 cranii 115. circulatio ſan-
 guinis 133. inter ipſum
 & matrem communis 30.
 cor quale 115. dentes 110.
 canalis venoſus 84. 11.
 115. differentiæ ab adu-
 to 114. nutritio 112. pe-
 os 306.
 Folliculus in quavis glan-
 dula 237.
 Folliculi cutanei 61. 260.
 Fons pulſatilis 17.
 Fontanella 17. 115.
 Foramen cœcum lingue 15.
 124. 161. ovale 115. 13.
 ejus uſus 307.
 Foramina narium 165. o-
 ſium cranii 26. maxillæ 29.
 Fornix 144.
 Foſſæ ſigmoideæ 17.
 Fovea ſinus venæ jugulari-
ibid.
 Frenulum labri ſuperior. 159.
 lingue 160. muliebri 99.
 præputii 95.
 Frontis os 16.
 Frontalis ſinus 164.
 Funiculus umbilicalis 112.
G Allinaginis caput 94.
 Ganglia nervorum 179.
 Garengot Splanchnologia
 monita circa illam 368.
 Genitalia mulierum 99. vi-
 rorum 91.
 Genu 7.
 Gingivæ 159.

inglymus 53.
 landula 10. 242. ejus definitio difficilis 231. definitio Boerhaavii expenditur 264. definitiones pleræque imperfectæ 231. habitus peculiaris asseritur 243. 261. ab ipso Hippocrate innuitur 269. glandulam quid veteres dixerint 236. 240. 241. glandulæ multæ nil fecernunt 239. glandularum differentiæ 245. glandulas non arguunt corpora morbosa sphæroidea 234.
 glandulæ arytænoideæ 127. axillares 258. bronchiales 128. 248. 251. Brunneri 73. quando optime conspiciantur 279. buccales 158. 248. ceraceæ Meibomii 248. cervicales 250. ceruminosæ 167. 248. compositæ 245. conglobatæ *ib.* conglomeratæ *ib.* congregatæ 246. Covvperi 98. 255. 297. cutaneæ 60. 259. 260. 274. cysticæ 254. dorsalis 252. ejus constitutio morbosa *ib.* epiglottidis 127. 250. Havcrianæ 258. hepaticæ 254. iliaca *ib.* ilei circa finem 74. inguinales 258. innominata 248. intestinales Brunneri & Peyeri 253. jugulares 250. labiales 158. 247. lacrymalis 25. 152. 248. laryngis 250.

lienares 254. Littrii 98. 255. linguæ 156. 162. 247. lumbares 254. mammarum in areolis 259. matri duræ & arachnoideæ interpositæ 247. maxillares 156. 247. mesaraicæ 77. 253. molares 157. 326. mucilaginosæ 15. 259. mucosæ 15. 248. Covvperi 98. Nuckianæ 158. nympharum 256. occipitales 250. odoriferæ Tyf. 95. 255. œsophagi 250. earum ductus excretorius Vercellonii 135. 313. omentales 255. orificii ventric. sinistri Vercell. 254. ossis frontis fovearum 247. Pacchioni 139. palatinæ 158. 248. pancreas 253. parotides 155. 249. peritonæi, an dentur 68. Peyeri 76. pinealis 147. 247. pituitaria 148. 248. placenta uteri an dentur 257. pleuræ an dentur 121. prostaticæ 255. renales 88. 253. sacrae 254. salivales 155. sebaceæ 61. cutis 60. 260. 273. Meibomii 151. 248. Valsalvæ 166. simplic. 245. sinuum duræ matris 247. solitariae 246. splenicæ 254. sublinguales 156. ductus 156. 323. thymus 250. in fœtu 115. thyroidea 128. 248. unica in homine 248. isthmus *ibid.* an sit nidus ovulorum vermi-

- minosorum *ib.* dubii usus
 247. tonsillæ 248. trachœ
 250. tunicæ pituitariæ
 164. Venæ portæ 254. ven-
 tric. 253. 278. vesicæ 254.
 vesiculæ felleæ 85. 255. ve-
 sic. feminalium 255. vete-
 ribus cognitæ, quæ 240.
 ureterum 89. 255. urethræ
 muliebr. 256. virilis 255.
 uteri an dentur 257. uvu-
 lar. 158.
 Glandulosum & vasculosum
 differunt 236. 240.
 Glans penis 96.
 Glene 15.
 Glissonii capsula 83.
 Globus & Glomer idem 245.
 Glottis 126.
 Gomphosis 25. 53.
 Gula 133.
 Gustus 170. ejus organum
 155.
H Abitus peculiaris glan-
 dulæ 243. 261.
 Harmonia 22. 53.
 Helix 166.
 Hemisphæria cerebri 142.
 Hepar 69. 83. in fœtu ma-
 gnum 115. non est gland.
 244. 289.
 Hepar uterinum 109.
 Hepatica bilis 86.
 Hepatico-cysticus ductus 84.
 Hepaticus ductus *ib.*
 Hepatis porta 83. tubercula
 in statu morb. qualia 290.
 Herophili torcular 139.
 Highmori antrum 23.
 Highmori corpus 92.
 Homoplata 40.
 Humerus 7. ejus musculi 21
 os 41.
 Humores oculi 154.
 Hydatides ovarii mulie
 106.
 Hymen tot. omnino exist
 297. in fœtu 115.
 Hyoides os 30. ejus muscu
 158. 198.
 Hypochondria 7.
 Hypogastrica regio *ib.*
I Ecur 83.
 Jejunum intestinum 7
 Ileum intestinum *ib.* os 3
 Iliaca regio 7.
 Incus 18. 168.
 Indicis musculi 217.
 Infundibulum 146. ad illu
 rima 144.
 Inguina 7.
 Innominata ossa 37. 38. co
 rum differentia in mare &
 femina 39. ligamenta 3
 Interosseum ligamentum 4
 Intestina 69. 72. crassa 7
 tenuia 73.
 Intestinorum structura 7
 fibræ annulares irregula
 res 281. longitudinales sub
 quærendæ 280. tenuiur
 rugæ *ib.* tunica cellulof
 Ruyschii 75. Albini 279
 differt a Ruyschiana *ib.*
 tunica villosa 75. 280. et
 villo-papillosa 281.
 Intestinum cœcum 74. colo
ib. duodenum 73. jejunum
ib.

ib. ileum *ib.* rectum 75.
 involucra ligamentorum ro-
 tundorum 68.
 is 153.
 chiatica regio 7.
 chium os 37.
 igulum 7.
 ialis apophysis 17.
 ialis ossa 23.
 iunctura ossium 53.
 Abra 158. horum supe-
 rioris frenulum 159.
 abra pudendi 99.
 abyrinthus 19. 169. ejus
 vestibulum *ibid.*
 acerti cordis 131.
 acrymalis caruncula 25.
 152. glandula *ib.* faccus *ib.*
 acrymalia puncta *ib.* ossa
 23.
 acrymalium ductuum ori-
 ficia 165.
 acætea vasa 9. 78. in pen-
 natis defunt 79.
 actiferi ductus 118.
 acuna 7.
 acunæ Graafii 102.
 amina spiralis Eustachii
 169.
 arynx 126. ejus cartilagi-
 nes *ib.* musculi 200. ossa. 31.
 sinus 127. ventriculi *ib.*
 ens crySTALLINA 154.
 ien 69. 86. an sit glandula
 87. 244. 291. ejus usus 292.
 igamentum 9. 35. annu-
 lare colli femoris 45. an-
 nulare manus 214. cilia-
 re 153. interosseum 41.

48. linguæ membranæ.
 161. Poupartii 67. 274.
 semicirculare Atlantis
 33. suspensorium 83. te-
 res, an teres 39. 45.
 Ligamenta duo ossium in-
 nominatorum 38. coli tria
 74. uteri, latum & ro-
 tundum 103. rotundorum
 involucrum 68.
 Linea alba 66.
 Lingua 155. 160. ejus fora-
 men cæcum 157. 324. fre-
 nulum 160. ligamentum
 membranaceum *ib.* linea
 mediana *ib.* musculi 162.
 199. nervi 161. papillæ
 nerveæ 170.
 Liquor pericardii 129.
 Lumbi 7. eorum musculi
 210. nervi 181. vertebræ
 34.
 Lunula 62.
 Lutea corp. glandiformia
 301.
 Lympha 80.
 Lymphatica vasa 9. 80. in-
 ventores illorum *ibid.*
M Ala 7. ejus ossa 23.
 Malleoli 7.
 Malleus 18. 168. ejus apo-
 physes 18. musculi 168.
 Malpighii rete vasculos. 125.
 Mammæ 117. harum corpo-
 ra globosa Nuckii 118.
 glandulæ areolarum 259.
 Mamillaris apophysis 17.
 Manus extrema 43.
 Manus dorsum 7. 44. vola
ibid.

ibid. muscul. 214.
 Mastoidea apophylis 17.
 Mater dura 54. 138. pia 141.
 Matrix 103.
 Maxilla 22. inferior 25.
 Maxillaria ossa 23.
 Maxillares sinus 164.
 Meatus auditorius 28. 166.
 fœtus 116.
 Meconium 113.
 Mediastinum 119. ejus interstitium cellulofum *ib.* 308.
 Meditullium 16.
 Medulla 9. 55. oblongata 145. ejus crura 146. spinalis 149. ejus tunica ligamentosa & cellulosa *ib.*
 Membrana, quid 9. adiposa 57. 63. allantoides f. farciminalis 109. musculorum communis 65. mucosa narium 164. oculi semilunaris 152. papillaris Helvetii 281. pituitaria Scheneideri 164. subpituitaria 165. tympani 167. ejus foramen *ib.* 329.
 Membranæ fœtus 108.
 Membranula meatum auditorium in fœtu claudens 116.
 Menstruorum fontes 104. 300.
 Mentula 95. muliebris 99.
 Mesaræum 77.
 Mesenterium 69. 76.
 Mesocolum 77.
 Metacarpus 7. 43.

Metatarsus 7. 49.
 Mons veneris 99.
 Motus animalis, involuntarius, mixtus, naturalis voluntarius 188.
 Motus tonicus 187.
 Musculus 9. quid 185. ejus partes *ibid.*
 Musculi antagonistæ 18
 focii *ib.* actio 185. diversæ sententiæ 186. simplices 188. compositi *ib.* a dominis 66. abductor auric. dig. 218. annularis dig. 217. indicis *ib.* medii digiti *ib.* pollicis 216. pedis 227. proprius digiti minimi pedis 230. acceleratores 219. urinæ 220. adductor auric. dig. 217. femoris triceps 224. annularis 217. medii digiti man. *ib.* pollicis man. *ib.* ped. transversalis 229. anconæus 213. anconæus 220. anconæus 212. annuens 204. ary-arytæ noides 200. ary-epiglotticus 201. antithenar pollic. man. 217. ped. 228. auris 166. externæ 192. auricularis digiti 218. azygos Morgagni 204. basioglossus 99. bibitorius 191. biceps 212. tibiæ 224. bicornis 214. ventricornis pollicis 216. biceps venter 198. brachii 211. brachialis internus 213. externus *ib.* brevis cubiti

ti *ib.* radii *ib.* buccinator
 195. caninus *ibid.* capitis
 204. carpi 214. ceratoglossi
 199. cerato-staphylini 347.
 cephalopharyngæi 201.
 coccygæus 222. colli 205.
 complexus *ib.* constrictor
 labror. 195. orbicular. na-
 si 197. coracobrachialis
 211. coracohyoides 198.
 cranii 137. 189. cremaster
 92. 218. crico-arytænoides
 lateralis 200. posticus *ib.*
 crico-pharyngæus 202.
 crico-thyroidæus 200. cro-
 taphites 198. cruralis 225.
 cubiti 212. cucullaris 207.
 deltoides 212. dentatus
 major anticus 207. denta-
 tus minor *ibid.* depressor
 palpebr. inf. 190. detrusor
 urinæ 222. digastricus
 198. ejus trochlea *ib.* digi-
 torum manus 215. mul-
 tum variant 217. digiti
 medii manus *ibid.* annu-
 aris *ib.* auricularis 218.
 digitorum pedis 227. digi-
 ti primi ped. 229. medii
 2. tertii 230. minimi *ib.*
 dilat. nasi 197. posticus
 rethræ 219. dorsi 210. la-
 tissimus 212. longissimus
 10. elevator scapulæ 207.
 labri infer. 196. palpebr.
 super. 190. urethræ San-
 or. 220. epiglottidis at-
 tollentes & deprimentes
 or. erectores penis 219.
 extensor auric. dig. 218.
 extensor communis 215.
 lumborum, dorsi, & colli
 209. 210. dig. ped. longus
 227. brevis *ib.* sc. indicis
 217. extensor lumborum
 & dorsi communis 210.
 pollicis ped. longus 228.
 brevis *ib.* fascia lata 223.
 224. femoris 223. flexor
 poll. ped. longus 228. bre-
 vis *ib.* frontales 189. ga-
 strocnemius 226. gemini
 duo 223. genioglossi 199.
 genio-hyoides *ib.* glutæi
 223. glosso-pharyngæi 202.
 glosso-staphylini 203. gra-
 cilis 225. helices 193. hu-
 meri 211. humilis 191.
 hyo-epiglottæi 201. hyo-
 thyroides 200. hyoidis of-
 fis 158. 198. hyo-pharyn-
 gæus 202. hypothenar 217.
 iliacus 223. incisorius su-
 perior & inferior 196. in-
 dicator 217. indicis digi-
 ti *ib.* indignatorius 191.
 infraclavicularis 212. infra-
 spinatus *ib.* intercostales
 119. 208. interossei man.
 216. 350. digit. ped. 227.
 229. interspinales colli
 206. intertransversales *ib.*
 lumborum 210. interver-
 tebrales 207. intracosta-
 les Verhey. 209. labrorum
 195. laryngis 200. leva-
 tores ani 220. minores
 Riolani & Dougl. 221. le-

vatores costarum 208. lingua 162. 199. lividus 223. longus & brevis s. bicornis 214. longus colli 206. cubiti 112. radii 213. lumborum 210. lumbricales 215. 349. digit. ped. 227. mallei 168. 194. manus 214. masseter 198. mastoideus 204. maxillæ inferioris 197. membranofus 223. 224. myloglossus 199. mylo-hyoides 198. mylo-pharyngæus 202. myrtiformis nasi 197. nasi 196. obliqui oculi 191. obliquus major cap. 205. minor *ib.* obturatores interni & externi 224. occipitales 189. oculi 152. 191. septimus brutorum 192. œsophagæus 202. orbicularis labror. 195. palpebr. 190. ossis coccygis 222. hyoidis 198. palato-staphylinus 204. palmæ 215. palmaris *ib.* patientiæ 207. pectinæus 223. pectoralis major 119. 212. minor 207. pedis extremi 226. penis 218. perforans 215. dig. ped. 227. perforatus 215. digit. ped. 227. peronæus anticus 226. posticus *ib.* pharyngis 201. pharyngo-staphylinus 203. plantaris 226. platysmamyoides 192. 197. pollicis extēfor 216. flexor *ib.* multum variant 217.

poplitæus 225. profundus 215. projector urethræ 220. prostaticarum Santor. 211. psoas magnus 223. parvus 211. pterygoides externus 198. internus *ib.* pterygo-pharyng. 202. pterygo-staphylinus 203. pyramidalis nasi 197. pyriformis 223. quadratus 196. femoris 223. lumborum 210. radii 213. radiæus externus 214. radii 213. rectus oculi 191. rectus lateralis c. 205. major anticus 204. posticus 205. rectus minor anticus & posticus 204. 205. rectus tibiæ 222. respirationis 208. rhomboides 207. rotatores externi & interni 224. rotundus major & minor 212. rotundus radii 212. sacrolumbaris 210. sapingopharyng. 202. sapingostaphylinus 203. scapularius 224. scalenus 209. scapulæ 207. semimembranofus 225. seminervofus *ib.* semispinosus 210. ferratus major anticus 207. 209. minor anticus 207. posticus inf. 209. superficialis *ib.* solaris 226. spheno-staphylinus 203. sphincter ani 221. vaginæ uteri 222. vesicæ *ib.* splenii 205. stapedis 168. 194. sterno-hyoides 199. sterni thy-

thyroides 200. stylo-glossus 199. stylo-hyoides *ib.* stylo-pharyng. 201. subclavius 209. sublimis 215. superbus 191. superciliorum corrugator 190. supercostales breves & longi Verheyeni 208. supra-spinatus 211. tarsi 225. temporalis 198. teres maj. & min. 212. thenar 216. pollicis ped. 228. thyro-arytænoid. 200. thyro-pharyng. 202. thyro-staphylinus 203. tibiæ 224. tibialis anticus 226. posticus 108. tragi & anti-tragi 193. transversales & spinales colli 206. transversi urethræ 219. trapezius 207. triangularis labr. 196. sterni 209. urethræ 219. triceps brachialis 213. trochlearis 191. tubæ novus Vals. 204. vaginalis gulæ 203. vastus internus & externus 225. ulnaris externus 214. urethræ virilis 219. uteri novus orbicularis Ruyschii 300. uvulæ 203. zygomaticus 195. musculor. denominatio 188. numerus 189. membrana communis 65. musculor. fibræ diversitas 188. myologia 56. 185. ejus ordo 189.

Myrtiformes caruncule 101. **N** Afus, Nares 164. ejus ossa 163. septum 23. 24. 163. sinus 164. cartilagine 163.

Nasales excavationes 23. apophyses inferior & superior *ib.*

Nasalis canalis 30.

Narium foramina 165. tunica mucosa 164. sinus *ib.* an ductu quodam cum ore communicent 165.

Nates cerebri 144.

Naviculare os 49.

Nervus 9. 177.

Nervi quotuplices sint 178. eorum ortus incertus 345. vera sunt vascula 182. cerebri 146. 178 cervicis 180. dorsi 181. lumborum *ibid.* ossis sacri 182. spinales 150. 180.

Nervorum ganglia 179. plexus *ib.* usus 185.

Nervus abducens 179. accessorius Vvillis. 181. auditorius 170. 179. ejus canalis 19. 169. portio dura & mollis 179. distributio 334.

Nervi brachiales 180.

Nervus cerebri X. Vvillis. 180. 346. cruralis 181. diaphragmaticus 180. gustatorius 178. ejus rami insigniores *ibid.* intercostalis 179. 180. ejus origo inconstans 345. ischiaticus 181. lingualis 182. oculor. mo-

torius 178. ejus divisio *ib.*
 olfactorius 165. 178. opti-
 cus *ib.* ejus insertio 322.
 thalami 144. patheticus
 178. recurrens 180. spina-
 lis accessorius 146. 179. 181.
 vagus 5. parvagus 179.

Nevrologia 56.

Nuckii diverticula 68.

Nymphæ 100.

Occiput 7. ejus musc.
 189.

Oculus 151. ejus anguli f.
 canthi 151. bulbus 152. ca-
 mera duplex 153. 154. hu-
 mores 154. orbita 274. tu-
 nicæ 152. musculi 151. 191.
 membrana semilunaris
 152. circulus arteriosus &
 venosus 153. nervi 155.

Odoratus organon 163.

Odoriferæ glandulæ Tyf. 95.

Oesophagus 133. ejus verus
 situs 372.

Olecranus processus 42.

Omentum 69. 70. ejus aper-
 tura naturalis Vvinsloi
 70. 276.

Orbita oculi 24.

Orificium vaginæ uteri 101.
 uteri internum 104.

Os 10. basilare 19. bicornè
 30. 158. brachii 40. calcis
 49. caudæ f. coccygis 35.
 coronale 16. cribriforme
 20. cribrosum *ib.* cuboides
 49. cuneiforme 19. ethmoi-
 des 20. ejus cavernulæ 164.
 frontis 16. humeri 41. hy-

oides 30. 158. ileum 37.
 ischium *ibid.* linguale 30.
 158. multiforme 20. occi-
 pitis 19. orbiculare audi-
 tus 18. pectinis 39. publi-
ib. sacrum 34. 38. scapho-
 des 49. sphenoides 19. vo-
 mer 24. ypsiloides 30.

Ossa bregmatis 17. cranii i
 infantibus recens nati
 qualia 21. cuneiformia 49.
 fœtus 115. 116. innomina-
 ta 37. eorum ligamenta
 38. differentia in mare &
 femina 39. jugalia 23. la-
 crymalia *ib.* laryngis 37.
 malæ 23. maxillaria *ibid.*
 nasi 20. 163. palati 24. pa-
 latina antica male sic de-
 scribuntur 23. parietali-
 17. pectoris 36. petrosa 17.
 sacrum & ilium an in pa-
 tu disjungantur 38. sesa-
 moidea 50. ad ea pertinen-
 tia varia historica 270. ubi
 inveniantur 50. 227. ossi
 principitis 17. spongiosa in
 fer. 23. super. 20. squamo-
 sa 17. temporum *ib.* tho-
 racis 35. trunci 31. turbu-
 nata f. spongiosa 20. 27.
 eorum inæqualitates 16.
 verticis 17. unguis 27.
 zygomatica *ib.*

Ossium cavernulæ & cav-
 itates 15. consideratio ana-
 tomica & chemica 12. di-
 ferentiæ *ib.* junctura 5.
 numerus 51.

Os

- uteri externum 101. internum 104.
fficula auditus 18. 168.
Vvormia. 21.
steologia 11.
stiola cervicis uteri 105.
varium 106.
varium novum quorundam 105.
varii corpora lutea 107.
vesiculæ an vera ova 301.
hydatides 106. novi Nabothiani vesiculæ an glandulæ 257.
viductus avium 108.
ula mulierum 106. 301.
verminosa Vercellonii 248.
Alatum 159. ejus claustrum f. velum *ib.* ossa 4. antica male sic describuntur 23.
pebræ 151. earum tarfi *ib.*
mpiniforme corpus 92.
creas 81. 253. ejus ductus excretorius 82. inventor ejusdem *ib.*
creas Afelii 77.
niculus carnosus 65.
illa 117.
illæ cutaneæ 170. pyramidales 60. ventriculi 278.
astatæ 92.
otides 155.
tes compositæ, continentes, continentales, diffimiles, organice, similes, simplices ad sensum 8. fluidæ 7. 10. solidæ 7.
us, ejus tempus & mo-
- dus naturalis 114.
Patella 46. cui inhæreat 225.
Pedes hippocampi 144.
Pedunculi cerebelli 145.
Pelvis 38. 69.
Pelvis renum 88.
Penis 95. ligamenta lateralia 297.
Pericardium 128. ejus liquor 129.
Pericardii concretio cum corde morbosa *ib.* an glandulas habeat *ib.* 245. 275.
Perichondrium 56.
Pericranium 54. 137.
Perinæum 7. 99.
Periostium 54.
Peritonæum 67. an glandulas habeat 68. 245. 275.
Perone 48.
Pes 7. 45. extremus 48. ejus digiti 50. dorsum 48. planta *ibid.*
Phalanga 44.
Pharynx 133.
Philtrum 7.
Pia mater 141. 149.
Pilus 106. 137. ejus bulbus 61.
Pinguedo 9. 57. 63. ejus circulatio 64.
Pinna auriculæ 166.
Placenta 109.
Planta pedis 7.
Platisma myodes 192. 197.
Pleura 119. 121. an glandulas habeat *ib.* 245. 275.
Plexus choroideus 144.
Plexus non habet glandulas *ibid.*

- Plexus nervorum 179.
 Pollex 44. ejus musculi 216.
 228.
 Pomum Adami 7. 126.
 Pons Varolii 145. 146.
 Pori 58. horum valvulæ *ib.*
 Porta hepatis 83.
 Præcordia 7.
 Præputium 95. ejus frenu-
 lum *ib.*
 Priapus *ibid.*
 Processus ossis 13. ejus syno-
 nyma & usus *ib.* anconæus
 42. ciliares 153. condyloi-
 des & coronoides maxillæ
 infer. 25. coracoides 40.
 coronoides ulnæ 42. duræ
 matris 139. falciformis *ib.*
 mamillaris 17. olecranus
 42. peritonæi 68. annulus
 pro transitu ejus 66. ver-
 miformis cerebelli 145. in-
 testini cæci in fœtu 115.
 Processuum pterygoideorum
 apophysis, corniculum di-
 cta 347.
 Prolabia 158.
 Prominētia annularis Vvil-
 lifii 145.
 Prosector 1.
 Prostata 94.
 Prostata muliebres Bartho-
 lini 103.
 Protuberantia annularis
 Vvillifii 146.
 Protuberantiæ orbiculares
 cerebelli *ib.*
 Pterygoides apophysis 20.
 Pubes 7.
 Pudendum muliebres 99.
 Pulmo 124. in fœtu qualis 11.
 Pulsatilis fons 17.
 Puncta lacrymalia 152.
 Pupilla 153. ejus sphincter *ib.*
 Pylorus 71.
 Pyramidale corpus 92.
 Pyramidales papillæ 60.
R Adices felleæ 84. 8.
 Radius 41. 42.
 Radix unguis 62.
 Raviana apophysis 18.
 Receptacula cutanea 61.
 Receptaculum chyli 79. i
 homine an detur 284.
 Rectum intestinum 75.
 Regio epigastrica 7. hypog-
 strica *ib.* iliaca *ib.* ischi-
 tica *ib.* umbilicalis *ib.*
 Renales glandulæ 88.
 Renes 69. 87. eorum pelv-
 88. an sint glandulosi 23
 245. 293. vesiculosi Litt-
 examinantur 355. in fœ-
 quales 115. succenturia
 88. quales in fœtu 89. 11
 usus dubius 293.
 Rete 70. mirabile 148. va-
 culosum pulmonum 125.
 Reticulum cutaneum 58.
 Rhachis 31.
 Rima ad infundibulum 14.
 Rotula 46.
 Rugæ intestinorum tenuium
 280. vaginæ 102.
S Accus jugularis 175. 1
 crymalis 25. 152.
 Salivæ quantitas 322.
 Salivales glandulæ 155. e-
 rum

rum ductus 156. ductus Co-
schwitzianus est vena 326.
anguinis circulatio in fœtu
133. inter fœtum & ma-
trem communicatio 304.
arcologia 11. 56.
cala tympani, vestibuli
19. 169.
capha 166.
capula 40.
celeton 11. 15. ejus divisio *ib.*
clerotica tunica 153.
crobiculus cordis 7.
crotum 91.
cretiones non supponunt
glandulas 233. nec follicu-
los 239. fiunt ex laterali-
bus canaliculis arteria-
rum *ib.* non ex venis nisi
venæ portæ *ib.*
ecundinæ 108.
ella equina s. turcica 19.
eptum cordis 131. lucidum
143. narium 23. 163. trans-
versum 164. scroti 91.
famoidea ossa 50.
gmoideæ fossæ 17.
nciput 7.
nus ossium capitis, fronta-
les, maxillares, sphenoi-
dei, ethmoidei 164. duræ
matris 139. 147. 313. laryngis
127. venæ portæ 84. 177.
hinder ani 75. gulæ 202.
pupillæ 153. vaginæ 103.
222. vesicæ 91.
igelii lobulus 83.
ina dorsi 31. ejus divisio *ib.*
irituum viæ sunt nervi

182. 183.
Splanchnologia 56. Garen-
geoti, monita circa illant
358.
Splen 86.
Spondyli 32.
Spongiosa ossa inferiora 23.
superiora 20.
Squamosa ossa 17.
Stapes 18. 168.
Stenonianus ductus 156.
Sternum 37.
Stomachus 71. 133.
Structura intestinorum 75
nervorum 182.
Styloidea apophysis 17. 20.
Sulci cuticulæ & cutis 58.
Supercilia 151.
Suram qui musc. faciant 226.
Sutura 53. scroti 91.
Suturæ cranii 21. usus 22.
Symphysis 54.
Synarthrosis 53.
Synchondrosis 54.
Synnevrosis *ib.*
Syntaxis ossium 53.
Synthesis *ib.*
Syssarcosis 54.
T Actus organon 61. 170.
Talus 49.
Tarsus 7. 49. palpebræ 151.
Tegumenta abdominis 65.
communia corporis hu-
mani 57.
Tempora 7. horum ossa 17.
Tendo 9. Achillis 49.
Testes 91. non sunt glandu-
læ 244. muliebres 106. ce-
rebrî 144.

- Testiculi elevator 92.
 Testium substantia qualis 294. tunica albuginea divisibilis 295.
 Thalami nervorum opti. 144.
 Thoracicus ductus 78. 79. ejus valvulæ 80.
 Thorax 7. 116. ejus vertebræ 33. partes 116.
 Thymus 121. qualis in fœtu 115.
 Thyroides cartilago 31. 126.
 Tibia 7. 47.
 Tonfillæ 160.
 Torcular Herophili 139.
 Trachea 125. 127.
 Tragus 166.
 Transitus e naribus ad palatum Stenonianus 29.
 Triquetra ossicula 21.
 Trochanter 46.
 Trochlearis musc. osculi 191.
 Trochoides 53.
 Truncus 7.
 Tuba Eustachii 19. 168. Fallopiana 107. 302. ejus corpus cavernosum 107.
 Tuberculum Lovveri 131. negatur *ib.* 310.
 Tubercula morbosa hepatis 290.
 Tubuli lactiferi 118. urinarii Bellini 88.
 Tumores cystici non in cute, sed sub cute 268.
 Tunica 9. adnata. s. albuginea 152. arachnoides 147. oculi 155. arteriarum 336. cellulosa ventriculi 278. choroidea 153. an visus primarium organon 314. conjunctiva 153. cornea *ib.* intestinorum cellulosa Ruyschii 75. intestinorum cellulosa Albini 279. villosa 75. est villo-papillosa secundum Ruyschium 28. ligamentosa & cellulosa medullæ spinalis 149. retinæ 154. visus organum primarium 314. reticularis Malpighii linguæ 162. papillaris nervosa linguæ 162. sclerotica 153. vaginalis 92. villosa ventriculi adhibetur 278. uvea 153.
 Turbinata ossa 20.
 Tympanum 167. ejus cavitas 18. 168. chorda *ib.* membrana 167. foramen hujus d. biæ est existentia 167. 32. schala 19. 169.
 Tysonis glandulæ odorif. 9.
Vagina uteri 102. ejus orificium 101. sphincter 222.
 Valvula cerebri magna 145. coli 75. pylori 71. f. milunaris ductus thoracici finem regens 80. contra-versi usus 285. truncus venæ cavæ inferioris 170. putatur valvula reticulata Eustachii 343. 344. insignis est in fœtu 115.
 Valvulæ conniventes coli 75. jejuni 73. cordis mitrales, tricuspidales & semilunares

- lunares 132. ductus cystici, quales, & a quibus admissæ 286. 287. semilunares aortæ 171. vasorum lacteorum & ductus thoracici 79. 80. lymphaticorum 81. venarum semilunares 177. desunt in vena portæ & pulmonali *ib.*
- Vas deferens s. ejaculatoriū 93. mulierum 106. lacteum 9. lymphaticum *ib.*
- Vasa adiposa 64. biliaria 84. brevia 72. 177. chylifera 78. cystica 85. gastrica 71. lactea 78. in pennatis desunt 79. in homine visa 282. ex duodeno prodeuntia 283. eorum inventores 282. lymphatica 80. a Nuckio ex brutis vel ingenio homini appicta 286. nervo-lymphatica Hovii 319. phrenica 123. umbilicalia 68. III.
- Vasculosum & glandulosum an differant 237. 240.
- Vasculosæ partes facile transeunt in vesiculas 237. 238.
- Velum palati 159.
- Vena 8. 174. primariæ tres 176. earum structura 177. axillaris 176. azygos 175. basilica 176. brōchialis 125. 175. 310. cava 130. 175. cephalica 176. 177. coronaria cordis 130. 175. ventriculi 179. cruralis 177. diaphragmatica sup. 175. duodena 177. epigastrica 176. epiploica 177. gastrica *ib.* gastro-epiploica *ib.* hæmorrhoidalis externa 176. interna 177. hepatica 176. hypogastrica *ib.* jugularis externa & interna 175. internæ saccus s. diverticulum *ib.* mammaria 176. mediana *ib.* mediastina 175. muscularis 176. pancreatica 177. poplitæa 177. portæ 177. ejus ramus dexter & sinister *ib.* sinus 84. 177. valvulis caret *ib.* pudenda 176. pulmonalis 130. 175. valvulis destituitur 177. sacra 176. salvatella *ibid.* saphæna 177. spermatica dextra & sinistra 176. splenica 176. 177. subclavia 175. furialis 177. vertebralis 175.
- Venæ adiposæ 176. atrabiliaræ *ib.* cerebri 147. coronariæ cordis 130. cysticæ 177. diaphragmaticæ inf. 176. hæmorrhoidales externæ *ib.* hepaticæ *ib.* iliacæ *ib.* intercostales 176. lumbares *ib.* mesaraicæ 177. musculares 176. œsophagæ 175. pancreaticæ 177. phrenicæ infer. 176. raninæ 175. renales 176. scapulares *ib.* triangulares s. sinus 139. vertebralis ingressus in cranium 342.
- Venarum cordis orificia 132.
- Ventriculi cerebri 143. an-

- teriores glacie pleni re-
 perti *ib.* cordis 130. dexter
 amplior 310. laryngis 127.
 Ventriculus 67. 71. ejus fibræ
 carneæ 278. an habeat tu-
 nicam villosam *ibid.*
 Vermiformis appendix 74.
 Vertebræ 32.
 Vertebræ colli 32. dorsi f.
 thoracis 33. lumborum 34.
 Vertex 7. ejus ossa 17.
 Vesica 90. ejus musculi 222.
 tunica cellulosa & mus-
 culosa 294. qualis in fœ-
 tu 115.
 Vesicula an pars necessaria
 glandulæ 237. fellea 84.
 Vesiculæ cervicis uteri 105.
 morbosæ non arguunt
 glandulas in statu sano
 236. seminales 94. harum
 ductus in urethram quot
ib. 296. sem. mulierum 105.
 Vespertilionum alæ 106.
 Vestibulum labyrinthi 19.
 169.
 Vestibuli Scala 19.
 Vibrissa 163.
 Visus primum organum
 314.
 Vitreus humor oculi 157.
 Ulna 42. ejus crista *ib.*
 Umbilicus 66. ejus vasa 68.
 III. arteriæ quousque ca-
 væ maneat 69.
 Umbilicalis funiculus 112.
- regio 7.
 Unguis 10. 62. ejus ape-
ibid.
 Unguis ossa 23.
 Unio 54.
 Vola manus 7. 44.
 Vomer 24.
 Vomitus a quibus muscu-
 lis 275.
 Urachus 68. 109.
 Ureteres 87. 89. horum glan-
 dulæ 89.
 Urethra 91. 96. virilis bül-
 bus 97. finis *ibid.* mulie-
 bris 101.
 Urinarum tubuli Bellini 88.
 Uropœa viscera 57.
 Uterinum hepar 109.
 Uterus 103. ejus cervici
 corpuscula globosa 103.
 crassities in gravidis 298.
 ligamenta 103. musculi
 orbicularis novus Ruyf-
 chii 110. 300. os exter-
 num 101. internum 104.
 vagina 102.
 Uva f. uvula 159.
 Uvea tunica 153.
 Vulva cerebr. 144.
 Xiphoides cartilago 37.
 Ypsiloides os 30. 158.
Zonæ sonoræ Valsalva
 169.
 Zootomia 1.
 Zygomatice ossa 23.
 Zygomatice processus 17.

LAURENTII HEISTERI

COMPENDIUM

INSTITUTIONUM

SIVE

FUNDAMENTORUM MEDICINÆ,

ui adjecta est Methodus de Studio Medico optime
Instituendo & Absolvendo una cum Scriptoribus
Medicinæ studioso hodie maxime necessariis.

PRÆFATIO.

Ulginti, & quod excedit, præterlapſi ſunt anni,
cum cogitaverim, Studioſis Medicinæ brevi apto-
e quodam compendio fundamentorum ſive inſtitutio-
um Medicinæ opus eſſe, ex quo non ſolum prima,
præcipua artis ſalutaris fundamenta addiſcere, ve-
m etiam eo in ipſo, levi negotio, & brevi temporis
atio, illa repetere poſſint: ut ſemper perſpicua totius
biliffimæ hujus ſcientiæ idea animis, ac memoriæ eo-
m inhæreat, atque poſtea in cæteris ejus ſpecialibus
rtibus tanto meliores progreſſus facere valeant. Ple-
que vero inſtitutiones Medicæ cum ita mihi compa-
tæ viderentur, ut hoc tam facile tyrones Medicinæ
iis obtinere non potuerint, jam dudum brevem ali-
am ejuſmodi delineationem in chartam conſeci, eam-
e auditoribus meis haud ſine fruſtu ſæpius explicavi.
Hanc autem ob rem *prolixiores inſtitutiones* medicas,
quibus *Phyſiologia*, *Pathologia*, aliæque Medicinæ
artes uberius explicantur, minime damno; verum
tius lubens proſiteor, eas, præſertim quæ bene, &
n ex fictis, ſive non probatis, ſed potius ex genui-
anatomicis, phyſicis, & mechanicis principiis con-
ſcri-

Scriptæ sunt, quam commodissime cum his conjungi vel etiam iis cum fructu subjungi posse.

Præterea hocce compendium etiam quam utilissimum deprehendi *Medicinæ candidatis*, qui ob honorem doctorum adipiscendos examinibus solemnibus præse sistere debebant. In his sæpe observavi, quod non quam ultimis studiorum temporibus Medicinæ, quam vocant practicam, diligenter operam navaverint; tamen in examinibus etiam de primis fundamentis definitionibus, divisionibus, objecto, fine Medicinæ ac speciatim physiologiæ, pathologiæ, variarumque aliarum ejus partium cum interrogarentur, fundamentorum interea, quæ initio & primum ex prolixis institutionibus, & sine adminiculo alicujus compendii didicerant, fere vel omnium, vel maximæ eorum partes rursus obliti fuerint; aut saltem adeo incerti vacillarent, ut, nisi hæc prius fundamenta cum ipsis repererentur, quid respondendum fere prorsus ignorarent.

Prolioxiores institutiones repetere, easque breviter, quod ipsis haud raro concessum erat, memoriter rursus mandare, sæpe itinera, aut negotia valde urgentia, aliæque causæ, vel res circumstantes prohibebant; imo sæpe, quia animus practicis rebus erat intentus de iis vix amplius cogitabant. Ii vero, qui secundum breves hæc meas institutiones edocti erant, aut scilicet ex his tabulis, quas cum ipsis per aliquot dies communicaveram, prima Medicinæ principia repetierant, ut plurimum in examinibus bene steterunt, atque de fundamentis Medicinæ apte responderunt, totiusque ejus ideam quasi præ oculis semper habuerunt.

Has igitur ob causas olim, ut dixi, hocce institutum compendium, & quidem ad ductum *Propylæi, dogmatum Medicinæ generalium* celeberrimi atque præstantissimi quondam Medici *Jac. Pancrat. Brunoni* mei in Academia Altorfina in munere professorio a recessoris, ubi hi libri ubiati erant, in forma concinnarum tabularum conscripsi, eisque, qui meæ se crediderant informationi, describendum dedi; & quod bre-

revisissimis, aut verbo quasi subinde tantum indicavi, prolixiori sermone in prælectionibus explicavi, atque ubi plura hac de re, ut verbi gratia in rebus physiologicis, aut pathologicis invenire, aut legere optime possint, indicavi. Quo sæpe factum est, ut excitationis ingenii adolescentes aliis prolixioribus institutionibus prorsus haud indiguerint, vel eas propria diligentia intellexerint; alii vero, qui tardioris ingenii erant, tanto melius deinde, faciliusque ampliores intelligere, et comprehendere valuerint.

Quoniam igitur hunc laborem adhuc multis Medicinæ tyronibus, & candidatis haud inutilem esse existimo, illum nunc tandem emendatiorem atque auctiorem, nonnullorum hortatu, typis excudendum boni publici causa judicavi. Qui vero etiam simul & aliis viris eruditis magni ingenii servire potest, qui systema totius Medicinæ aliquam ideam in brevi conspectu, ut dicunt, in nuce quasi desiderant: dum hic unum in tabula cujuscumque partis Medicinæ, quæ in institutionibus pertractatur, ut physiologiæ, pathologiæ &c. delineationem uno quasi intuitu perspicere & excipere, Medicinæ vero ac Medici descriptionem, ejus officium, brevem denique Medicinæ etiam historiam, etas præcipuas, & divisionem paucissimis in foliis exolegomenis perspicere queant. Quia vero hisce in tabulis vocabula, & termini, quos vocant technicos, explicandi, atque explicandi sunt, sermonis latini putat sæpe observari non potuit.

Ut vero non tanto magis etiam iis, qui Medici non sunt, hoc compendium usui esse possit, in parte *Hygienes*, quæ sanitatis conservandæ rationem docet, pag. 5. *regulas*, quibus hoc potissimum obtinetur; in hac quo etiam & *Therapeutice*, quibus morbi imminentes avertuntur, pag. 449. præcipuas addidi: de quibus certum sum, illos, qui eas bene observant, aliis prolixioribus libris diæteticis fere carere, & a morbis quam primis se egregie præservare, tuerique posse.

Ita & parti *pharmaceuticæ* & *chirurgicæ* præcipuas cau-

cautelâs, axiomata, & aphorismos quasi, hic adjectis quæ in manuscriptis meis tabulis olim non erant; quæ vero futuris Medicis practicis haud exiguo usui, dum expertus hic loquor, esse poterunt.

Denique, quamvis nonnulli præstantissimi Medici methodum sive rationem, quomodo studium medicum optime instituti & absolvi debeat, tradiderint, ut Gal. Bartholinus, Laurenbergius, Sennertus, Petrus Castellus, Lindenius, Jo. Rhodius, Georg. Francus, aliique tamen quia eorum scripta jam vetustiora sunt, quam ut ad seculi nostri genium, quod infinitis observationibus, & inventis, omnibus in partibus valde auctum est, atque longe alios aptioresque libros suppeditare accommodari rite queant, oleum & operam meam mihi perdidisse existimavi, si talem methodum etiam hinc indicarem juvenibus, quæ hisce temporibus mihi maxime accommodata, & utilis videtur; ut sic in studio hoc, quod revera difficillimum, tanto facilius egregiè profectus facere atque simul præstantiores, utiliores & maxime necessarios libros una cum ordine studii medicum rite addiscendi cognoscere possint. Quam causam etiam brevem indicem eorum scriptorum secum in fine adjeci, quos hodie Studiosis Medicinæ maxime necessarios esse reputavi: cum mea quidem sententia, magna pars sapientiæ, atque eruditionis in quavis scientia est cognovisse, & nosse optimos scriptores, ne tyrones minus utilibus tempus terant, atque sic difficilius vel quandoque nunquam ad scopum perveniant, Hippocrate teste, Sect. I. Aphor. I. *Ars longa, vita brevis*. Difficulus vero, imo vix, atque vix quidem, præstantiores auctores sine offensione multorum aliorum, qui eodem in numero esse voluerunt, indicari possunt. Interea tamen nihil mihi antiquius esse reputavi, nihilque gratius, quam si modo commoda Studiosorum Medicinæ, aliorumque me hoc ipso juvasse, ac promovisse a prudentioribus intellexero.

*Prolegomena Institutionum Medicarum,
sive Medicinæ.*

I. Q. Quid est Medicina?

R. Est Scientia sive Ars, sanitatem hominis [amissam] recuperandi, & præsentem conservandi.

2. Quodnam est Objectum Medicinæ?

R. Homo, & quidem vivus; quatenus sanitatis, & orbis capax est.

3. Quis est finis Medicinæ?

R. Duplex habetur: unus primarius, Sanitas, vel conservanda vel restituenda; alter, secundarius, præparare scilicet omnia, quæ ad sanitatem vel conservandam, vel recuperandam, vel vitam etiam tantum conservandam, necessaria, & possibile sunt: nam Ovidius nit:

Non est in Medico semper relevetur ut æger.

Interdum docta plus valet arte malum.

4. Quodnam est Subjectum Medicinæ?

R. Medicus.

5. Quomodo Medicus definitur, aut quid est Medicus?

R. Est homo, omnia probe callens, & faciens, quæ vitam, cum primis vero sanitatem conservandam recuperandam sunt necessaria. Sive plenius: Est homo omnia probe callens, & faciens, quæ ad duplicis officii Medici (Quæst. 6.) requisita pertinent.

6. Quotuplex igitur est officium Medici?

R. Ut plurimum duplex habetur: 1. scilicet conservare sanitatem præsentem, & 2. amissam restituere. Quibus tamen & tertium accedit officium, nimirum forense dictum, quo obligatur sententiam dicere præram magistratu de occisis, vulnerumque eorum legalitate; item de veneno interfectis, de potentia, & impotentia utriusque sexus, de infanticidio, virginitate, legitimo partus tempore, morbis simulatis, ac dissimulatis.

simulatis, aliisque rebus similibus. Conf. *Bohnius* de officio Medici duplici, clinico, & forense.

7. *Quinam fuit ortus Medicinæ?*

R. Quando homines, vel a causa externa, vel interna, læsionem, sive morbum quendam perceperunt instinctu quodam naturali, ad dolorem, aut molestiam illam tollendam, ad remedium, sive auxilium quaerendum impulsu fuerunt; ita ut, quod vel sensus, vel casus fortuitus, vel appetitus suppeditavit, adhibuerint. Quicquid deinceps prodesse observarunt, notarunt, ac sibi, aliisque, similibus in casibus, iterum adhibuerunt; atque sic ex casibus sæpe fortuitis, & instinctu naturali primum nata est Medicina, primo sine dubio inter homines, atque ita diu, licet valde rudis, continuata; hinc ars est *antiquissima*.

8. *Quisnam ejus fuit progressus?*

R. Post multa vero secula gentes cultiores, cum primis Assyrii, Babylonii, Chaldæi, Ægyptii, & denique Græci, cum necessitatem, atque utilitatem Medicinæ probe cognoscerent, eam majori tandem studio excoluerunt, observationes de iis rebus, quæ in hoc vel illo morbo descripto profuerunt, aut nocuerunt litteris consignarunt, multa ejusmodi experimenta tandem collegerunt, atque sic incrementum haud exiguum Medicinæ conciliarunt. Test. *Herodoto, Strabone, Homero, Hippocrate*.

9. *Unde majus tandem artis incrementum?*

R. Ex constitutione Medicorum, qui ex observationibus, & notatis antecessorum, propria simul adhibita diligentia, accuratius non solum morbos cognoscere, verum etiam eos maxime idoneis curare studuerunt remediis. Dum hac scientia magnos honores, & simul emolumenta egregia consecuti sunt: imo nonnulli, ut *Apollo, & Æsculapius*, in Deorum numerum relati fuerunt; quamvis illo tempore magis adhuc externis, quam internis, morbis curandis, teste *Homero, & Celso*, studium adhibuerint. Inter omnes vero

tan-

ndem, quingentis fere annis ante Christum natum, Hippocrates Cōus in Græcia præ cæteris caput extulit, qui omnes antecessorum observationes, & experientia probe didicerat magno, quo pollebat, iudicio suisque observationibus auxit, emendavit, atque tandem, quæ optima cognovit, rejectis minus utilis, aut noxiis, in scriptis suis, cedro dignis, quibus adhuc fruimur, collegit, eisque effecit, ut non solum primus veri Medici nomen meruerit; verum etiam *Parens Medicinæ* rationalis jure appellatus fuerit: eum deinde ex celebrioribus Herophilus, Erasistratus, Asclepiades, Dioscorides, Themison, Celsus, Galenus, Aretæus, Paulus Aegineta, Aetius, aliique secuti sunt. Conf. le Clerc, aut Schultzii *Historia Medica*.

10. *Quibus rebus majorem perfectionem adeptæ est?*
2. Inquisitione & cognitione corporis anatomica, extispicia sacerdotum, cadaverum condiendorum, necnec, lanienam, incisionem animalium in usus philosophicos, seu physicos, & tandem incisionem sive autotomen cadaverum humanorum ipsorum, ad cognoscendam fabricam, & actionem partium, causarum vitæ sanitatis, morborum, & mortis ipsius. De recentioribus temporibus, postquam seculis barbaris diu inculta, & neglecta fere relicta est, physica tandem, anatomia, chemia, botanica, & mechanica quamplurimis præstantissimis viris melius excolataque ad Medicinam, ac Chirurgiam applicata, a primis vero circulo sanguinis ab Harveio detecta, ad fastigium illud, in quo nunc conspicitur, pergit; ita ut nunc longe majori certitudine, quam antea, agere queamus.

11. *Quenam fuerunt præcipuæ sectæ in Medicinæ?*
1. Prima, & antiquissima Medicina, ut ex dictis patet, empirica; cui deinde, Hippocrate auctore, successit rationalis, sive dogmatica: quæ experientia, & ratione, tanquam duobus Medicinæ fulcris, utebatur. eam cum Galenus tandem majore anatomie cultura, & phi-

& philosophia Aristotelica exornare, atque explicari annis sit, talem sibi famam comparavit, ut eum primum omnes Medici sequerentur per plura seculi nisi quod post *Hippocratem* etiam secta adhuc oritur, auctore *Themisone*, quæ a methodo, quam sectabatur, *Methodica* dicebatur; quæ vero non diu duravit. Cum autem seculo XVI. *Paracelsus* chemica principia in Medicinam introduceret, & multos affectibus sibi conciliaret, Medicina in *Galenicam*, & *Chemicam* dividi cœpit. Sequebatur paullo post *Cartesiana*; denique hanc secuta est *Mechanica*, ex fundamentis philosophicis, anatomicis, & mechanicis cuncta dijudicans; *Stahlianæ*, quæ ab anima omnes actiones, tam in statu sano, quam ægro deducere satagit. Atque hæc duæ ultimæ nunc præcipue vigent, omnesque fere hodie Medici alterutrius sectæ dogmata amplectuntur.

12. *Quomodo dividitur Medicina?*

R. In partes principes, & ministras. Principes sunt duæ: Hygiene, & Therapeutice. Ministræ vero sex, & quidem tres, prægredientes dictæ, ut Physiologia, Pathologia, & Semiologia; atque tres pedissequæ, si executioni destinatæ: ut Diæta, Pharmacia, & Chirurgia. Sive in forma Tabulæ

Dividitur Medicina in partes

(Principes, quarum duæ sunt,

{ Hygiene, &
{ Therapeutice.

(Ministras, sex: quæ vel

{ theoreticæ, sive prægredientes, tres, cognitioni dicatæ: nimirum,

{ Physiologia, ad quam præcipue Anatomia, deinde & Physica, atque Mechanica pertinent.

{ Pathologia.

{ Semiologia.

{ practicæ, sive pedissequæ, executioni destinatæ quoque tres: ut

—Diæta,

Phar-

} Pharmacia, cujus pars est Botanica, Materia
 } Medica, & Chemia.
 { Chirurgia.

Partium Medicinæ ministrarum prima est

PHYSIOLOGIA: cujus objectum sunt *Res secundum naturam*, (*) & speciatim quidem

I. **SANITAS**, id est, status ille hominis, in quo ad actiones, sibi competentes, idoneus est.

Hujus *Differentiæ* sunt vel

{ *Essentiales*, quæ in : es sunt: ut

{ *Temperamentum*, & quidem bonum: quod est æquale, live temperatissimum, ut *sanctissimum*: quod distinguunt vulgo in æquale pondus & ad justitiam.

{ *æquale*, ut *phlegmaticum*, *cholericum*, & *melancholicum*: quæ varie ac mire rursus inter se invicem mixta deprehenduntur.

Organica structura legitima, consistens in partium debita conformatione, magnitudine, situ, & numero.

{ *Unitas*, live *connexio* decens cum aliis partibus.

{ *Accidentales*, ut *sanitatis* { perfecta, aut excel-

Qualitas: cujus ratione } lens; live
 sanitas est vel } imperfecta, quæ *status neuter* vocatur.

Tempus: cujus intuitu dicitur vel longa, & habituoalis; aut brevis, live recens.

Motus, live *mobilitas*: cujus respectu dicitur firma, & constans; aut infirma, & inconstans.

Gg

Even-

(*) Vocantur etiam *res naturales*, & septem vulgo numerantur: ut partes solidæ, fluidæ, temperamenta, facultates, actiones, excernenda, & qualitates externæ sensibiles: quibus alii elementa addunt; hæc vero jam sub partibus solidis, & fluidis comprehenduntur.

Eventus: ubi sperare jubet longam sanitatem, sive longævitatē, aut ubi talē spem non facit.

2. CAUSSA SANITATIS: quæ est vel

Propinqua, quam constituunt tria: rite scilicet con-

stituti Humores

alimentarii, ut chylus, sanguis, serum, cruor, lymphæ: (quo & spiritus referri possunt:)

excrementitii, ab excretionē ita dicti; qui sunt vel utiles, ut saliva, liquidus gastricus, bilis, succus pancreaticus, lac, semen &c.

inutiles, transpiratio, sudor, urina, mucus, &c.

Spiritus: qui licet unius ejusdemque sint naturæ, tamen dividi solent in

animales, qui actionibus, animæ sive mentis voluntati subjectis, inserviunt; ut sensui & motui;

vitales, qui actionibus, animæ voluntati non subjectis, præsent: ut actioni cordis, pulmonis, ventriculi, renum, hepatis, glandularum &c.

Partes solidæ: quæ dividuntur in similes, dissimiles, simplices, & organicas, molles & duras.

Remota, sunt sex Res non naturales, ut & adiphoræ dictæ: ut aer, cibus, & potus, motus & quies, somnus, & vigiliæ, excreta, & retenta, atque animi pathemata; quibus etiam sanis sensu jungi possunt Medicamenta, & operationes quædam chirurgicæ.

3. ACCIDENTIA s. effectus sanitatis sunt tria: ut Actiones integræ, sive perfectæ toto corpore.

naturales; ut digestio, nutritio, vegetatio, secretio, generatio, transpiratio, & affines vitæ.

vitales; motus cordis, & pulmonum, sive circulatio sanguinis, & respiratio.

animales, (ab animæ voluntate pendentes) ut sensus, & motus voluntarius.

Excreta & retenta rite constituta; quorum

Chæc sunt humores, & spiritus;

Utilia; ut lac, semen, bilis, saliva, &c.
illa vel } inutilia; urina, fæces, mucus, cerumen, menstrua, lochia, hæmorrhoides &c.

Qualitates corporis externæ sive sensibus integræ, quæ a quinque sensibus externis vulgo dicuntur visibiles, audibiles, olfactiles, gustatiles, tactiles.

PATHOLOGIA, cujus objectum sunt *Res præternaturam*.

I. Morbus, qui est læsio actionum competentium.

Hujus *differentiæ* sunt, sicut in Physiologia, vel

Essentiales; ut

Intemperies; *plethorica*, *phlegmatica*, *cholericæ*, *melancholica*; quarum quælibet potest esse *benigna*, aut *maligna*, gradu vario corruptionis diversæ.

Morbus organicus; qui consistit in partium incongrua conformatione, magnitudine, numero, aut situ.

Unitas soluta; cujus species in partibus vel mollibus, sunt *vulnus*, *ulcus*, *contusio*, *raptura*, *duris*, sive ossibus, *fractura*, *fissura*, *caries* &c.

Ex his morbis simplicibus, inter se diverso modo concurrentibus, resultant *Morbi compositi* innumeri; ut *fractura cum vulnere* vel *luxatione* &c.

Accidentales; quæ respiciunt vel

Subjectum, & sic morbus dicitur a

Loco affecto, universalis, vel particularis; item essentialis, aut per consensum; manifestus, aut occultus; morbi denique

que capitis, pectoris, ventriculi, intestinorum, renum, oculorum, &c.

Numero, solitarius, sive simplex, aut compositus.

Ætate, infantilis, puerilis, juvenilis, virilis, senilis.

Sexu, muliebris, vel virilis, aut communis

Origine, connatus, vel adventitius; hæreditarius, vel non hæreditarius, sive acquisitus.

Causas, unde morbus a

Magnitudine, dicitur parvus, vel magnus

Qualitate, benignus, aut malignus, contagiosus, legitimus, sive exquisitus, aut spurius, anomalus.

Motu, constans, aut pertinax, vel inconstans.

Tempore, vernus, æstivus, autumnalis, hyemalis; continuus, continens, intermittens.

Duratione, recens, inveteratus, brevis, sive acutus, aut chronicus. Item principium, incrementum, status, declinatio morbi.

Regione, endemius, epidemicus, publicus, privatus.

Eventu, sanabilis, insanabilis, salutaris, dubius, lethalis, aut desperatus.

2. CAUSSA MORBORUM alia est

Propinqua; quæ in proximam rursus, & antecedentem dividitur, ac fundatur vel in

Humoribus, & *Spiritibus*: qui peccare possunt

quantitate; vel § excedente, *Pletthora*; § deficiente, *Penuria* vocata.

qualitate; *Cacochymia* dicta, biliosa, pituitosa, melancholica, acida, alcalica, falsa, benigna, &c.

motu; excedente, deficiente.

loco;

Illoco; unde stagnatio, vel effusio humorum.

Partibus solidis, quæ peccant conformatione, magnitudine, numero, situ, unitate, laxitate, rigiditate.

Excrementis vitiosis quibuscumque utilibus, & inutilibus.

Quibus addendæ sunt *res externæ* deglutitiæ, & quævis instrumenta, & corpora externe lædientia.

Remota; sunt res

1. *Non naturales*; ut aer, alimenta, motus &c.

2. *Præternaturales*; morbi, & symptomata, alia mala, & morbos producentia: item *Venena*.

3. *Supranaturales*, quando Deus, Diabolus, aut sagæ (si quæ forte sunt) morbos inducunt.

3. SYMPTOMATA sunt triplicia: ut

Actiones læsæ, abolitæ, imminutæ, atque depravatæ.

Excreta, & *retenta læsa*: quantitate, qualitate, loco, aut tempore peccantia.

Qualitates externæ sensibiles læsæ: indicantes vitia corporis humani in sensus incurrentia: & a sensibus, in quos incurrunt, dicuntur vel

visibiles, quando visu percipio icterum, chlorosin, guttam rosaceam, erysipelas, tumores &c.
audibiles, quando audio raucedinem, stertorem, singultum, ructus, murmura, flatus, aut crepitus.

olfactiles, dum percipimus foetorem sudoris, urinæ, oris, ulceris, canceri; &c.

gustabiles, si ab ægro saporis peregrini sentiuntur, amari, acidi, salsi, aromatici, pingues, putridi.

tactiles, quando tactu æstus, frigus, siccitas, humiditas, durities, laxitas &c. ægri explorantur.

4. SEMIOLOGIA. In qua considerantur signorum

1. DIVISIO, in

CDIAGNOSTICA

Csecundum naturam

CSanitatis; quæ demonstrat sanitatem optimam ex tribus scilicet illis accidentibus sanitatis, actionibus, excretis, & qualitatibus integris.

CSanitatis latitudinem; ex sanitatis actionibus bonitate sua quadantenus recedentibus.

præter naturam, sive morborum; quæ sunt *ve Communia*, sive quæ incerta sunt; & desumuntur partim a symptomatibus, partim a causis morborum, aliisque circumstantiis rerum secundum, & præter naturam.

C*Pathognomonica*, propria, sive certa; quæ morbum certe indicant, & petuntur a symptomatibus, sive ex actionibus, excretis, ac retentis, & qualitatibus sensibilibus læsis.

PROGNOSTICA.

Csecundum naturam, re ipsa cum diagnosticis in. conveniunt, & solum considerandi modum differunt; hic enim considerantur, quatenus ex præsentibus signis bonæ sanitatis firmam & longam, aut brevem, vel vacillantem sanitatem præsumere possimus; id quod est prudenti signorum consideratione, & collatione petendum.

Præter naturam, quæ patefaciunt eventus

Qualitatem, cujus signa sunt vel

CSalutis, sive salutaria; quæ a statu sano, sive naturali parum recedunt.

Periculi, sive periculosa; quæ a statu naturali multum recedunt.

Mortis, sive lethalia; quæ a statu naturali maxime recedunt, atque propter vehementiam certum fere mortis periculum portant; ut sunt summa debilitas, sensus amissi aliaque varia.

Tempus, quod pronunciant signa

{ cruditatis, id est mala, vehementia; morbum longum, & periculofum præfagientia. coctionis, id est, paullo meliora, morbum declinantem, brevem, & salutiferum indicantia.

{ *Modum*, qui est vel

{ Crepentinus, accidens in morbis acutis, & vel

{ Bonus est, diciturque tunc *Crisis*, quæ vel

{ perfecta; quando evidens, largâ, & cum euphoria, sive levamine fit evacuatio; vel per sudorem, alvum, urinam, nares, sputum, uterum, hæmorrhoides &c.

{ imperfecta; quando vel nimis parca sit evacuatio, vel ad loca ignobilia materia morbigicæ transmissio, sive *metastasis*.

{ malus, qui *Acrisis* dicitur; quando nulla fit evacuatio, aut transmissio salutaris; aut insufficiens; id quod ex signis malis, imo pessimis colligitur; bona crisis ex contrariis.

{ lentus; qui si bonus, dicitur *λόςις*; si malus, *lenta mors*; quod ex signis communibus, & specialibus, bonis, aut malis constare debet.

{ 3. ANAMNESTICA, seu *rememorativa*, sunt, quæ præterita nobis in mentem revocant: ut quem jam apoplexia vel hæmoptysi laborasse scimus, ille facile denuo eodem morbo corripitur; & similia.

{ 2. FONTES SIGNORUM sunt vel

{ Principales, & maxime necessarii; desumunturque ex effectibus, seu consequentibus actionum, excretorum, ac retentorum, atque qualitatuum sensibilium integrarum, aut læsarum.

{ minus principales; qui petuntur ex attributis, & circumstantiis, cum subjectum, tum causas res-

picientibus, v. g. rerum non naturalium, temporis, ætatis, sexus, loci, situs, qualitatis &c.

C₃. MEDIA, quibus signa exploramus, & percipimus, sunt sensus nostri, & potissimum externi; ut

1) **Vilus**; quo ægri faciem, oculos, linguam ventrem, omnes partes externas male constitutas, respirationem, excrementa alvi, oris & præsertim etiam **URINAM** examinamus. In hac considerandus

C **Liquor**; & ratione hujus

Quantitas; copiosa, parca, vel media.

Consistentia; quæ vel tenuis est, aut aquosa vel crassa, vel media; quæ varia indicant.

Color { naturalis; citrinus.

{ præternaturalis; pallidus, flammeus, ruber, croceus, viridis, fuscus, niger.

Odor, vel naturalis, vel inodora, foetida, ingrata

C **Contenta**, quæ sunt vel

{ universalia; nubecula, suspensum, sive eneo-
rema, sedimentum, spuma.

{ particularia, & p. n. ut sanguis, caruncula, pus, crusta, cuticula, filamenta, mucus, &c.

2) **Auditus**; quo percipimus relata ægrotum & adstantium, respirationem, stertores, murmura ventris, deliria ægri, clamores, dolores indicantes.

3) **Olfactus**; qui percipit odorem conclavis urinæ, sudoris, excrementorum, puris, salivæ.

4) **Gustus**; dum ægri sapes p. n. falsum, acidum, amarum, putridum, &c. vel nullum percipiunt.

C 5) **Tactus**; quo cognoscimus

C (1) qualitates varias ægri; ut frigus, æstum, humiditatem, siccitatem, lævitatem, asperitatem.

C (2) **PULSUM**; ex cujus innumeris veterum dif-

differentiis tres forte sufficere possunt, de-
sumptæ

- 1) a robore ; ut robustus , aut debilis sive parvus.
- 2) a tempore ; ut frequens , sive celer , aut tardus.
- 3) ab æqualitate ; æqualis , aut inæqualis , quo pertinet intermittens , myurus , caprizans , ferratus , & similes . Sed omnes vario rursus modo compositi esse possunt ; ut robustus cum celeri &c.

Partes Medicinæ PRINCIPES sunt duæ ; Hygiene , & Therapeutice.

HYGIENE est ea pars , quæ docet modum sanitatem conservandi ; ubi doctrina de indicationibus notanda , atque respicienda hic sunt Sanitatis indicantia ; quæ sunt vel

Primaria ; causæ nimirum sanitatis ; propinquæ , & remotæ ; quæ bonæ conservandæ .

Secundaria ; circumstantiæ causarum , & subiecti ; ut , ætas , regio , sexus , temperamentum , anni tempus , vitæ status , consuetudo , idiosyncrasia : quæ omnia in praxi medica in quovis bene perpendenda sunt .

Indicata sunt tria ;

DIÆTA , sive sex res non naturales dictæ , eorumque in quolibet legitimus usus ; ut

Aer ; qui quantum fieri potest , temperatus sit , vitando vel corrigendo intemperatum , impurum .

Cibus , & potus ; qui sit simplex , & modicus ; vitandus nimius , acrior , pinguior , durior , præsertim imbecillis , sitque temperiei conveniens .

Motus ; sit frequens , sed moderatus , & non mox post pastum , potissimum mane , aut circa vesperum , ad sensum lenis lassitudinis , vel levis sudoris ;

Vigiliæ, non sint nimix; *somni* mensura optima est spontanea evigilatio & agilitas corpori restituta.

Excernenda; quæ non sunt nimis supprimenda.

Retinenda vero non nimium excernenda.

Animi affectus; *noxii*, sunt ira, terror, mœro, tristitia; *salutares*, gaudium, spes, desiderium.

PHARMACIA; quæ in perfecte sanis locum non habet; in debilioribus autem, & imbecillioribus quandoque roborans, lene evacuans, diaphoreticum, aut temperans, si opus est, remedium adhiberi potest, ac debet.

CHIRURGIA; quæ quoque tantum in valetudinariis, sive non perfecte sanis, locum habet, ut sanguinis detractio, per venas, cucurbitulas, vel hirudines; itemque fonticuli, &c.

Indicationes sunt vel

Specialis;

Similia similibus conservanda.

Contraria contrariis corrigenda.

Noxia, aut supervacua evacuanda.

Præsens sanitas, per continuationem eorum, quæ prodesse, & mutationem illorum, quæ nocere observantur, conservetur.

Future, per usum rerum sex non naturalium prioribus similem, & noxiorum ejectionem vel correctionem procuretur.

Specialissima, quæ pro varietate hominum, ætatis, sexus, idiosyncrasix, consuetudinis variat, quovis speciatim observanda; nam sæpe huic prodest, quod alteri nocet, & contra: hinc quilibet sano sensu sit **MEDICUS SUI IPSIUS**, observando & notando, quæ sibi vel prosunt, vel nocent, non neglecto tamen consilio boni Medici.

REGULÆ PRO SANITATE CONSERVANDA
POTIORES.

1. *Temperantia*, sive *sobrietas* est cardo totius diætæ; *temperantia* vero, & *ingluvies*, quamplurimorum orborum fœcunda mater, & teste *Syracide* ac *Celso*, I. c. 2. *nunquam utilis* est; sed corpus, & mentem dit. Adeoque moderata victus ratio, ita ut ventriculum *nunquam nimis repleamus*, sed semper cum petitu aliquo a pastu surgamus, summe ad sanitatem conservandam est proficua.
2. Una ex saluberrimis veterum sanitatis regulis est: *satiari cibis, & impigrum esse ad labores*. *Hippocr.* de Morb. & Epid. L. VI. quibus nonnulli haud merito addunt, & *liquidum genitale non temnere, & nimium profundere*.
3. In primis etiam valde salutare est præceptum illius Scholæ Salernitanæ; *Si vis esse levis, sit tibi cœna vis*.
4. Sanus homo, & qui sui juris est, auctore *Celso* I. Cap. 1. nullis se obligare legibus debet: modo si esse, modo in urbe, sed frequenter se exercere. *Nullum cibi genus, quo populus utitur, fugere*, si movevitetur *nimia repletio*; imbecilli vero, & litterarum cupidi cibis durioribus, pinguibus, atque acrioribus cautius utantur.
5. Omnis quidem intemperantia, sive excessus nobis est; *tutior tamen in potione*, secundum *Celsum*, quam in esca.
6. Quemadmodum vero plerique in quantitate ciborum excedunt; ita nonnulli, & præsertim virgines, fœminæ quædam, haud raro *in potu deficiunt*. Quia pro hujus neglectu sanguis nimis fit spissus, unde multi oriuntur morbi, satis quotidie, attamen non nibendum.
7. *Potus tenuis*, aqueus, ut aqua pura, levis, vel evisia tenuis, & in assuetis vinum modicum interpo-

positum, est potus saluberrimus. Potus vero crassus, fœculentus, vel fortis, valde inebrians, & spirituosus, minus convenit; imo nisi caute adhibeatur, va-
de noxius, præsertim pueris, junioribus, atque in-
becillis.

8. *Motus & exercitatio* corporis sit frequens; at-
men non nimis vehemens. Quies vero nimia cor-
pore debilitat. Hæc maturam senectutem, illa longam ad-
ulescentiam reddit. *Celsus*.

9. Possent homines, si debito tempore *exercitio*,
labore uterentur, Medicis, & medicamentis carere
ait *Avicenna* Lib. I. Fen. Cap. 1. observata tamen
mul legitima victus ratione. Nam motus sive lab-
corpus firmat, teste *Hippocrate* Lib. I. de *Diæta* n. 4
& *Celso*; Ignavia e contrario hebetat.

10. Vix aliquis morbus imminet, qui non exercit-
tione, (addo & abstinentia) corrigi, aut averti po-
sit, auctore *Verulamio* Lib. IV. de *Augment. Scie-*
tiarum.

11. *Optima exercitationum genera* sunt, ambulatio
equitatio, vectio in rheda, pilæ lusus, arma, cla-
lectio, vocis contentio, gestatio.

12. *Potio frigida*, quando calemus, aut a motu
vel labore sudamus, perniciosissima est, & instar v-
neni fugienda; alias vero, quando non calemus, a-
suetis non nocet.

13. Ita & *corpore calente*, ac sudante, ab *aere* at-
vento *frigido* sibi cavendum. Neque ex summo frige-
re mox loca calidissima intranda.

14. *Omnis enim subitanea mutatio in hac*, & *ali-*
rebus periculosa. Igitur si quid mutandum, paulatim
mutandum. *Hippocr.* Aphor. 51. Sect. II. *Celsus* Lib.
cap. 3.

15. *Potus aquei calidi*, infusum Theæ, aliarumque
herbarum temperatarum, moderata copia, quotidie
assumpti, multum ad sanitatis conservationem faciunt
dum diluunt, & resolvunt viscida, spissa, crassa, a-
que acria temperant, obstructions referant, & trans-

rationem promovent. Potus vero calidus nimis
cunquē, vel nimis frequens, siue theæ sit, siue caf-
, debilitat, ac nocet.

16. Ita & *porus aquæ frigida*, præsertim tempera-
entis calidioribus, & biliosis, prudenter usurpatus,
ultum prodest, & quæ eadem imo sæpe plura præ-
t calida; hinc aquæ medicatæ sæpe efficiunt, quod
a medicamenta præstare nequeunt. Vid. *Frid. Hoff-*
manni dissert. de salubritate potus frigidi, & scripta
aquis medicatis.

17. *Vestimenta hyberna* vere ante medium Maii non
nt deponenda; circa æquinoctium vero autumnale
rpus denuo contra ingruens frigus mature satis mu-
endum, ne transpiratio lædatur: unde multi, iique
riculosi tunc morbi oriri solent. Conf. *Sanctorii Me-*
rina Statica.

18. *Somnus* sit septem, vel octo horarum; *Vigiliæ*
ro, & lucubrationes nimia corpus valde debilitant,
nocent: (vid. pag. 13. *Vigiliæ*) utraque enim mo-
m excedentia mala sunt, *Hippocr.* Aphor. 3. Sect. II.
Sect. VII.

19. *Affectus animi*, ex *Celsi* consilio, neque omnino
pprimendi, neque nimis exercitandi. Fortiores præ-
tim *ira*, *terror*, *mæror*, *invidia*, quantum fieri po-
t, vitandi, vel saltem rationis freno bene moderen-
t. Animus contra semper ad hilaritatem sit com-
situs, secundum Salomonis, & Senecæ dictum: *di-*
gaudere.

20. *Venus præmatura corporis*, & mentis vires val-
infringit; id quod & facit iusta ætate, si nimia,
æsertim in imbecillis, litterarum cupidis, maxime
ætate ad senectutem vergente.

21. *Ratione studiorum* moderatio quoque servanda.
pueritia, & ineunte adolescentia animi contentio
n nimis intendenda, postea paulatim plus exercen-
; in senio magis rursus sensim minuenda, & mo-
randa.

22. Ita & *studia*, atque *meditationes* nimia, præser-
tim

tim mox ante, vel mox post pastum institutæ, v
in feram usque noctem, aut per integras noctes pr
tractæ valde debilitant.

33. Quilibet, ut jam dictum est, sit *Medicus s
ipsum*: observando non solum quid, sed & quantum
commode ferre possit. Nam *consuetudo* est altera n
tura, & sæpe vix credenda fert. Ita & non pau
res nonnullas in certa quantitate sine noxa ferre po
sunt, exemplo *vini, Caffæ &c.* si vero ultra progr
diuntur, male se habent. *Omne enim nimium natur
inimicum*, juxta Hippocr. Aphor. 51. Sect. II.

24. Idem *de Venere* intelligendum; quam raram mu
ti sine damno ferunt; sed frequenti læduntur. *Hic
Celsus: rara Venus corpus excitat; frequens solvit
L. I. cap. I.*

25. Temperantia igitur in *victu, otio, venere,
animi reliquis affectibus* ad conservandam valetud
nem valentissima est, eamque *Plato vitæ custode*
appellavit. Conf. *Cornarus s. Cornelius de sobrietate
& principium cel. Scholæ Salernitanæ.*

Si vis incolumen, si vis te reddere sanum,

Curas tolle graves, irasci crede profanum.

Parce mero, cœnato parum, non sit tibi vanum

Surgere post epulas, somnum fuge meridianum

Nec mictum retine, nec comprime fortiter anum

Hæc bene si serves, tu longo tempore vives.

II. THERAPEUTICE est pars Medicinæ princeps
quæ docet modum sanitatem amissam restituendi,
est, modum morbos sanandi. Estque hæc vel

Ordinaria: ubi quolibet in morbo attendenda, & ol
servanda rursus sunt, ut in Hygiene,

INDICANTIA: quæ hinc sunt res *præter natu
ram* pag. 439. morbi scilicet, causæ morborum
& symptomata. Dividuntur ea in

Primaria; quæ sunt causæ morborum,

Cremotæ, procatarticae, sive occasionales, pag

439. antecedentes; in humoribus nostri co
poris jam hærentes.

proximæ, quæ actu in parte ægra hærent, & eo ipso proxime morbum faciunt.
Secundaria; quæ petenda a rebus circumstantibus ratione causarum, & ægrorum; nimirum ab ætate; aliter enim infans curandus, quam adultus.
sexu; aliter mulier, præsertim ratione menstruorum, vel si gravida, aut puerpera, quam vir.
temperamento, aliter calidus, quam frigidus &c.
anni tempore; aliter sæpe hyeme, quam æstate.
vitæ genere, & robore; aliter rustici, & robusti, quam molliores & imbecilli.
consuetudine; ratione sanguinis missionis, diætæ.
idiosyncrasia; ob quam quis hoc vel illud ferre nequit; aliud vero quam optime.

INDICATA; quæ sunt triplicia,

1. *Diæta*, sive legitima victus ratio: ubi optimus usus sex rerum non naturalium p. 443. & sequent. ægris ordinandus, ætati, sexui, temperamento, anni tempori &c. conveniens.
2. *Pharmacia*: ex qua medicamenta optima, morbo, & causis contraria, evacuantia, vel alterantia, iusto tempore, & copia ordinanda.
3. *Chirurgia*: ratione cujus perpendendum, an operationes chirurgicæ, & quales in præsentī morbo, & ægro necessariæ, aut utiles sint.

INDICATIONES: quæ sunt vel

Primariæ; æque rursus vel

1. *Generales*; ut *contraria contrariis curanda*; in *abundantia*; supervacanea, & noxia idoneo modo sunt auferenda, evacuanda, modo venæsectione, modo vomitu, purgatione.
defectu, aut *penuria*: deficiens restituendum.
qualitate prava; ea contrariis est corrigenda.
motu sanguinis vitio; is est emendandus, augendus, temperandus, vel minuendus.
2. *Speciales*, sunt vel

Inter-

Intemperiei: pag. 437. Ubi

1. humorum ulterior sive major corrupti est prohibenda.

2. humores vero jam corrupti, corrigendi.

3. causa ipso actu lædens, tollenda.

morbi organici; pag. 437. in quibus

1. causæ remotæ internæ, & externæ, quæ organicam naturalem structuram lædunt removeantur.

2. causa antecedens tollatur, & corrigatur.

3. pars læsa emendetur, ac roboretur.

solutæ unitatis;

1. procurandum, ut unio conveniens, & decens actu fiat.

2. prohibendum, ne futura unio per causas quascunque, sive propinquas, sive remotas, impediatur.

3. juvandum, ut instans unio, & glutinatio per humores laudabiles promoveatur.

3. *Specialissimæ*, ad curationes speciales atque ipsam praxin clinicam pertinent.

Secundariæ desumuntur a variis accidentibus, circumstantiis: unde sæpe nascuntur *coindicaciones*, & *contraindicaciones*, observatu valde necessariae.

Extraordinaria; tribuitur symptomatibus urgentibus doloribus, animi deliquiis, evacuationibus nimis quibuscunque, vigiliis &c.

REGULÆ PRACTICÆ NONNULLÆ.

1. Quando ad ægrum perveneris, ex HIPPOCRATIS præcepto interrogare oportet, quid patiatur? quādiu? quā de causa? quo victu utatur? an alvum cernat?

2. Apud mulieres vero etiam, an menstrua, & apud puerperas, an lochia rite succedant?

3. Præterea Medicus pulsum ægri exploret, inspicat probe faciem, oculos, & linguam, atque in mulieribus mor-

morbis etiam *urinam*, omnibusque sensibus utatur, ut principio & præ ceteris morbum, ejusque statum, ac vires ægri probe cognoscat. Nam ignoti, ut vulgo dicitur, *nulla est curatio morbi*.

4. *Abstinencia multi magni morbi & præcaventur, & curantur*. Hinc Poeta canit:

Abstine, & efficies, quod Medicina nequit.

5. Adeoque simulac quis male se habere sentit, frigus, & cibum evitet: quia *abstinencia multorum morborum egregium est remedium*. Potus vero tenuis, aqueus, sive moderate frigidus, sive calidus, pro cujuscunque natura, ac consuetudine tunc non nocet, sed potus prodest, præsertim si post potum aqueum calidum matutino cum primis tempore, sudori blando indulget.

6. In *morborum ingruentium longorum*, sive *chronicorum* vulgo dictorum principio, prodest maxime abstinencia, & motus, sive exercitatio corporis: quibus plerumque vinci, sive averti possunt. Conf. pag. 446. n. 9.

10. In *acutorum* vero initio, abstinencia, quies, potus aqueus multus, transpiratio aucta, sive sudor sine excitatus, primaria sunt remedia.

7. Ubi quis a *crapula*, vel nimia ingluvie prægressus male se habet, & fastidium, nausea, conatus vomendi, sapor peregrinus, & præsertim amarus, aut putridus, itemque molestia, ut oppressio in regione ventriculi percipitur, vomitus est movendus; aut si quid intra indicat, alvus ducenda.

8. Quocumque in morbo *sanguis abundat*, aut sanguinis auctior motus, & calor adest, vel sanguinis quidam fluxus consuetus suppressus, *missio sanguinis* indicatur.

9. Quocumque in morbo *calor*, & sanguinis motus auctior adest, præter sanguinis detractionem, & abstinenciam, præsertim a carnibus, potus aqueus largus, acida, nitrum, absorbentia, & temperantia remedia sunt præcipua.

10. Igitur in *morbis acutis*, ubi modo dicta signa adfunt,

ad sunt, etiam prælaudata remedia cum regimine temperato adhibenda. In *acutis vero malignis*, sanguinis missio, purgantia, & emetica plerumque noxia; reliqua vero modo laudata optime profunt.

11. Ubi *magna debilitas* adest in acutis, *vinum* modicum, cum potionibus citratis, cardiacorum ferè princeps est, robur dat, & sudorem movet. In quibusdam acutis, præsertim ubi interna inflammatio aut delirium adest, etiam *camphora* valentissimum est remedium.

12. In *chronicis* contra infusa vegetabilium, herbarum, radicum, & lignorum, salia media, remedia amara, forma infusi, essentia, extracti, pillularum vel electuarii, speciatim aloe cum extractis amaris forma pillularum, sapo, cortex peruvianus, cinnabaris, mercurius, castoreum, spiritus C. C. mars aquæ medicatæ, frequens corporis exercitatio, victus modicus, & animus tranquillus efficacissima sunt. Imo in non paucis ejusmodi morbis *dieta parca*, & *motus frequens* haud raro sufficiunt. Conf. pag. 446 N. 8. 9. 10.

13. Medicus *paucis, sed selectis*, & usu comprobatis, *utatur medicamentis*; multitudo enim confusionem parit.

14. Valentissima quædam remedia medicus magni nominis sequentibus versiculis comprehendit:

Sex sunt in medicis, quæ vincunt robore taurum:

Succina, castoreum, mars, camphora, tartarus, aurum.

Verum his majora adhuc esse puto:

Vinum, aloen, lympham, nitrum citreum, vel acetum.

Mercurium, chinam, sal neutrum, cinnabarinæque.

15. *Quamdiu Medicus morbum*, ejusve causam, (in difficilioribus haud raro accidit) non cognovit, valentioribus remediis abstineat; ægro victum, & regimen conveniens commendet; & si quæ medicamenta danda, blanda ea sint: ut temperantia ex absorbentibus, & salibus mediis, itemque ex diluentibus aqueis.

16. *A juvantibus & nocentibus lumenda sæpe indicatio, & curandi ratio: præsertim in morbis non satis cognitis.*

17. *Potus aquæ frigidæ prodest in febribus ardentibus sive biliosis, in flatibus, ardore ventriculi, siti fortiori, cum primis nocturna, ructibus crudis, vomitu uento, aliisque sanguinis fluxibus nimis, acido præsertim idoneo imprægnatus.*

18. *Medicus semper operam det, ut, quantum fieri potest, cito, tuto, & jucunde curet.*

19. *Si prodesse non possis, cave, ne noceas, noxiis mirum, vel suadendis, vel porrigendis.*

20. *In usu purgantium, vomitoriorum, opiatorum, & mercurialium, cautissime agendum, & dosis eorum exactissime scienda, eaque nunquam majori copia danda: via valentissima, & violenta sunt medicamenta.*

21. *Medicamentis, ait Celsus L. V. c. 25. quæ somnum perferunt, uti, nisi nimia necessitas urget, alienum est: et enim ex vehementibus medicamentis, & stomacho addo & cerebro) alienis.*

22. *Morborum acutorum nullæ certæ sunt prædictiones, quæ mortis, neque salutis. Hippocr. Aph. 19. sect. II.*

23. *Morbos, qui ex repletionem sunt, curat evacuatio; vero, qui ex evacuatione, repletio, & in cæteris contrarietas remedio est. Hippocr. Aph. 22. sect. II. Hic igitur hic aphorismus rectissime contraria contrariis curanda esse.*

24. *Si qualia oportet purgentur, confert, & facile fert; contra vero si fiat, graviter. Idem sect. IV. Aph. 3.*

25. *Frigida pectori inimica. Sect. V. Aph. 24.*

26. *Si quis febricitanti cibum præbeat, valenti quoniam robur, ægrotanti morbus fit. Sect. VII. 65.*

27. *Fortiora purgantia raro prosunt; sæpius nocent: hinc avariis magnis Medicis fere omnino proscripita sunt.*

28. *Sanguinis emissio præstantissimum multorum morborum est remedium; quia multi homines ob intemperantiam, ingluviem, & otium nimium abundantia laborant. Interea tamen ea non est abutendum,*

neque promiscue præsertim in imbecillis, neque nimis frequenter ea est adhibenda.

29. *Sanguinis detractio e pede* in morbis capitis, præsertim doloribus capitis, morbis multis oculorum, periculis, hepatis, lienis, & uteri egregie convenit.

30. *Eductio vero sanguinis e vena jugulari* potissimum in vertigine, apoplexia, doloribus vehementioribus capitis, oculorum inflammationibus ac doloribus fortioribus, angina sive faucium inflammatione major maxime prodest.

31. *Ne morbi facile recrudescent*, vitanda omnia per aliquod tempus, quæ duriora ac difficilioris sunt digestionis, ut carnes suillæ, carnes ac pisces indurati legumina, brassicæ, omniaque olera hyberna.

32. *Quando pleuritidis vena secatur*, dum sanguis fluit, sæpius tussire debent, sic facilius stagnatio sanguinis in pleura & pulmone resolvitur.

33. *Si puerpera pleuritide laborat*, etiam vena incidenda, imo si opus, ea quoque repetenda est.

34. *Ex febre intermittente* non tam frequens junioribus, quam senibus mors metuenda.

35. *Urina* in febribus ardentibus pallida, aquea, delirium & mortem ut plurimum portendit. Ita & *urina nigra* in febribus continuis mortem, in hypochondriacis vero valetudinem præfagit.

36. *Urina crocea*, quæ lintea tingit, icterum; *Urina purulenta*, ulcus renum, vesicæ, vel partium genitalium; *sanguinea*, mictum cruentum indicat. Alii *urina sola* est fallacissima.

37. *Surditas in febre continua* plerumque nihil mali denotat, & ut plurimum cum febre rursus evanescit.

38. *Febris intermittens cum mentis stupore* aut sopore periculi plenissima est, præsertim in senibus. *Largi corticis Peruviani* usus unicum fere ac divinum hic remedium.

39. *Podagra*, præsertim recens, aut saltem non veterata, non est morbus insanabilis; sed prudenti

us ratione, & medicamentis idoneis sæpe curata est, adhuc curatur.

40. *Aquæ medicatæ* divina in multis morbis sunt remedia, quæ sæpe sanant morbos, qui aliis curari non poterunt.

41. *Lac & serum lactis* ad præstantissima quoque remedia, variis in morbis, & præsertim in tabe, hæstia & arthritide, sunt referenda.

42. *Nutrices*, quia suos morbos cum infantibus facile communicant, quantum fieri potest, sanæ eligendæ sunt.

43. *Infantibus & oculis* mederi, difficillimum est.

artis Medicinæ pedisequæ, sive executioni destinatæ, tres sunt: Diæta, Pharmacia, & Chirurgia.

DIÆTA. Hujus objectum sunt, *Res, Non Naturales* diætæ, *necessariæ* etiam sive *adiaphoræ* a nonnullis appellatæ, (de quibus Conf. rursus Hygiene pag. 443. & Regulæ diæteticæ pag. 445. & sequ.) ut **AER**; circa quem adhuc hic consideranda ejus

quantitas; vel excedens, vel deficiens, & quomodo utrumque vitium sanitati ac vitæ nocere possit.

qualitas; cujus respectu dicitur temperatus, intemperatus; purus, impurus; calidus, frigidus; crassus, tenuis; gravis, levis; humidus, siccus; salubris, insalubris; contagiosus, non contagiosus.

motus; tranquillus, agitato, ventosus, procellosus. *regio*, sive *locus*; hinc est austrinus, aquilonius, orientalis, occidentalis; ruralis: urbanus; montanus; subterraneus; soli oppositus, eive aversus.

anni, vernus, æstivus, autumnalis, hyemalis: quorum quilibet peculiare suos morbos fovet & producit. Conf. *Hippocratis* lib. III. aph. 20.

tempus

diei, diurnus, nocturnus, matutinus, vespertinus: quorum vespertinus & nocturnus imbecillioribus valde adversi, præsertim si frigidi & humidi.

ALIMENTA, sive **CIBUS & POTUS**: ubi consideranda eorum

1. *Origo*; ex regno vegetabili & animali, id est vel e plantis vel ex animalibus.
2. *quantitas*: cuius respectu optima est moderata, excedens vero vel deficiens, noxia. Plures vero quantitate excedente, quam deficiente peccant. *Natura enim paucis est contenta.*
3. *qualitas*; unde quædam sunt *evpepta, dyspepta, eucbyma, cacochyma, calefacientia, refrigerantia.* &c.
4. *tempus* assumendi: jentaculum, prandium, coena &c.
5. *ordo* assumendi varius esse potest. Cavendum tamen, ne calidis modo assumtis mox frigida superingerantur, nec mox post pingua potus &c.

MOTUS & QUIES, vel excedens, vel deficiens, vel moderatus & reficiens.

SOMNUS & VIGILIÆ: in quibus observanda

- quantitas*; excedens, deficiens, vel sufficiens.
- qualitas*; utrum somnus sit quietus, an turbulentus; naturalis, an præternaturalis; reficiens, an debilitans &c.
- tempus*; diurnum, nocturnum, } nocturnæ,
meridianum, lucubrationes } antelucanæ

EXCRETA, sive **EXCREMENTA**; sunt alvus, urina, transpiratio, sputum, mucus, cerumen, menstrua, lochia, hæmorrhoides &c. circa quæ observanda, ut debita copia sive quantitate, qualitate, tempore & loco prodeant: quia alias morbos faciunt.

ET

RETENTA; sunt humores boni & spiritus, ad quos pertinent sanguis, saliva, bilis, succus pancreaticus, liquor gastricus, genitalis, lacrymalis, &c.

ANIMI AFFECTUS, sive **PATHEMATA**; circa quæ consideranda

| Divisio, in

jucunda, ut gaudium, lætitia, spes, desiderium.

molesta, ut ira, terror, mœror, tristitia, invidia, odium, metus.

mitiora & vehementiora.

Effectus, in humores & spiritus:

molesta, spiritum & humorum motum turbant, sistunt, figunt.

jucunda, excitant, recreant, roborant, transpirationem promovent.

vehementiora, sive immoderata, humores turbant & vehementer sæpe lædunt: moderata & jucunda recreant; speciatim vero ira turbat; terror, mœror, & tristitia figunt; gaudium, sive lætitia, desiderium & spes humores fixos excitant, expandunt. Hinc affectus, ut CELSUS ait, *neque nimis excitandi, neque nimis supprimendi.*

I. PHARMACIA. In hac considerantur Medicamentorum

DIVISIO.

simplicia; quæ petuntur ex triplici regno, *vegetabili* nimirum, *animali*, & *minerali*.

composita, ex variis simplicibus.

COGNITIO: quæ est vel

externa & nominalis; quando eorum nomina & faciem externam discimus; quo BOTANICA maxime pertinet.

interna, qua vires discimus. Quarum principia cognoscenda sunt vel

universalia, a } *priori*, ratio; ex odore, sapore, tactu.

particularia, a } *posteriori*, experientia.

extrinseca;

color; ut rubra plerumque adstringunt,

odor; ut fragrantia & aromatica sunt calefacientia; fœtida, uterina.

textura ; ut mollia & lubrica : sicut al-
thea , malva , violaria ; olea , &c. e
mollunt .

signatura ; quando figuram membri re-
ferunt ; quæ vero plerumque vena est
intrinseca ; *sapores* : ut amarus , salus
acris , aromaticus , insipidus , acidus
terreus , austerus , adstringens , dulcis
pinguis .

FACULTATES , quæ vulgo habentur vel

temperatæ vel	Hæ o- mnes rursus sunt vel	} alterantes : ut calefacien- tia, frigefacientia, hume- stantia, siccantia, emolli- entia, adstringentia, alexi- pharmaca , cephalica , stomachica &c. &c.
secundariæ		
manifestæ vel		
occultæ .		
primariæ vel		} <i>evacuantes</i> universales , purgantia , sudori- fera , diaphoretica , diureti- ca , salivatoria . particulares , vomitoria , errhi- na , masticatoria , apophleg- matizantia .
intemperatæ .		

ELABORATIO ; quæ est vel *galenica* , vel *chemi-
ca* ; eamque absolunt

præparatio ; cui inserviunt pulverisatio , tritura ,
alcolisatio , cribratio , sectio , rasura , limatura ,
infusio , coctio &c.

solutio : quæ fit *menstruo* vel

} aqueo } sulphureo } salino	} quo spectant deliquium , crySTALLISA- tio , coagulatio , decantatio , fil- tratio , colatio , trajectio , infu- sio , coctio , digestio , expressio , despumatio , clarificatio , extractio , liquefactio , præcipitatio , efferve- scentia .

destillatio , ubi notanda

antecedentia ; ut *maceratio* , *putrefactio* , *fermentatio* ,
desti-

destillatio ipsa ; quæ est vel *humida* , vel *sicca* .
consequentia ; *rectificatio* , *circulatio* , *cobobatio* ,
alcolisatio .

Calcinatio : quæ fit fusione , fulguratione , deflagra-
tione , detonatione , vitrificatione , amalga-
matione , cementatione , fixatione , reverbe-
ratione &c.

COMPOSITIO, ubi notanda

1. *Differentia* , sunt enim compositiones vel
officinales , vel *extemporaneæ* , vulgo *Receptæ* ,
gelenicæ aut *chemicæ* .

2. *Basis medicamenti* , *juvantia* & *corrigentia* .

DOSIS, sive *quantitas* : quæ determinatur vel

pondere , ut *libra* ℔ , *uncia* ℥ , *drachma* ℥ ,
granum gr. , addito numero .

mensura { siccorum : sunt *manipulus* , qui indi-
catur littera M ; *pugillus* , p.
liquidorum : *libra* , *uncia* , *drachma* ,
scrupulus , *gutta* gt.

numero , ut in fructibus , pillulis , rotulis .

CONSISTENTIA est vel

Cliquida , eaque vel quoad

Cinterna : ut *infusum* , *decoctum* , *aquæ destil-*
latæ , *julepi* , *emulsiones* , *potiunculæ* , *spi-*
ritus , *tincturæ* , *essentiæ* , *elixiria* , *olea* ,
mixturæ : quæ ultimæ rursus sunt vel
diffusæ
concentratæ .

externa : ut *clysteres* , *epithemata* , *collyria* ,
balnea , *pediluvia* , *gargarismata* , *collutio-*
nes oris , *injectiones in os* , *oculos* , *anum* ,
uterum , *ulcera* , *vulnera* , *pectus* , *urethram* ,
vesicam &c.

solida sive *sicca* , eaque rursus vel

Cinterna , *pulveres* , *salia* , *magisteria* , *pillulæ* ,
morfuli , *trochisci* , *rotulæ* .

externa , *suppositoria* , *emplastra* , *epithemata*

sicca , *pesti* &c.

media, sive mediæ constitutionis, vel
interna; ut electuaria, rob, extracta, boli-
 linctus, conservæ, condita, sirupi.
externa: unguentum, linimentum, catapla-
 ma, ceratum, balsamum.

CUSUS rectus: ubi requiritur

1. *quantitas* determinata, tam continua, quam discreta: quantum scilicet quavis vice sumendum sive exhibendum.
2. *qualitas* concinna, in debita virtute, consistens, soliditate, fluiditate, crassitudine, colore &c. consistens.
3. *modus* conveniens, medicamentum rite adhibendi, sive extra, sive intra corpus usurpetur.
4. *tempus* opportunum.

REGULÆ ET CAUTELÆ PHARMACEUTICÆ

1. Medici & pharmacopœi, qui medicamenta dare aut præparare, eaque ægris præbere volunt, *simplicia* ex triplici regno *probe prius cognoscere*, bonaque corruptis & inutilibus discernere *discant*; ne noxia vel inutilia loco bonorum adhibeant.

2. Igitur & *Botanicam* probe calleant; ne falsæ inutiles, vel prorsus noxiæ aut venenatæ radices vel herbæ loco salutarium, ut haud raro in pharmacopœiis ab imperitis pharmacopœis, cum maximo ægrorum damno, fieri solet, usurpentur.

3. Medicus quoque *artis chemicæ* probe sit peritus quia ejus ope præstantissima & valentissima nonnulla remedia, quibus in Medicina feliciter facienda care haud possumus, præparantur.

4. Magna vero cautela opus est, ut *medicamenta chemicæ arte confecta*, præsertim quæ ex mercurio antimonio constent, quam accuratissime atque maxima cura elaborentur; quia alias facile quam nocentissima fieri possunt.

5. In medicamentis etiam dandis, itemque in cor-
 pos-

fitis præparandis pharmacopœi summo opere cavere
bent, ne in defectu alicujus simplicis aliud quod-
m pro lubitu & sine præscitu Medici adhibeant, &
vulgo dici solet, *quid pro quo substituant*: ne medi-
mentum inutile aut prorsus noxium inde emergat.
6. Medicus *doses medicamentorum*, præsertim valen-
rum aut vehementiorum, cum primis vero *mercuria-*
m, antimonialium, opiatorum, vomitoriorum, & pur-
gantium probe calleat, ac memoria teneat; quia alias
ormes, & mortiferos errores facile committere potest.
7. Ita & *Pharmacopœus* in ejusmodi medicamentis
tribuendis & ponderandis quam cautissime atque ac-
curatissime procedat.

CHIRURGIA, pars Medicinæ, teste CELSO,
lib. VII. in præfatione) *vetustissima, ac certissima*;
in qua consideranda

CHIRURGUS; qui est *Medicus manu potissimum*
sanans. Hujus præcipue virtutes sunt, ut bene co-
gnoscat corporis humani fabricam, ut sit manu stre-
nua, stabili, non intremiscente; acie oculorum
acri claraque; animo intrepidus, &, ubi opus,
immisericors, ne clamore ægri motus, vel magis,
quam res desiderat, vel minus quam necesse est,
trahat, pellat, secet, urat; *sed perinde faciat*
omnia, ac si nullus ex vagitibus alterius affectus
oriatur. CELSUS, lib. VII. in præfat.

INSTRUMENTA; quæ sunt vel

Naturalia: ut

| manus ipsius chirurgi, quæ fere præcipuum
| atque utilissimum ejus instrumentum.
| famuli, sive ministri & adstantes; itemque
| ignis & lumen.

Artificialia: quæ dividi solent in

- *Cuspidatiora, sive portatilia*; ut scalpellum phle-
| botomum, scalpellum rectum & falcatum,
| forfex, specillum simplex, specillum falca-
| tum, vossella, acus curvæ cum filo variæ ma-
| gnitudinis, specillum pro ore inspiciendo.

variora ; trepanum , ferra una cum reliquis amputationis requisitis , acus ad cataractam supprimendam , acus cannulata pro paracentesi , instrumenta ad lithotomiam , a cancerum extirpandum , syringotomi , forcipes , siphones , cauteria , elevatoria &c.

rarissima ; quorum varia pro variis casibus rarioribus ab *Albucase* , *Paræo* , *Andrea Cruce* , *Ruffio* , *Hildano* , *Aquapendente* , *Sculteto Solingen* , *Dionysio* , *me* , in chirurgia mea & *Garengeot* delineantur ac describuntur.

3. OPERATIONES CHIRURGICÆ ; quæ in tres classes vulgo dividi solent & possunt : ut sunt

SYNTHESIS , sive conjunctio partium præter naturam disjunctarum : earumque vel

mollium ; ut in vulneribus , ulceribus , rupturis , contusionibus , labris leporinis , &c.

durarum ; ut in fracturis , luxationibus , carie

DIAERESIS ; est divisio partium vel præter naturam conjunctarum , ut in digitis coalitis , ano , partibus genitalibus , naribus , aut palpebris concretis ; vel secundum naturam conjunctarum , ut in venæsectione , arteriotomia , fonticulis excutandis , abscessibus aperiendis &c. &c.

APHÆRESIS , est ablatio , sive remotio partium noxiarum aut supervacanearum : ut sunt membrum sphacelo corrupta , carnes excrescentes , verrucæ polypi , cancri , steatomata , sarcomata &c.

EXÆRESIS , sive **EXTRACTIO** ; ut urinæ vel calculi e vesica , foetus aut secundinæ ex utero , glandium plumbearum , sagittarum , frustorum gladii , vestium , vitri ex vulneribus ; rerum peregrinarum ex auribus , oculis , faucibus .

PROSTHESIS est additio sive restitutio partium deficientis : estque vel cura

Opalliativa tantum , ut in nasi , aurium , manuum , pedum , & oculorum qualicumque restitutione per certas machinas .

vera ;

Uera ; quo referri potest *chirurgia curtorum*, de qua *Taliacotius* ; & *chirurgia infusoria* : qua in certis morbis, vel enormibus hæmorrhagiis, lac vel jusculum, in venas loco sanguinis, vel medicamenti infunditur.

DIORTHOSIS est reductio membrorum vitiatorum & curvorum ad naturalem figuram ; ut in luxationibus, gibbere, collo, pedibusque incurvatis, visu lusco, hernia intestinorum, omenti.

REGULÆ QUÆDAM CHIRURGICÆ.

1. Ut in rebus politicis *omnia prius consiliis, quam armis, experiri decet* ; ita in Medicina, & cum prius Chirurgia, blandiora semper remedia prius tenenda, antequam ad duriora aut vehementiora, ferremus scilicet aut ignem, procedamus.

2. In *adeundis periculis*, sapientissime ait **CICERO**, *consuetudo Medicorum imitanda est, qui leviter ægrotantes leniter curant ; gravioribus autem morbis periculosas etiam curationes & ancepites adhibere coguntur*, de sic. lib. 1. cap. 24.

3. Melius tamen est, ut **CELSUS** dixit, in *desperatis morbis anceps experiri remedium, quam nullum*.

4. Hinc & **HIPPOCRATES** præcepit, *ad extremos morbos extrema etiam adhibenda esse remedia*. Aphor. sect. I.

5. Chirurgus igitur non sit crudelis, ubi leniori morbo rem expedire potest : adeoque hernia, calculo, carcinomate, gangræna &c. laborantes non secet, quamvis blandiori ratione æger sanari potest.

6. Attamen si necessitas id exigit, *non sit timidus*, ægro mora justo diuturniori non noceat : quia sæpe mora periculum hic est ; sed *intrepidus*, & omnia faciat, quæ ad ægrum servandum utilia ac necessaria sunt. Nam sæpe

immedicabile vulnus

Enje

Ense recidendum est, ne pars sincera trahatur.

7. Quod Medicamentum non sanat, ferrum sanat quod ferrum non sanat, ignis sanat; quod ignis non sanat, insanabile est. Aphor. 6. sect. VII.

8. De curationibus chirurgicis, quæ cum periculo fiunt, attamen nullum aliud auxilium superest, CELSUS aptissime ait: nihil interest, an satis tutum præsidium sit, quod unicum est; lib. VII. cap. 33.

9. Chirurgiæ effectus inter omnes Medicinæ partes evidentiissimus: (Celsus lib. VII. in præfatione) & primos celebriores Medicos, chirurgos fuisse, solumque chirurgicam ab ipsis excultam fuisse constat ex CELSUS præfat. lib. I. præmissa.

10. Frigidum inimicum ossibus, dentibus, nervis medullæ in spina, ulceribus; calidum vero amicum Aphor. 18. & 20. sect. V. Pingua & oleosa ossibus quæque sunt inimica.

DE OPTIMA MEDICINAM DISCENDI RATIONE,

Librisque, quos studioso Medicinæ maxime necessario esse judico.

I.

QUI in studio medico magnos hodie profectus facere, atque præclarus & genuinus Medicus evadere satagit, is ante omnia earum linguarum notitia instructus sit necesse est, quæ utilitatem ipsi hac in re afferre possunt, atque simul litteris, quas humaniores appellant, probe instructus.

2. Adeoque præter linguam vernaculam præ cæteris probe calleat linguam latinam, atque etiam, quantum fieri potest, bene versatus sit in græca; saltem in hac tantum sciat, quantum opus est ad significationes & etymologias vocabulorum, quæ græcæ in Medicina sunt originis, probe intelligendas: quia hæc scientia mul-

altum confert ad res ipsas tanto melius & percipiendæ & memoria retinendas.

3. Præterea quia hodie multi libri quam utilissimi & præstantissimi in arte salutari in universum, & in primis in variis partibus sigillatim, *Gallica*, *Anglica*, atque *Italica lingua* a præclaris viris eduntur, & mehercules tanto majores progressus facere poterit, qui harum linguarum haud imperitus est; ut sic, quicquid boni & novi in his linguis conscribitur, legere, intelligere, atque fructus inde multos, eosque bene insignes præ aliis capere queat.

4. Quodsi forte quis aliquando etiam *itineræ in has regiones facere velit*, tanto majorem utilitatem ex illa linguarum scientia percipiet: dum hac ratione tantum melius non solum cum eruditis, verum etiam cum peritis chirurgis, pharmacopœis, chemicis, hortulanis &c. colloqui potest, atque sic multa cognoscere & intelligere, quæ ipsum sine hac notitia sæpe latuissent. Deinde ut melius etiam de rebus quibuscunque & differere, & scribere, & ratiocinari discant, atque in disputationibus quoque, tam solemnibus, quam privatis, aptum sermonem præferre, ac syllogismos idoneos formare, eosque etiam, ubi res hoc exigit, impugnare aut destruere valeant, *eloquentiæ* qualicumque studium, & arte bene cogitandi sive *Logica* opus est; iisque, qui ad paullo majorem eruditionem, quam quæ vulgaris Medicus clinicus indiget, aspirant, partim obstruam causarum, partim ut de rebus sublimioribus, præsertim inter eruditos, tanto melius quacumque occasione differere queant, etiam *Metaphysica* non minus negligenda. *Morale* vero studium, ut se apud doctosque, præsertim apud magnates meliorisque conditionis homines gratos reddere queant, haud obiter negligendum esse duco. *Medicus enim Philosophus*, Hippocrates ait, ἰσόθεος, Deo similis est.

5. Porro ex philosophicis disciplinis quam maxime eam naturalium quoque *scientia* sive *Physica* futuro Medico bene perspecta esse debet. Nam Hippocrates hoc
jam

jam suavit futuris Medicis, dicendo: *conare, ut physicus evadas*: atque antiquum jam idque verissimum dictum est: *Ubi desinit Physicus, ibi incipit Medicus*. Opera vero danda, ut ex ea res Medico maxime necessarias, ut doctrinam de *aere, aqua, igne, terra, mineralibus, salibus, vegetabilibus, & animalibus* sibi probe cognitam reddat. In qua vero apte addiscenda, præter vivam boni Præceptoris vocem, Verdriesii *Physicam* inter alias commendo; cui & *Vvolfiana* aliave recentioribus, si placet, jungi potest.

7. Quoniam vero corpus nostrum artificiosissima quidam *machina* est, ut a quamplurimis jam probatum est, atque actiones, quæ in eo fiunt, secundum *mechanicas regulas & fundamenta* peraguntur, & quicquid certæ cognitione functionum corporis nostri habemus, ex *mechanica scientia* unice fere obtineamus: hinc *mathematica studia*, & cum primis ex quamplurimis ejus partibus, *Mechanica, Statica, Hydraulica, hydrostatica, Optica & Acustica* sedulo excolenda, quia sine his præque actiones corporis nostri intelligi recte nequeunt. Tyroni, præter idoneum doctorem, Cl. Wolffii scripta mathematica aliave recentiora sufficere possunt.

8. Vario deinde modo ac via ad *studium medicum addiscendum* pergi potest. Vel enim *Institutiones medicæ* primum audire ac discere potest, quæ fundamenta ideam præbent omnium Medicinæ partium; vel *Anatomiam & Botanicam* his pro lubito, vel prout occasio Academis fert, præmittere, etiam hæc studia simul diversis scilicet horis conjungere: quia hæc omnia fundamenta probe exstruenda firmandaque faciunt: varietas hæc objectorum delectat atque excitat, nullo modo, ut nonnulli putant, confundit. Nec interest, quoniam nam alteri vel præponatur, vel postponatur, quemadmodum quidam nimis rigoroſe existimant; si modo hæc partes omnes Studiosus Medicinæ primis annis addiscat. Id quod & in linguis variis, aliisque nonnullis medicis partibus, *chemia* scilicet, *pharmacia, chirurgia*, & addiscenda verum esse puto: utpote in quibus ad
scien-

addiscendis nullus adeo strictus ordo observandus est, si-
ve hæc pars priori, si-ve posteriori loco addiscatur.

9. Pro *institutionibus* si-ve fundamentis primis hæc no-
stræ, si arrident, inservire possunt; quibus si lubeat,
vel Frid. Hoffmanni medicina rationalis, vel Boerhaa-
vii institutiones, aliæve similes jungendæ; quamvis hæc
ultimæ sine prudenti præceptore a tyrone vix intelli-
gi queant.

10. Pro *anatomicis* addiscendis fundamentis, com-
pendium nostrum anatomicum haud ineptum est, cui ob-
figuras Bartholinus, Verheyenus, aut Kulmus, &, qui
sallicia intelligit, Winsloei expositio corporis humani,
omnique ad altiora in hoc studio aspirat, atque controver-
sas etiam nosse desiderat, Morgagnii scripta anatomica
addenda. Speciatim vero diligenter tam in cadaveribus
humanis, quam brutis incidendis se exerceat: atque in
musculis *Cowperi*, in nervis *Vieussenii* figuris utatur.

11. Ad REM HERBARIAM si-ve BOTANICAM
rationaliter, secundum certa scilicet fundamenta, co-
noscendam, pro optimo compendio & fundamentis hu-
ius scientiæ acquirendis commendamus RAII *methodum*
plantarum. Ditiore *TOURNEFORTII institutiones*
herbariæ his addere possunt, & deinde quamplurimos
alios Botanicos recentiores scriptores. Præterea ad prom-
ptam notitiam plantarum comparandam quamplurimum
valet *inspectio earum frequens*, præsertim quando a pru-
denti Botanico demonstrantur, notæque earum rite indi-
cantur atque explicantur. Si quis autem plantas apte
percipere, atque in *herbarium siccum* colligere studet, ille
tanto majores hic facere potest progressus: quam deinde
persequens perlustratio scriptorum Botanicorum, qui aptas
figuras & descriptiones earum dederunt, ut Matthioli,
Tabernæmontani, Lobelii, Donæi, Bauhini, Clusii, Cha-
ræi, Horti Eystettensis, Amstelodamensis, Breynii, Ri-
ni, & aliorum recentium multum provehere potest.

12. Ad vires vero plantarum addiscendas, postquam
prius earum faciem externam, odorem, & saporem
cognoverunt, commode adhiberi potest vel Franci *Flo-*

ra, vel Hermannii *materia medica*, aut Dale Pharmacologia, vel LEMERII liber de medicamentis simplicibus, itemque Wedelius de Medicamentorum facultatibus.

13. Eodem tempore vel & paullo post proderit præcipuos ac *præstantissimos scriptores medicos*, & quid de singulis judicandum sit, probe cognovisse. Hanc in rem maxime laudo Conringii nostri *introductionem in artem medicam*; quæ vero, quia jam dudum conscripta est adeoque de recentioribus non agit, operam dabo, ut brevi usque ad hæc nostra tempora in usum tyronum Medicinæ continuetur. Præterea etiam Lindenius de *scriptis medicis*, a Mercklino auctus, huic scopo servire multum potest. *Lexicon simul medicum* tyroni valde est necessarium, ut vocabula ignota medica, terminosque ut vocant, technicos, si qui inter legendum vel audiendum occurrunt, quos nondum novit, evolvere eosque inde intelligere possit. Hunc in finem vel Brunonis vel Blancardi *Lexicon Medicum* adhibendum est.

14. Absolutis generalioribus illis fundamentis medicis, (vel etiam pro re nata simul cum his) opus est, ut partes medicinæ varias curiosius ac specialius sensim pertractet. Et quamvis **PHYSIOLOGIA** sive doctrina de *usu partium*, in demonstrationibus ac scholis anatomicis ab idoneis magistris plerumque jam tradi soleat tamen lectiones speciales physiologicas, ut tanto firmiora medicinæ fundamenta ponantur, instituere haud alienum est: mihi que hic aptissimæ videntur physiologia vel Bohnii, Ortlobii, Bergeri, Vateri, Boerhaavii, vel Frid. Hoffmanni ex medicina rationali. Ex veteribus Galeni libellus de *usu partium* legi meretur.

15. Pro **PATHOLOGIA** sive morborum notitia secundum mechanica principia comparanda, rursus vel Boerhaavii vel Hoffmanni *pathologia* ex libris modo indicatis peti potest. Qui vero *Stahlianæ principia* nosse desiderant, quibus anima omnium actionum, cum secundum, tum præter naturam, auctor constituitur vel ipsius Stahlî Physiologiam, & Pathologiam, ve-

nius ex sectatoribus ejus legant ; quamvis forte dulcius ex ipso bibantur fonte.

16. SEMIOLOGIAM , five cognitionem , & prædictionem morborum Hoffmannus conjunxit cum pathologia ; seorsim vero eam ex recentioribus bene tradiderunt Wedelius & Vaterus in Semilogiis speciatim conscriptis , atque Boerhaavius in institutionibus suis medicis.

17. De HYGIENE, ac *Dieta*, cui hæc, quæ supra pag. 445. & seq. tradidi, non sufficere videntur, ubi consulat Hoffmannum in Medicina ration. tomo secundo, vel Boerhaavium in inst. vel Bruyerium de cibaria, vel Beberovicum in thesaur. sanitatis. Speciatim de studioforum sanitate tuenda Gr. Horstius ; de litteratorum sanitate Wedelius ; de Principum Valetudine Ramazzinus, idemque de *vita sobriæ commodis*, aliive evolvi possunt.

18. In THERAPIA morborum rite addiscenda maxime utilitatis sunt Aphorismi Boerhaavii de *cognoscendis*, & *curandis morbis*, itemque Fr. Hoffmanni Medicina rational. Tom. III. ac seq. & forte illud Compendium Medicinæ practicæ, quod brevi edere constitui. His si Hippocratis, Sydenhami, Baglivii, Lancii, & Ramazzini scripta practica, ac speciatim *ratione curationis febrium* intermittentium Tortus, atque doctissimæ observationes, & cautelæ Werlhofii adduntur, magnum emolumentum inde capere poterunt. Si vero secundum Stahlî placita curationes instituevolunt, Nenterî, vel Junckerii vel Storchii systematata practica evolvant ; vel eadem vernacula nostra Weisbachii vel Gohlî libris practicis, quasi in comædio, perspiciant.

19. Ad *materiam medicam* simplicium cognoscendam, præter inspectionem diligentem & scriptores supra (n.) jam laudatos, Macassii promptuarium *Materiæ medicæ*, Grube de Medicamentis simplicibus cognoscendis, aut Schrœderi *Pharmacopœia*, vel Valentini Museum conducunt. Ad *composita* vero discenda vel

Pharmacopœia Augustana, vel Borussica, vel Lemerii Pharmacopœia, vel Lexicon etiam Pharmaceuticum Jungkenii tyroni sufficere videtur.

20. Quoniam vero & CHEMIA, tam ad corporum naturalium quorumcumque, quam ad medicamentorum naturam & vires explorandas, sicut & ad idonea atque efficacissima nonnulla remedia præparanda, & adhuc nova invenienda, vel jam cognita corrigenda, Medico utilissima est; præter fidelem manuactionem ab idoneo magistro (id quod & in ceteris partibus addiscendis intelligi volo), vel Rothii chemia, germanice edita, vel Wedelii, aut Teichmeieri, vel denique, qui profundius nobilissimam hanc artem penetrare ac comprehendere cupit, Boerhaavii Elementis chemicis utatur, eisque tandem & Stahlî & Hoffmanni scripta chemica jungat. Qui gallicam callent linguam, le Febure, Lemerii, Senaci, & Molovini opuscula chemica legere quoque possunt.

21. *F formularum Medicarum* conscribendi rationem Medicinæ Candidatus quam accuratissime addiscat. Hæ enim potissimum esse videntur, ex quibus & Medici & Pharmacopœi junioris Medici vel scientiam, vel ignorantiam dijudicare solent. Legere hunc in finem possunt vel Morelli, vel Wedelii, vel Ettmuleri libellos de formulis medicis; vel etiam Eyselii, Fickii aut Junckeri, aliosve de hoc argumento.

22. Pro CHIRURGIA, præstantissima illa, & antiquissima Medicinæ parte rite addiscenda, tyroni merito chirurgia idoneam opem ferre poterit. Qui vero ad majorem hac in arte aspirant scientiam, præter usum, Garengœoti operationes chirurgicas, Chaberti & Drânii observationes; ex veteribus vero Celsum, Aeginetam, Paræum, Fabr. ab Aquapendente, Hilidanum, Scultetum, aliosque, quorum quamplurimi sunt, jungat. Sed de specialibus chirurgiæ partibus quæ scripserunt, videri possunt in chirurgia nostra, proxime latius edenda; plures enim sunt, quam ut hic recenseri queant.

23. Præterea propter nova instrumenta chemica, chirurgica, & anatomica, itemque propter novas elegantioresque plantas, ac flores, ut & propter morbos sive casus peculiare chirurgicos delineandos, futuro medico quam *utilissima est ars delineandi aut pingendi*; ut, si quid tale notatu dignum observat, illud apte delineare, & si postea lubet, pro usu publico etiam describere valeat.

24. Interea studiosus Medicinæ frequenter quoque *disputando, opponendo, & respondendo* per omnes Medicinæ partes se exerceat; qua ex re non solum varietatem opinionum, verum etiam veritatem tanto melius investigare, cognoscere, dijudicare, atque complecti poterit. Eundem in finem, atque etiam pro variatione quâdam, & *oblectamento, physico, & medico* egregie prodest lectio observationum Medicarum, & Physicarum: ut Actor. Acad. Nat. curiosorum, Anglicanæ, Gallicæ, Petropolitane, Bononiensis, Acta Hafniensia, & cum primis jam *commercium Literarium universale*, quod Norimbergæ prodit.

25. Ubi tandem omnes has Medicinæ partes justo tempore rite excoluit, atque memoriæ probe mandavit, ad CONSULTATIONES Medicas, tanquam ad finem, & scopum suorum studiorum academicorum se conferat. Multos quidem consultationum scriptores habemus inter paulo vetustiores; sed tyroni suadendum, ut præter ejusmodi prælectiones, & manuactionem per casus veros, & non fictos, apud peritum Professore practicum quotidie occurrentes, Fr. Hoffmanni *Consultationes, & consilia Medicinalia* diligenter legat, atque elegat: ac simul observationes recentiorum præstantissimorum practicum Medicorum, cum primis vero, quæ jam in Commercio litterario Norimbergenfi, & Actis naturæ curiosorum, aliorumque collegiorum, aut præstantiorum observatorum Medicorum occurrunt scriptis, probe perpendat, ac memoriæ imprimat.

26. In *Medicina vero FORENSI*, ubi coram magistratu de variis rebus medicis ad forum pertinentibus respondendum, Medicus quoque hospes esse non debet. Ve-

rum ex Bohnii lib. de Officio Medici duplici, clinico, & forenfi, itemque ex ejus libro de Vulnerum renunciatione, atque Teichmeieri *institutionibus* Medicinæ forensis, præcipua fundamenta petet: quibus deinde Ammanni Medicina critica, Zittmanni Medicina forensis, Valentini scripta forensia, imo & Zacchiæ quæstiones medicolegales, variique alii jungi possunt.

27. Denique etiam his tunc temporis, & quando ad Medicinam faciendam, sive, ut vulgo dicunt, ad praxin medicam exercendam, se conferre volunt, suadeo, ut jactis probe prædicta ratione fundamentis, etiam antiquissimos præstantiores Medicos, & ex his cum primis Hippocratem, & Celsum, *latinum Hippocratem*, magna cura, quam diligentissime legant atque relegant, & præ cæteris Hippocratis ejus aphorismos sibi bene notos faciant: ut non solum inde discant, quid & quantum veteres hi jam in Medicina sciverint, & quousque progressi fuerint; sed potissimum, ut eorum regulas practicas, tam ad cognitionem, & prædictionem accuratam, quam etiam ad curationem morborum pertinentes, easque, non ex hypothesibus vanis, sed ex diuturnis, & frequentibus observationibus, sive experientia natis memoriæ bene imprimant, atque occasione occurrente in similibus casibus prudenter imitentur. Præterea ex Celso, elegantissimo scriptore Medico Romano, & propterea *Medicorum Cicero* dicto, etiam eleganter latine scribere discendum est Medicis, præsertim iis, qui aliquando Medicinam vel docere, vel saltem per scripta rem medicam augere exornareque contendunt.

28. Postremo, ut tam memoriæ, quam posteritati etiam magis consulant Medicorum filii, quam maxime e re erit, quæcunque utilia, curiosa, rara, & observatu digna vident, audiunt, vel in fide dignis auctoribus legunt, quæ ipsis hætenus incognita fuerunt, in locos communes, ut vocant, congerant, ut suo tempore has res tanto melius invenire, atque in usum, & utilitatem suam commodius convertere queant. Fieri in hunc usum, me quidem iudice, pro quavis medicinæ parte possunt pecu-

peculiares libelli: ut anatomici, physiologici, botanici, chemici, chirurgici, practici, quos *Adversaria* quoque appellant, in quos, quicquid in hac vel illa artis salutaris parte notatu dignum vident, audiunt, vel legunt, inferant, litterisque consignent, vel pro quavis parte peculiaris liber, charta pura interpolatus, ut v. gr. pro anatomicis novis inventis, vel observationibus, Compendium meum anatomicum adhiberi haud inepte potest; pro chirurgicis, *Chirurgia mea*; pro rebus physiologicis, aliqua physiologia ex recentioribus; pro chemicis, aliquod ejusmodi compendium chemicum; pro practicis, aliquod practicum, atque sic porro in ceteris est faciendum Medicinæ partibus.

29. Omnibus autem his tandem ornamentum atque emolumentum insigne addere possunt Itinera prudenter instituta: cum primis ad loca, ubi celebres Medici, & Chirurgi vivunt, aut docent, & ubi magna sunt *nosocomia*, magnaue ægrorum copia quotidie videri potest. In itinere vero exterisque cum primis regionibus *prudenter, caste, ac sobrie vivat*, ne facile in morbos, aut ipsius vitæ periculum incidat. Iis in locis Medicus junior claros eruditosque Medicos, & Chirurgos, Chemicos etiam atque Botanicos, imo etiam mechanicos præstantiores, qui instrumenta physica, anatomica, & chirurgica conficiunt, aptis moribus atque decenti observantia adeat, & cum iis omnibus civiles, ac prudentes sermones instituat, consilia ab ipsis petat, difficultates resolvendas, vel explicandas ipsis modeste proponat, res novas ad medicinam attinentes ex ipsis exquirat, & quidque notatu dignum apud ipsos audit, vel videt, memoriæ primo, deinde & chartæ quoque committat. Qui animum & manus ad chirurgiam speciatim applicare cupit, cum præstantioribus chirurgis, præsertim eorum, qui vel in magna praxi versantur, vel qui nosocomiiis majorum civitatum præsunt, amicitiam contrahere studeant, eosque in visitatione ægrorum, imo & in deligatione eorum sæpius comitetur, atque, si liceat, adjuvet, in primis quando operationes chirurgi-

cas instituunt, eas inspicere satagat, & quomodo ipsas perficiant, ac deinde etiam, quomodo in curatione procedant, probe observet, easque deinde primo in cadaveribus, ac tandem etiam in vivis imitari contendat. Ita & *bibliopolas*, præsertim præstantiores visitet, & an novos aliove bonos libros apud ipsos invenire queat, perspiciat, ut sic librorum scientiam adaugeat.

30 *Quos res herbaria delectat*, frequentent diligenter *hortos medicos*, vel *magnatum*, ubi multæ plantæ, tam inquilinæ, quam exoticæ excoluntur, videantque, an hæcenus ignotas ibi inveniant, easque addiscere studeant. Observent quoque ibidem simul *hybernacula*, qua ratione ea sint constructa, ut plantæ exoticæ hyeme optime, & facillime minoribusve sumtibus conservari queant; & quomodo vere in *tepidariis* rariores, & delicatiores plantas elevent, ac postea colant, melioresque modos discant, & notent, ut eos aliquando imitari valeant. Ita & *laboratoria*, ut vocant, *chemica*, vel officinas præstantiorum chemicorum visitent, atque an boni, & novi quid vel circa medicamenta, vel furnos chemicos, vel instrumenta occurrat, notent; imò qui artem delineandi callent, quicquid vel his in rebus, vel in anatomicis, chirurgicis, & botanicis notatu dignum observant, delineent: ita egregium inde aliquando emolumentum capere, & suo tempore in usum adhibere, quin etiam subinde emendare, aut corrigere valebunt. Denique etiam in bona, & *probata remedia* ubique inquirant; eaque in re non pudeat etiam ab empiricis, & aniculis quandoque aliquid discere, si modo illud cum successu sæpius usurpatum sit. Conf. uberior, si lubet, Bartholinus libro de *peregrinatione medica*.

31. Ultimo loco si forte bellum est, iis, qui speciatim chirurgiæ se dare constituerunt, longe optimum est, jactis prius fundamentis, *nosocomia etiam castrensia* per aliquod tempus, imò per aliquot annos, si commode id fieri potest, frequentare, operamque dare, ut ipsi hic manum in deligandis ægris, variisque operationibus chirurgicis perficiendis, præsertim sub du-

ctu,

, consilio, vel auxilio experti alicujus chirurgi, ut ego quondam feci, diligenter admoveant; his enim locis ut plurimum optimæ occasiones hisce in rebus amplurimum proficiendi, & habitum, ut vulgo dicitur, in chirurgia animumque intrepidum sibi acquirit, idque eo magis, quo diutius ejusmodi in locis cum studio, & ardore, laboreque improbo santur: ubi simul præcipui casus, & operationes e sunt notandæ.

2. Postremo, quando studia, & itinera sua feliciterolverunt, & ad Medicinam faciendam sic se verepos reddiderunt, haud etiam ignorare debent optimum modum visendi, vel visitandi ægros ad lectum. quidem jam in Chirurgiæ nostræ prolegomenis præcipua fere hac in re observanda, & facienda proponimus, & supra etiam adhuc nonnulla hoc in comendio monuimus: attamen qui plura adhuc utilia morum, ac præcepta nosse cupit, cum fructu vel Claudii, libro de ingressu ad infirmos, vel Scharandæum, de peculiari de modo, & ratione visendi ægros, vere poterit.

. Qui igitur hac ratione studium suum medicum tuet, regulasque sanæ, & christianæ Philosophiæ ætalis præcipuas (quas esse puto, pie honesteque vivendi, neminem lædere, ac suum cuique tribuere) bene servabit, Deo benedicente, quam certissime bonus, & præclarus evadet Medicus, atque tam ad lectum, quam ad forum, quam ad cathedram vere idoneus.

BRI, QUOS STUDIOSO MEDICINÆ HOC
TEMPORE PRÆ RELIQUIS MAXIME
NECESSARIOS ESSE JUDICO.

Lexicon Medicum, pro vocabulis medicis ipsi ignotis, quæ inter legendum vel audiendum occurrunt, addendis, vel Blancardi; vel quod adhuc melius videtur, Brunonis Lexicon medicum.

Ad Anatomiam, tamquam fundamentum Medicinæ ac Chi-

ac Chirurgiæ, præter idoneum & fidelem præceptum, compendium meum anatomicum utile esse potest, cui, si lubet, ob figuras Anatomia Bartholini, v. Verheyeni, vel Veslingii, vel Kulmi, &c. jungi potest, & qui gallicam linguam intelligunt, Winslowi.

III. Pro *Theoria Medica*, Institutionibus scilicet fundamentis Medicinæ optime addiscendis, præter nostrum compendium, vel Boerhaavii *Institutiones Medice*, vel Frid. Hoffmanni *Medicinæ rationalis* tomus priores.

IV. Ad Medicamentorum simplicium cognitionem sibi comparandam, vel Macassii promptuarium *Medicæ*, vel Hermannii *Materia Medica*, vel D. Pharmacologia servire potest.

V. Pro Medicamentis compositis, pharmaceuticis, cemicis, & galenicis cognoscendis, vel Jungkenii *Leçon Chémico-pharmaceuticum*, vel *Pharmacopœia Augustana*, vel *Dispensatorium Borusso-Brandenburgicum*.

VI. Qui rem herbariam accuratius discere volumus, præter diligentem plantarum & florum inspectionem præsertim quando ab experto Botanico demonstrantur Raii *Methodo plantarum* uti possunt: cui illi, qui non est res angusta domi, Tournefortii *Institutiones herbariæ*, aliosque tandem varios Botánicos scriptos jungere possunt.

VII. Speciatim pro chemia penitus excolenda, V. delii chemia, vel Jo. Maur. Hoffmanni *Acta laboratorii chemici*, vel Rothii *introductio in chemiam* vel Teichmeieri aut Boerhaavii *Elementa chemica* viunt.

VIII. Ad fundamenta chirurgiæ addiscenda typus nostra chirurgia sufficere potest. Cui deinde alii præstantiores chirurgi addendi.

IX. Ad formulas Medicas conscribendas, Weder de Medicamentorum compositione extemporanea, Morellus, Eyselius, Fickius, aut Junckerus de mulis Medicis prodest.

X. Pro *Therapia*, sive *praxi Medica*, ut vulgo cun-

nt, discenda, Aphorismi practici Boerhaavii, & Frid. Hoffmanni Medicinæ rationalis tomi posteriores commodè adhiberi possunt; qui vero & Stahlianæ fundamenta practica cognoscere aut sequi volunt, eis vel Weisbachii, vel Nenteri, vel Junckeri praxis Medicinæ sui erit.

XI. Pro *Aquarum vel fontium Medicatorum* præcipuorum in Germania cognitione sibi comparanda Frid. Hoffmannus, de aquis & fontibus Medicatis Germaniæ; Bergerus, de Thermis Carolinis; Castius, de Eplicensibus; Vvolfartus, de Thermis Embsensibus; Melchior aut Jungkenius de Vvisbadensibus; Lands, de Acidulis Egranis; Henslingius de Schvvaldensibus; Hoffmannus, de Schvvalbacensibus, & Adanis; Seipius Slarius, & ego de Pymontanis.

XII. Miscellanei quidam libri juveni Medico quoadhuc valde utiles; ut Conringii introductio in artem Medicam, & Lindenius, cum Mercklini additamentis, pro scriptoribus Medicis cognoscendis, Hippocratis Opera vel saltem principio ejus Aphorismi, Aurel. Cornelius Celsus de Medicina: ut ex his duobus veterum Medicinam & Chirurgiam discere possint. Bohnius de Officio Medici duplici, *clinico & forensi*; idemque de *Vulnerum renuntiatione*, vel Teichneri institutiones Medico-legales, in usum Medicorum forensis. Denique pro novis quibuscumque in omni Medicina partibus cognoscendis, quam maxime nunc in proficuum esse censeo *Commercium illud litterarum universale*, quod Norimbergæ imprimitur, & cu singulis hebdomadibus plagula prodit.

F I N I S.

AD BIBLIOPEGUM.

Tab. I.	ad pag. 371. est collocanda.
Tab. II.	ad pag. 374.
Tab. III.	ad pag. 376.
Tab. IV.	ad pag. 381.
Tab. V.	ad pag. 385.
Tab. VI.	ad pag. 387.
Tab. VII.	ad pag. 390.
Tab. VIII.	ad pag. 392.
Tab. IX.	ad pag. 397.



fig. 6.

fig. 3.



fig. 4.



fig. 2.






fig. 5.












fig. 22.



fig. 23.



fig. 24.



fig. 25.




fig. 28.






fig. 27.









fig. 27.










fig I



fig II



